

اجتماعات گیاهی پارک ملی کلاه قاضی

سید جمال الدین خواجه الدین^۱

چکیده

در این طرح اجتماعات گیاهی پارک ملی کلاه قاضی بررسی شده است. پارک ملی کلاه قاضی در ۳۶ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده و از تنوع گیاهی و جانوری زیادی برخوردار است. در این مطالعه ۲۱۴ گونه گیاهی جمع آوری شد. اجتماعات گیاهی پارک از نوع اجتماعات مناطق خشک است. با استفاده از روش کوادرات‌های داخل هم، حداقل سطح اجتماعات پارک مطالعه شد، و با استفاده از منحنی گونه به سطح، کوادرات ۱۰۰ متر مربعی برای جمع آوری داده‌های تاج پوشش و تراکم هر گونه و تعیین مقدار سنگ، سنگ ریزه و لاش برگ انتخاب گردید. برای تعیین اجتماعات، از روش اوردیناسیون برای آنالیز داده‌ها استفاده شد.

تاج پوشش گیاهی در این پارک کم و از صفر تا حد اکثر پنج درصد متغیر است. اجتماعات گیاهی اصلی پارک را گونه‌های ذیل تشکیل می‌دهند: *Pteropyrum aucheri*, *Artemisia sieberi*, *Anabasis aphylla*, *Acantholimon spp.*, *Cousinia pintocephala* و *Ebenus stellata* و *Scariola orientalis*. این گونه‌ها با دیگر گونه‌ها، اجتماعاتی را تشکیل می‌دهند. رویشگاه‌هایی به صورت موزاییک وجود دارد که باعث تشکیل اکتون‌ها و افزایش تنوع اجتماع گیاهی در پارک می‌شود. اجتماعات گیاهی آب دوست در کنار چشممه‌سارها گسترش محدودی دارند. اکثر اجتماعات پارک از عامل ادافیک متأثر شده‌اند، و عامل بیولوژیک در سطح محدودی مؤثر بوده است. گونه‌ای *Ficus sp.* در پارک وجود دارد، که احتمال دارد گونه یا واریته جدیدی باشد.

واژه‌های کلیدی: اصفهان، پارک ملی کلاه قاضی، اکتون‌گیاهی، اجتماعات گیاهی، اوردیناسیون

مقدمه

پارک ملی کلاه قاضی^۲ در ۳۶ کیلومتری جنوب اصفهان، در ۳۱۸۹ هکتار، پناهگاه حیات وحش است (۶)، و به علت تنوع گونه‌های پستاندار بزرگ مثل آهو، بزکوهی و غیره، از دیر زمان مورد توجه حکام و پادشاهان اصفهان بوده است (۱ و ۷). تنوع مساحت دارد. در این پارک معادن سنگ لاستر با مساحت

۱. استادیار مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
۲. در این مقاله پارک ملی کلاه قاضی «پارک» نامیده شده است.

اهمیت بسزایی دارد. در این منطقه شبیه‌های مختلف وجود دارد، و به دو منطقه کاملاً مجزا تقسیم می‌شود: دشت و کوهستان، که دشت و دشت سر، بیش از نیمی از مساحت منطقه را شامل می‌شود و شبیه آن از صفر تا ۱۵ درصد متغیر است، و بخش کوهستانی که شبیه‌های تندر از ۱۵ درصد تا بیش از ۶۵ درصد را شامل می‌گردد.^(۶)

تغییرات ارتفاع منطقه برای استقرار پوشش‌های گیاهی مختلف اهمیت دارد. ارتفاع از سطح دریا در این پارک از ۱۶۵۰ متر در دشت‌ها، تا ۲۵۳۴ متر در قله کلاه قاضی متغیر است. بیشترین مساحت منطقه تا ۱۸۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد، و کمترین مساحت متعلق به ارتفاعات بلندتر از ۲۴۰۰ متر است (۱ و ۶).

مطالعات زمین‌شناسی منطقه در مقیاس‌های مختلف بررسی شده است (۶ و ۱۸). به طور خلاصه، ارتفاعات منطقه اکثراً متعلق به دوره مزوژوئیک بوده و قسمت‌های دشت منطقه از دوره کواترنر گزارش شده است. انواع سنگ‌های شیل، ماسه سنگ و سیلتستون‌های تیره رنگ مربوط به دوره ژوراسیک بالایی است که پی‌سنگ منطقه را تشکیل می‌دهد. هم‌چنان، در ارتفاعات میانی، سنگ‌های آذرین از دوره ژوراسیک وجود دارد. رسوبات کرتاسه پایینی به صورت کنگلومرا و ماسه سنگ قمز دیده می‌شود. از کرتاسه بالایی می‌توان آهک‌های ضخیم لایه را نام برد که به صورت آهک‌های «مارن» وجود دارد و به فرسایش حساس است. ژئومورفولوژی منطقه را سلطانی (۶) در مطالعات خود با دقت بررسی کرده، که به علت مفصل بودن مبحث، از ذکر آن خودداری می‌شود.

مطالعات گیاه‌شناسی و پوشش گیاهی منطقه در مقیاس‌های مختلف انجام گرفته، و هر کدام نکاتی را بررسی نموده، که در این مطالعه استفاده شده است (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۱ و ۱۲).

مواد و روش‌ها

بررسی صحرایی این پژوهش در منطقه پارک ملی کلاه‌قاضی، از زمستان ۱۳۷۵ تا زمستان ۱۳۷۶ ادامه پیدا کرد، و مجدداً در بهار

گونه‌های جانوری و گیاهی در پارک بسیار زیاد و جالب توجه است (۱، ۲ و ۳). به همین دلیل در سطح جهانی اهمیت داشته و مورد توجه علاقه‌مندان مسایل محیط زیست و حیات وحش بروون مرزی قرار گرفته است. تعداد گونه‌های جانوری این پارک (۶۲) و گونه‌های گیاهی آن ۲۹۱ گونه گزارش شده است (۱)، که تنوع گونه‌ای بالایی محسوب می‌گردد. منبع اخیر، گونه‌های گیاهی را متعلق به ۲۰۴ جنس از ۴۳ خانواده دانه دار گزارش کرده است. شورای عالی شکاریانی و نظارت بر صید، در سال ۱۳۴۶ شمسی این منطقه را «قرق» اعلام کرده و از سال ۱۳۴۹ عنوان «پارک وحش» را به آن داده است. از سال ۱۳۷۵ به «پناهگاه حیات وحش» تبدیل شده است (۱۰).

بررسی زیادی روی اقلیم پارک صورت نگرفته است. مطالعات اقلیم‌شناسی منطقه‌ای که پارک در آن قرار گرفته، این منطقه را با روش کوپن دارای اقلیم «خشک با تابستان‌های بسیار گرم و خشک»، با روش گوسن «نیمه بیابانی شدید»، با روش آمبرژه «خشک و سرد»، و با روش دماترن «خشک» معرفی می‌کند (۶). میزان بارندگی منطقه را حدود ۱۱۱ میلی متر (۱) تا ۱۴۴/۶ میلی متر (۶) در سال گزارش کرده‌اند. تعداد روزهای یخ‌بندان نیز به طور متفاوت از ۷۵/۱ روز (۱) تا ۸۹/۵ روز (۶) در سال، و درجه حرارت حداقل و حداقل مطلق به ترتیب از ۱۶-۱۶ و ۴۱/۵-۱۱/۵ درجه سانتی‌گراد (۶) ذکر شده است. کریمی (۹) با بررسی عوامل هواشناسی، اقلیم منطقه را «خشک با تابستان‌های گرم و زمستان‌های نیمه سرد» گزارش کرده است.

عوامل مختلف هواشناسی و اقلیم‌شناسی منطقه نیز بررسی شده است. حدود ۵۹/۳ درصد بارندگی منطقه در فصل زمستان اتفاق می‌افتد، و کم باران‌ترین فصل سال، تابستان با ۲/۰ درصد بارندگی سالیانه است، که به صورت اتفاقی نازل می‌گردد (۱، ۶ و ۹).

شبیه منطقه از نظر اکولوژی اهمیت دارد؛ به علت کوهستانی و دشتی بودن منطقه، انواع شبیه‌ها را در آن می‌توان یافت. شبیه‌های مختلف از نظر استقرار اجتماعات گیاهی

ریزه و کل تاج پوشش گیاهی تخمین زده شد.

نتایج

مساحت سطح حداقل اجتماع، با مطالعه منحنی های گونه به سطح در هشت اجتماع مختلف پارک بررسی گردید. مساحت این هشت اجتماع مورد مطالعه در حدود $61/3$ درصد سطح اجتماعات گیاهی پارک را (بدون در نظر گرفتن مساحت صخره سنگ ها) شامل می شود. این بررسی نشان می دهد که سطوح حداقل اجتماعات مختلف، تفاوت زیادی با یکدیگر دارند، و از ۱۸ متر مربع تا 82 متر مربع (جدول ۱) متغیرند. از آن جایی که کوادرات یادداشت برداری نباید از مساحت سطح حداقل کوچک تر باشد، و نیز توصیه می شود که همیشه چندین درصد به سطح آن اضافه شود تا کوادرات مناسب به دست آید (۱۵، ۱۹ و ۲۰)، کوادرات 100 متر مربعی اندازه مناسبی برای بررسی صحرایی اجتماعات گیاهی این پارک می تواند باشد. چون داده های جمع آوری شده با کوادرات های غیر یکنواخت در نتیجه آنالیز اثر می گذارد (۱۶)، لذا برای کلیه اجتماعات گیاهی کوادرات یک اندازه انتخاب گردید تا این مشکل نیز حل گشته و استاندارد کردن داده ها منتفی گردد.

گونه های گیاهی پارک، طی مطالعات مختلف بررسی شده است (۱، ۲، ۳، ۵ و ۱۲). در مطالعات صحرایی نمونه های گیاهی مختلف جمع آوری گردید. چون هدف، بررسی گیاه شناسی صرف نبود، لذا گونه های گیاهی که در داخل کوادرات ها ظاهر گردیدند جمع آوری و به طور دقیق شناسایی شدند، که به 214 گونه، 172 جنس و 45 تیره تعلق دارند. در جدول ۲ تعداد 77 گونه لیست شده، و برای کم کردن حجم جدول از ذکر گونه هایی که در 100 متر مربع کمتر از 50 سانتی متر مربع تاج پوشش داشتند خودداری شد. در جدول ۳ اطلاعات درصد تاج پوشش کل اجتماع، تراکم کل بوته ها در کوادرات 100 متر مربعی، مساحت اجتماع در پارک به هکتار، تعداد گونه های مشاهده شده در سری کوادرات ها، درصد سنگ

1377 کنترل نهایی به عمل آمد. برای تعیین مساحت کوادرات جمع آوری داده های پوشش گیاهی منطقه در کار صحرایی، از روش کوادرات سطح حداقل^۱ استفاده شد (20). برای تعیین سطح حداقل، روش کوادرات های داخل هم^۲ اجرا گردید، و با توجه به اندازه، پراکندگی و تاج پوشش گیاهان، اولین کوادرات برای روش کوادرات های داخل هم، با مساحت یک متر مربع انتخاب شد. سپس با 10 مرتبه تکرار و دو برابر کردن سطح به 512 متر مربع رسید. از مساحت 128 متر مربع به بعد تعداد گونه افزوده شده قابل توجه نبود، لذا افزایش سطح متوقف شد. پس از بررسی منحنی گونه به سطح، مساحت کوادرات مطالعه 100 متر مربع تعیین گردید. از آن جایی که ترکیب گونه ها برای تعیین اجتماع ضروری بود، لذا استفاده از کوادرات سطح حداقل اجتناب ناپذیر می نمود (۱۹ و ۲۰). برای تفکیک و تشخیص اولیه اجتماعات از یکدیگر، از روش فلوریستیک و فیزیونومی^۳ استفاده شد (۱۵ و 17 و 20). برای جمع آوری داده های صحرایی، روش نمونه برداری طبقه بندی شده تصادفی^۴ مورد استفاده قرار گرفت (۲۰).

در هر تیپ تعیین شده برای مطالعه پوشش گیاهی، کوادرات 100 متر مربعی پنج مرتبه تکرار گردید. تکرار پیش از پنج مرتبه به علت کمی وقت و هزینه زیاد امکان پذیر نشد. برای هر گونه، داده های پوشش^۵ و تراکم^۶ یادداشت برداری شده است. پنج کوادرات سطح حداقل تکرار شده در هر تیپ، یک سری کوادرات نامیده شده، که 65 بار در تیپ های مختلف اجرا گردید. برای آنالیز داده ها در نرم افزار CANOCO (۲۱)، روش های اوردیناسیون^۷ DCA^۸ CA^۹ و PCA^{۱۰} به کار رفت. آنالیز اوردیناسیون برای تعیین ترکیب پوشش گیاهی و گروه بندی سری کوادرات ها، در دو مرحله جداگانه برای گونه ها و سری کوادرات ها انجام شد. در داخل کوادرات ها، پوشش هر گونه با کوادرات های کوچک 10×10 سانتی متری و یا 20×20 سانتی متری، و گیاهان کوچک تا اندازه سانتی متر مربع برآورده شده است. هم چنین، در داخل آنها مقدار لاش برگ، سنگ، سنگ

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Minimal area | 2. Nested plots | 3. Floristic & Physiognomy | 4. Stratified Random Sampling |
| 5. Cover | 6. Density | 7. Ordination | 8. Canonical Ordination Analysis |
| 9. Detrended Correspondence Analysis | | 10. Principal Components Analysis | |

جدول ۱. مساحت سطح حدائق برحی از اجتماعات گیاهی پارک ملی کلاه قاضی

اجتماع گیاهی	تعداد گونه‌های یادداشت شده	مساحت سطح حدائق
	در کوادرات‌های داخل هم	(m ²)
<i>Acantholimon spp.</i>	۳۳	۸۲
<i>Ebenus stellata</i>	۳۸	۸۰
<i>Artemisia sieberi</i>	۳۵	۷۶
<i>Pteropyrum aucheri</i>	۲۵	۵۸
<i>Stipagrostis plumosa</i>	۱۵	۳۴
<i>Peganum harmala</i>	۱۹	۲۵
<i>Anabasis-Artemisia</i>	۱۰	۲۰
<i>Anabasis aphylla</i>	۴	۱۸

اصلًاً رویشگاهی یافت نشد. به هر صورت این گونه‌ها به بررسی بیشتری نیاز دارند تا در این مورد نظر قطعی داده شود.

ارتفاعاتی که خاک شیرین دارند، دارای اجتماعات کوه سری با تنوع گونه‌ای زیاد هستند. اما در دشت که خاک از جنس رس و نسبتاً شورتر می‌باشد (۱۲)، تنوع گونه‌ای کاهش یافته است. بهترین مثال، اجتماع *Anabasis aphylla* است که در سطوح وسیع به صورت اجتماع تک گونه‌ای خالص درآمده است. تاج پوشش گیاهی در این پارک بسیار کم و ناچیز است، و از آن جایی که این پارک مدت‌ها است به صورت فرق بوده و دام اهلی از آن خارج شده است (۱۰ و ۱۶)، وضعیت موجود تقریباً توان منطقه را تشنان می‌دهد.

بحث

رویشگاه پارک ملی کلاه قاضی تغییرات تدریجی را از ارتفاعات تا دشت به همراه دارد. همین نکته باعث استقرار گونه‌ها در محل‌های مختلف و به صورت داخل هم می‌گردد. تغییرات تعداد گونه‌ها در اجتماعات گیاهی در رویشگاه‌های مختلف، به شدت متأثر از عوامل خاک و مصرف کننده‌های گیاهی است. بررسی منحنی‌های گونه به سطح در اجتماعات مختلف،

و سنگریزه ذکر شده است. در این جدول واحدهای زمین‌شناسی و نیز ژئومورفولوژی، که اجتماع مورد نظر روی آن مستقر می‌شود، ذکر گردیده است.

از بین نمونه‌های جمع‌آوری شده، گونه‌ای انجیر *Ficus sp* در منطقه می‌روید که میوه آن گلابی شکل و سیاه رنگ است و نیاز به مطالعه بیشتری دارد، و احتمالاً گونه یا واریته جدیدی است. برحی از گونه‌های گزارش شده از منطقه پارک ملی کلاه قاضی (۱ و ۲)، به منظور مطالعه اجتماعات و رویشگاه آنها به طور ویژه مورد پیگیری و جستجو قرار گرفت، اما اثری از آنها یافت نشد. احتمال دارد این گونه‌ها نادر و یا در حال انقراض باشند. اسمای این گونه‌ها عبارتند از: *Iris songarica*, *Calligonum commosum*, *Tulipa chaysantha*, *Zygophyllum atriplicoids*, *Clematis orientalis* است که سال قبل از این مطالعه، باران کمتری در منطقه باریده بود. بنابر گزارش‌های موجود، برحی از گونه‌ها وقتی در سال قبل باران کمتری دریافت می‌کنند، اصلًاً سبز نمی‌شوند (۱۴). با توجه به این نظریه، دو گونه اول و دوم که تک لپه‌ای بوده و جزو *Geophytes* هستند، احتمالاً در سال مطالعه سبز نشده‌اند. اما سه گونه دیگر جزو درختچه‌ها بوده و به طور واضح قابل مشاهده می‌باشند. به خصوص برای گونه *Calligonum*

Zygophyllum dumosum	Acantholimon
Zygophyllum millegrana	Acantholimon-Artemisia
Tulipa agrestis	Artemisia
Tulipa sylvestris	Anabasis-Acantholimon
Tulipa violacea	Anabasis-Artemisia
Tulipa vulgaris	Artemisia
Tulipa wittrockiana	Artemisia-Acantholimon
Spiraea prostrata	Artemisia-Asteria
Spiraea salicifolia	Artemisia-Arabodes
Spiraea xanthophylla	Artemisia-Cousinia
Polygonum rotundifolium	Artemisia-Ephedra
Oenanthe luteola	Artemisia-Lausensia
Oenanthe oenanthes	Artemisia-Peganum
Oenanthe orientalis	Artemisia-Scirio
Ranunculus obsoletus	Artemisia-Sipa
Salsola soda	Artemisia-Sipagrostis
Salsola soda	Cousinia
Salsola soda	Cousinia-Peganum
Salsola soda	Ebanus
Salsola soda	Ebanus-Amygdalus
Salsola soda	Ephedra
Salsola soda	Lausensia
Salsola soda	Paronychia
Salsola soda	Scirio
Salsola soda	Scirio-Acantholimon
Salsola soda	Scirio-Artemisia
Salsola soda	Stipagrostis
Salsola soda	Sipaegrostis-Cousinia
Salsola soda	Tanacetum ligustrinum
Salsola soda	Zauria-Melica

جدول ۳ مشخصات اجتماعات مختلف پارک ملی کلاه قاضی

نام منطقه	استعداده	جهانگردی انسانک	نژادولوژی	ارتفاع از سطح دریا	مساحت هکتار	هزار نفر	نیازمندی	گزینه های غلب
<i>Acantholimon</i>		K4	K4,Q3	۱۷۰۰-۲۱۰۰	۱/۲	۷۰	۱۱۰	ترسانه سطحی سهی بهار و زمستونی سیگ همراه با دارو.
<i>Acantholimon-Arenaria</i>		K4	K4,Q3	۱۷۰۰-۲۱۰۰	۱/۴	۴۵	۱۱۰	ترسانه سطحی سهی بهار و زمستونی سیگ همراه با دارو.
<i>Allagi</i>		Q3	Q3	۱۶۰-۱۶۰	۱/۰	-	۷۹	در محلاتی سطحی طاقت
<i>Ammoducus</i>		K4	K4	۱۷۰-۲۱۰	-	-	۱۰	دوه سکنی - مردانه زیگی سیگ همراه با دارو.
<i>Anabasis</i>		Q3,A12	Q3,A12	۱۶۰-۱۶۰	۱/۱	۱۰	۱۰	مدت سیمه شده بالجع روسیات سبلان
<i>Anabasis-Acantholimon</i>		Q3,K4	Q3,K4	۱۷۰-۱۹۰	۰/۷	۵۰	۱۰	ترسانه سطحی شدید همراه با تجهیز رسالت سبلان
<i>Anabasis-Arenaria</i>		Q3,A12	Q3,A12	۱۷۰-۱۸۰	۱/۷	۸۰	۸	مدت سیمه آبشار - لخت
<i>Anabasis-Sipagrotis</i>		Q3	Q3	۱۷۰-۱۷۰	۰/۸	۸۰	۸	نهج رسالت سبلان
<i>Arenaria</i>		Q3	Q3	۱۷۰-۱۸۰	۱/۱	۱۵	۷۷	ترسانه شدید
<i>Arenaria-Acantholimon</i>		Q3	Q3	۱۷۰-۱۸۰	۱/۰	۱۷	۵۰	مدت سیمه آبشار
<i>Arenaria-Adonis</i>		K4	K4	۱۷۰-۱۸۰	۱/۰	۱۰	۱۰	ترسانه سطحی زیاد
<i>Arenaria-Anabasis</i>		Q3	Q3	۱۷۰-۱۸۰	۱/۰	۵۰	۱۰	مدت سیمه آبشار
<i>Arenaria-Cousinia</i>		Q3	Q3	۱۷۰-۱۸۰	۱/۰	۱۰	۱۰	ترسانه شدید
<i>Arenaria-Ephedra</i>		Q3	Q3	۱۷۰-۱۸۰	۱/۰	۱۰	۱۰	ترسانه شدید
<i>Arenaria-Lavandula</i>		Q3	Q3	۱۷۰-۱۸۰	۱/۰	۱۰	۱۰	ترسانه شدید
<i>Arenaria-Peganum</i>		Q3	Q3	۱۷۰-۱۸۰	۱/۰	۱۰	۱۰	ترسانه شدید
<i>Arenaria-Sarcocolla</i>		Q3	Q3	۱۷۰-۱۸۰	۱/۰	۱۰	۱۰	ترسانه شدید
<i>Arenaria-Sipa</i>		K9	K9	۱۷۰-۱۸۰	۱/۰	۱	۱	مدت سیمه آبشار
<i>Arenaria-Sipagrotis</i>		Q3	Q3	۱۷۰-۱۸۰	۱/۰	۱	۱	ترسانه شدید
<i>Carex-Bunium</i>		K4	K4	۱۷۰-۲۱۰	۱/۰	-	۷۹	ترسانه شدید همراه زیگی سیگ همراه با دارو.
<i>Carexotrichus-Cousinia</i>		Q3	Q3	۱۷۰-۱۷۰	۱/۰	۵۰	۱۰	مدت سیمه آبشار
<i>Cousinia</i>		Q3	Q3	۱۷۰-۱۷۰	۰/۰	۵۰	۱۰	مدت سیمه آبشار
<i>Cousinia-Peganum</i>		K7,K4	K7,K4	۱۷۰-۱۷۰	۰/۰	۳۰	۳۰	ترسانه شدید
<i>Ebenus</i>				۱۷۰-۲۱۰	۰/۰	۰	۰	قره سیگ

ادامه جدول ۳

۱۴۹

ردیف	عنوان گردشگری	ردیف مدل	نام ***	ساخت ***	برآمد ***	ازدست	ارتفاع سطح دریا	گوشه‌ای غلبه
۳۱	اردبزی سیگی - همراه با ناره	K7	Elaeurus-Ampelodus	۱۱۰۰-۱۱۰۰	۷۷۳	۷۸۸	۲	۱۶۰-۱۶۰
۳۲	ددخت سالیدا - لوسانی فیلی	Q3	Ephedra	۱۶۰-۱۶۰	۷۳	۱۷۷	-	-
۳۳	لرسانی شیرادی مدهد	Q3	Lamnea	۱۶۰-۱۶۰	۷۳	۷۳	-	-
۳۴	لرسانی شیرادی مدهد	Q3	Peganum	۱۶۰-۱۶۰	۷۳	۷۳	-	-
۳۵	ددشت سر آبدار - لوسانی شیرادی	Q3	Peganum-Saciola	۱۶۰-۱۶۰	۷۳	۷۳	-	-
۳۶	ددشت سر لاغت	-	Pteroppyrum	۱۷۰-۱۷۰	۷۳	۷۳	-	-
۳۷	ددشت سر لاغت - لوسانی شیرادی مدهد	Q3,A12	Saciola	۱۷۰-۱۷۰	۷۳	۷۳	۲	۱۷۰-۱۷۰
۳۸	ددشت سر لاغت - باعجمی رسالت سبلانی بالراسانی شیرادی	Q3	Saciola-Acantholimon	۱۷۰-۱۷۰	۷۳	۷۳	۱	۱۷۰-۱۷۰
۳۹	ددشت سر آبدار	Q3	Spiraea	۱۷۰-۱۷۰	۷۳	۷۳	-	-
۴۰	ددشت سر آبدار - لوسانی شیرادی	Q3	Spiraea-Artemisia	۱۷۰-۱۷۰	۷۳	۷۳	-	-
۴۱	ددشت سر آبدار دندت	Q3	Spiraea	۱۷۰-۱۷۰	۷۳	۷۳	-	-
۴۲	ددشت زیکی سیگی	K4	Spiraea	۱۷۰-۱۷۰	۷۳	۷۳	-	-
۴۳	ددشت سر لاغت بازرسانی شیرادی دندت	Q3	Spiraea-Cousinia	۱۷۰-۱۷۰	۷۳	۷۳	-	-
۴۴	ددشت سر لاغت بازرسانی شیرادی دندت	Q3	Tanacetum ligulatum	۱۷۰-۱۷۰	۷۳	۷۳	-	-
۴۵	زیکی سیگی اهرند زیکی سیگ	K7	Zizania-Melica	۱۷۰-۱۷۰	۷۳	۷۳	-	-

*** فرضیه احمدی زین شناسی = A12: کیفرز - با آبریزی بدندت.
 رگاسندریه مکنیکی کریک = Q3: کیفرز - ایامی فیلی (دندت).
 سلسلت اینچیل در راهکار حسب مکنیکی
 ۱۰۰ کم در کیلومتر ۱۰۰ متر میزان.

متمامدی، اجتماعات متفاوتی را تشکیل داده‌اند. تعدادی از آنها رویشگاه خاصی را انتخاب کرده و جوامعی را تشکیل می‌دهند. برخی از گونه‌ها نیز رویشگاه وسیعی را انتخاب کرده‌اند، و تقریباً در اکثر اجتماعات وارد شده‌اند. این گونه‌ها از نظر جامعه‌شناسی گیاهی ارزشی ندارند و برای تشخیص اجتماعات گیاهی از آنالیز حذف می‌شوند. در این بررسی گونه‌های زیر در اکثر رویشگاه‌ها و همراه اجتماعات مختلف مشاهده شد، که در آنالیز اوردیناسیون وارد نشد.

Bromus danthoniae (Poaceae), *Bromus tectorum* (Poaceae), *Boissiera squarrosa* (Poaceae), *Gaillonia bruguieri* (Rubiaceae), *Cirsium spectabilis* (Astraceae) گونه‌های دائمی *Gaillonia bruguieri* در ۸۳٪ سری کوادرات‌ها ظاهر شده، به طور معمول در اجتماع *Artemisia* وارد می‌شود و تاج پوششی خوبی پیدا می‌کند. این گونه در اجتماع *Anabasis* نیز دیده می‌شود، ولی تراکم و پوشش کمتری دارد، و در اکثر رویشگاه‌های کلاه قاصی، بجز بر روی صخره سنگ‌ها که به صورت نادر حضور دارد، هم می‌روید. در سری کوادرات‌های اجتماع *Pycnocycla* و *Pteropyrum* نیز به مقدار ۴۱٪ متر مربع در ۱۰۰ متر مربع مشاهده شد. در کل منطقه مورد مطالعه، به طور میانگین ۱٪ متر مربع در ۱۰۰ متر مربع پوشش دارد، و تراکم آن در این حالت به ۴۷/۵ بوته در ۱۰۰ متر مربع می‌رسد. دام به این گونه گیاهی علاقهٔ زیادی دارد. از آن جایی که فقط شاخه‌های روی زمین خوابیده این گیاه در پارک مشاهده شد، به نظر می‌رسد که حیوانات وحشی از شاخه‌های ایستاده آن به وفور چرا می‌کنند. پس از تحلیل اوردیناسیون، اجتماعات مختلف تعیین شد و فهرست ترکیب گونه‌ها و مقدار پوشش آنها در اجتماعات ارائه گردید (جدول ۲). علاوه بر اجتماعات معروفی شده، دو گروه اجتماع گونه‌های درختی و درختچه‌ای و اجتماعات اطراف چشم‌هسارها نیز به صورت نقطه‌ای، و یا در سطح بسیار محدود حضور دارند، که کوادرات‌گذاری نشده‌اند. بیشترین سطح منطقه از اجتماعات مختلف زیر پوشیده شده است:

مساحت‌های سطح حداقل را با تغییراتی از ۱۸ تا ۸۲ متر مربع نشان داد. عامل اصلی تغییرات، تعداد گونه‌های ظاهر شده در این کوادرات‌ها بود.

بررسی اجتماعات گیاهی مناطق خشک کشور توسط نگارنده، مساحت سطح حداقل را در منطقه جازموریان ۴۰۰ متر مربع برآورد کرده است (۱۶ و ۱۳). علت کوچک بودن مساحت سطح حداقل در پارک، تراکم زیادتر جمعیت گیاهی و نیز کوچک‌تر بودن اندازه گیاهان، نسبت به منطقه جازموریان است. پس از بررسی منحنی‌ها، کوادرات ۱۰ × ۱۰ متر با مساحت ۱۰۰ متر مربع برای مطالعه انتخاب شد. بزرگ بودن کوادرات مطالعه فقط کار صحراوی را افزایش می‌دهد، ولی داده‌های بیشتر و دقیق‌تری را جمع آوری می‌کند، به ویژه، تکرار پنج مرتبه آن اطلاعات بهتر و همگنی را برای آنالیز تهیه می‌نماید.

در این بررسی تاج پوشش گیاهی اندازه‌گیری شده به ندرت به پنج درصد می‌رسد، و به طور معمول از یک تا سه درصد متغیر است. تاج پوشش در ارتفاعات بهتر از دشت‌ها است، به طوری که تاج پوشش *Artemisia* در ارتفاعات ۴/۵ درصد بوده و در دشت‌ها به ندرت از سه درصد تجاوز می‌کند.

تنک بودن پوشش گیاهی نیز خود عاملی برای گستردگی بودن مساحت حداقل سطح است. در مواردی هم تاج پوشش اندازه‌گیری شده حدود ۲/۰ درصد بوده، که در اجتماع *Cousinia* مشاهده شد. به علت خشکسالی در سال قبل از این مطالعه، گونه‌های یکساله به ندرت روییده بودند، و با توجه به شناختی که از پوشش منطقه در دست بود، تقریباً تاج پوشش یکساله‌ها ناچیز و یا در مواردی صفر بود. گونه‌های یکساله در سطوحی که تجمع املاح در آنها وجود دارد استقرار نمی‌یابند، به خصوص در بخش دشتی پارک که اجتماع *Anabasis aphylla* به صورت اجتماع تک گونه حضور دارد، یکساله‌ها غایب هستند.

گونه‌های مختلف گیاهی در این پارک می‌رویند، و مناسب با نیاز اکولوژیک خود و مدیریت اعمال شده در طی سالیان

می شود، و شرایط رویشگاه برای استقرار هر دو گونه به صورت موزاییک مناسب است، یعنی در این محل تسبیت به اجتماع *Anabasis* املالح کمتری تجمع کرده است. لذا گونه درمنه نیز توانسته در آن مستقر گردد.

اجتمع *Artemisia-Acantholimon-* spp: در واریزه کوهپایه‌ها، در اراضی سنگلاخی به طرف دشت‌ها مستقر شده است، و اکوتون اجتماعات این دو گونه محسوب می‌گردد. این در شرایطی است که در اطراف این اجتماع، اجتماع گونه دوم هم حضور ندارد، و رویشگاه به قدری مشخص است که از ترکیب گونه‌ها و رویشگاه می‌توان اکوتون بودن آن را تشخیص داد. گونه دوم ممکن است در محل‌های مختلف به شکل ترکیب و یا یکی از سه گونه زیر باشد:

Acaetholimon aspadanum

Acaetholimon leucacanthum

Acaetholimon scorpius

این سه گونه، دارای رویشگاه مشابهی هستند و گاهی هم به اتفاق سبز می‌شوند.

اجتمع *Artemisia-Stipagrostis plumosa*: دارای گونه‌های همراه محدودی است و در خاک‌های نسبتاً شنی مستقر می‌شود.

اجتمع *Artemisia-Launaea acanthodes*: در شرق پارک پراکنده است. از بررسی‌های مسلمی (۱۲) چنین بر می‌آید که کاهش مقدار سدیم خاک، که به راحتی در خاک‌های شنی حاصل می‌گردد، باعث استقرار گونه دوم می‌شود.

اجتمع *Artemisia-Scariola orientalis*: در رویشگاه مشابه درمنه مستقر می‌گردد، که در آن شن و رس افزایش یافته و مقدار سیلت کاهش پیدا می‌کند. بدین صورت مقدار سدیم، و به دنبال آن هدایت الکتریکی خاک کاهش می‌یابد. گونه دوم در شرایطی که آب بیشتر در اختیار باشد مستقر می‌گردد، در دشت‌ها و آبراهه‌ها که سیلان ارتفاعات به این مناطق می‌رسد، دیده می‌شود. ترکیب گونه‌ها مشابه بقیه اجتماعات درمنه بوده، ولی علاوه بر گونه دوم، *Pycnocycla* و *Eryngium billardieri* و *spinosa* نیز در آن زیاد است. از نکات جالب گونه غالب دوم،

Artemisia, *Anabasis*, *Acantholimon*, *Pteropyrum*, *Ebenus* و *Zataria*. بقیه اجتماعات در سطوح محدود حضور دارند. همه جوامع جزو رویش گیاهی ایران و توران دشتی می‌باشند، بجز *Ebenus* که به رویش گیاهی خلیج و عمانی (۴) تعلق دارد. در ذیل، اجتماعات مختلف پارک به طور مختصر توضیح داده می‌شود، که اطلاعات مربوط به آنها در جداول ۲ و ۳ گنجانیده شده است. در پارک، ۴۵ اجتماع گیاهی مطالعه گردیده که ۳۸ مورد آن در این مقاله توضیح داده می‌شود.

اجتمع درمنه (*Artemisia*): گونه اصلی این اجتماع *Artemisia sieberi* از گونه‌های دائمی و بوته‌ای منطقه است و در پارک به وفور یافت می‌شود. در دشت‌ها، و نیز در ارتفاعات، فقط در محل‌های مسطح و عاری از صخره سنگ مستقر می‌گردد، و در ارتفاعات کوه کلاه قاضی در نزدیکی قله می‌روید. یکی از اجتماعات اصلی است، و با دیگر گونه‌ها اجتماعاتی را نیز تشکیل می‌دهد. این اجتماع در محل‌هایی مستقر می‌شود که خاک دارای بافت شنی لومی بوده و املالح کمتری در آن جمع شده باشد. خاک‌های مرطوب و بدون مشکل املالح در مسیل‌ها قرار گرفته، که اجتماع *Pteropyrum* در آن مستقر می‌شود، ولی با شورتر و خشک شدن، درمنه جای آن را می‌گیرد. تاج پوشش گیاهی در تیپ‌های مختلف از ۷/۰ تا ۳/۱ درصد متفاوت است. این اجتماع در مناطق مختلف با همراهی گونه غالب دوم، اجتماعات را تشکیل می‌دهد که در اثر تغییرات خاک حاصل می‌شود. در جدول‌های ۲ و ۳ مشخصات رویشگاه و اطلاعاتی از اجتماع درمنه ذکر شده است. در زیر نیز به نکاتی از این اجتماعات اشاره می‌شود.

اجتمع *Artemisia-Aellenia auricula*: گونه دوم در دشت‌ها به صورت گونه نادر است، ولی در ارتفاعات اجتماع با درمنه را تشکیل می‌دهد. جهت شبیه رویشگاه این اجتماع در پارک، جنوب شرقی، جنوب غربی، شمال و شمال شرقی است.

اجتمع *Artemisia-Anabasis aphylla*: شباهت زیادی به اجتماع *Anabasis*-*Artemisia* دارد. این اجتماع در بین دو اجتماع *Anabasis aphylla* و *Artemisia sieberi* تشکیل

۱/۴ میلی اکی والان در لیتر و مقدار پتاسیم آن ۳۱۲ ppm بوده و آهک آن نسبت به دیگر اجتماعات کمترین مقدار را دارا است. مقدار رس در این رویشگاه زیاد بوده و به ۷/۲ درصد بالغ می‌گردد. شن ۳/۶۶٪ و سیلت ۵/۲۶٪ است، که رس و سیلت آن حداقلتر مقدار و شن کمترین مقدار را در بین دیگر رویشگاه‌های اجتماعات دارد. سدیم نیز حداقلتر بوده و شورترین اراضی پارک محسوب می‌شود. مقدار لاش برگ نسبت به بقیه اجتماعات زیادتر است و به ۱/۷ درصد تا ۲/۱ درصد می‌رسد. بوته‌ها در این اجتماع پراکنده‌اند، ولی حجم هر بوته نسبت به گونه‌های دیگر بیشتر است. دیگر اجتماعات آن عبارتند از:

اجتماع *Anabasis-Acantholimon*: در شمال پارک مستقر است و به علت سنگلاخی بودن رویشگاه، گونه دوم مستقر و غالب شده است. در این رویشگاه املاح از ارتفاعات به طرف پایین حمل و شرایط استقرار گونه اول فراهم گردیده و تجمع لاش برگ در زیر *Anabasis* به وفور دیده می‌شود. هر سه گونه فراوان در زیر *Acantholimon* در این اجتماع یافت می‌شود.

اجتماع *Anabasis-Artemisia*: یکی از اکوتون‌های این پارک است که در محل‌های نسبتاً زیادی که شرایط حاشیه رویشگاه‌های دشت همراه با تجمع املاح برای گونه اول و دشت سر برای استقرار گونه دوم مساعد است، دیده می‌شود. در این رویشگاه با تغییر کمی، اجتماع *Artemisia-Anabasis* مستقر می‌شود، که اکوتون دیگری از دو اجتماع اصلی است.

اجتماع *Anabasis-Stipagrostis*: در سطح محدودی مستقر است و تاج پوشش ضعیفی دارد. این اجتماع اکوتون دو اجتماع اصلی آن است. به علت پراکنده بودن گیاهان، فقط به تهیه فهرست گونه‌ها اکتفا شد.

اجتماع *Acantholimon*: این جنس با سه گونه، در منطقه اجتماعات مختلفی را تشکیل می‌دهد، یا در تشکیل اجتماعات شرکت می‌کند. سه گونه عبارتند از: *Acantholimon leucacanthum*, *aspadatum* و *Acantholimon scorpius*. این گونه‌ها کم و بیش رویشگاه

انجام فتوسترن از طریق نوارهای سبز روی ساقه‌های است. لذا برگ‌های کوچک و زود افت آن تأثیری در کاهش فتوسترن ندارد. از طرفی، استفاده حیوانات وحشی از شاخ و برگ آن خللی در رشد گیاه وارد نمی‌سازد.

اجتماع *Artemisia-Peganum harmala*: نشان‌دهنده تخریب و اعمال فشار چرا در گذشته است. گونه دوم مهاجم بوده و مورد استفاده دام‌های اهلی و وحشی قرار نمی‌گیرد، لذا به سرعت در حال گسترش است. به همین دلیل این اجتماع، یک اجتماع بیولوژیک است.

اجتماع *Artemisia-Ephedra intermedia*: فقط در بخش جنوبی پارک یافت می‌شود. ترکیب گونه‌های آن شبیه اجتماع درمنه است.

اجتماع *Artemisia-Cousinia piptocephala*: با سطح محدود یافت می‌شود. گونه دوم برگ‌های کوچک و پیچ خورده دارد که به راحتی قابل شناسایی است. گونه دوم اجتماع تشکیل می‌دهد و این اجتماع، اکوتون آن با درمنه است. گونه دوم به علت خاردار بودن، مورد توجه حیوانات وحشی نیست، لذا بذر آن به راحتی پراکنده و مستقر می‌شود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد در آینده این اجتماع گستردگی بیشتری پیدا می‌کند.

اجتماع *Stipa barbata parviflora*: که در مواردی هم بالاست، اما تعدادی از گونه‌ها فقط با تاج پوشش ناچیز یافت می‌شوند، در حالی که دیگر گونه‌ها در این اجتماع تولید زیاد و تاج پوشش قابل توجهی دارند.

اجتماع *Anabasis*: این اجتماع در منطقه غالب بوده و در سطح چشم‌گیری مستقر شده است. گونه اصلی آن *Anabasis aphylla* است، که در دشت‌ها فراوان و در ارتفاعات نادر است. رویشگاه آن هرگز سنگلاخی و صخره سنگی نیست، و عموماً به صورت اجتماع تک گونه‌ای غالب است. شبیه رویشگاه آن صفر تا دو درصد بوده، و جهت جغرافیایی بر آن اثری ندارد. بنا به بررسی‌های مسلمی (۱۲)، بافت خاک این اجتماع لومی - شنی است، و سدیم در خاک‌های این اجتماع

کم خاک است، مستقر می‌شود. این رویشگاه برفگیر است، و در آن اجتماعات درختچه‌های بزرگ مثل: *Pistacia*, *Ficus carica var. Rupestris*, *Ficus spp.*, *atlantica*, *Pistacia khinjuk* و *Ficus carica var. Johannis* هم مستقر می‌گردند. گونه‌های اخیر سطح ناچیزی را پوشانده‌اند که به صورت نقطه‌ای مشاهده می‌شود. این وضع نشان دهنده اعمال تخریب شدید بر این اجتماعات است. حضور حدود ۲۵۰ چاه زغال‌گیری قدیمی در پارک مؤید این گفتار است. به طوری که قبلاً اشاره شد، نوعی انجیر در پارک سبز می‌شود که به بررسی بیشتر برای تعیین نوع گونه یا واریته نیاز دارد. انجیر در اکثر نقاط پارک در روی ارتفاعات صخره سنگی می‌روید. در چند نقطه همراه با *Pteropyrum* مشاهده شد. قطر درختان انجیر در مواردی تا ۱۵ سانتی‌متر نیز بالغ می‌گردد.

اجتماع *Cousinia piptocephala*: در رویشگاهی که به صورت پشت‌های در بین دو آبراهه بزرگ قرار گرفته، می‌روید و رطوبت کمتری دریافت می‌کند. این اجماع به علت خاردار بودن، مورد توجه حیوانات وحشی نیست و در حال گسترش است. مهم‌ترین اجماع آن عبارت است از:

اجتماع *Artemisia-Peganum*: در نزدیکی اجماع *Cousinia-Peganum* قرار گرفته، و با توجه به رویشگاه و ترکیب گونه‌ها، به نظر می‌رسد در اثر تخریب گونه‌های اصلی اجماع درمنه، گونه دوم در محل استقرار و اجماع حاضر شکل گرفته است. قابل توجه است که گونه اول خاردار بوده و مورد توجه حیوانات وحشی نمی‌باشد.

اجتماع *Convolvulus-Cousinia*: که گونه غالب اول آن *Cousinia* و گونه دوم غالب آن *Convolvulus leiocalycinus* است. هر دو گونه فوق در جاهای مختلف پارک همراه دیگر اجتماعات می‌روید. خود نیز به تنها‌ی اجتماعی را تشکیل داده است، و نسبت به رویشگاه اجماع *Cousinia piptocephala*, آب بیشتری دریافت می‌کند. مسلمی (۱۲) یافت خاک آن را لومی - شنی گزارش کرده، که مقدار سدیم و EC آن بیشتر از اکثر اجتماعات، ولی کمتر از رویشگاه درمنه

مشابهی را انتخاب می‌کنند. تفکیک اجتماعات این سه گونه، به علت کوچک بودن سطح و مقیاس مطالعه محدود نبود. این اجتماعات در کوهپایه‌ها بر روی واریزه‌ها سبز می‌شوند. رویشگاه این اجماع، سنگ‌های درشت زیاد دارد. مهم‌ترین اجتماع آن عبارت است از:

اجتماع *Artemisia-Acantholimon-Artemisia sieberi*: دارای گونه دوم *Acantholimon-Artemisia sieberi* است، که در پارک فراوان است. گونه اول در دشت سر، و گونه دوم در محل‌هایی که از مقدار سنگ کاسته شود و مقداری خاک لخت برای استقرار این گونه حاصل شود، حضور دارد. از نظر اجتماع و ترکیب گونه، نسبتاً غنی از گونه بوده و گونه‌های هر دو اجتماع اصلی را داراست. گونه دوم به صورت موزاییک در داخل گونه اول مستقر شده است.

اجتماع *Alhagi camelorum*: اجماع تک گونه‌ای است، که در مکان‌هایی که خاک عمیق و حاصل خیز و رطوبت آن زیاد باشد، مستقر می‌شود. کوادرات گذاری در این اجماع صورت نگرفت، زیرا سطح آن در پارک محدود بود.

اجتماع *Stipagrostis plumosa*: در خاک‌های سبک شنی مستقر می‌گردد، زیرا بذر آن به راحتی وارد این خاک‌ها می‌شود. در مسیل‌ها که شن زیاد است حضور دارد. گونه اصلی این اجماع همراه دیگر اجتماعات نیز یافت می‌شود. این اجماع فقیر از گونه بوده و در مواردی هم اجماع تک گونه تشکیل می‌دهد. اجتماع آن عبارت است از:

اجتماع *Stipagrostis-Cousinia*: در جنوب پارک در داخل مسیل‌ها مشاهده گردید. اجماع گونه اول از نظر تنوع گونه‌ای بسیار ضعیف است، ولی ترکیب گونه‌ای آن شباهت بیشتری به اجماع *Cousinia* دارد. این اجماع با گسترش شن در منطقه احتمال توسعه دارد، و تاج پوشش آن ضعیف است.

اجتماع *Amygdalus haussknechtii*: با دو گونه *Amygdalus haussknechtii* در روی صخره سنگ‌ها مستقر می‌شود، *Amygdalus lycoides* و جزو اجتماعات کوه سری است. به صورت اجماع پراکنده در ارتفاعات می‌روید، که گونه‌های همراه آن فهرست شده است. در شیب‌های تندتر از ۱۰۰٪، و فقط در شکاف صخره سنگ‌ها که

Amygdalus خاک لای صخره سنگ‌ها را برای استقرار انتخاب می‌کند.

اجتماع *Launaea acanthodes*: در غرب پارک در سطح وسیع می‌روید. بررسی‌های مسلمی (۱۲) نشان می‌دهد که این اجتماع در زمین‌های شنی مستقر می‌شود، رس خاک حدود ۳٪ و لوم آن حدود ۶٪ است. املاح سدیم و EC رویشگاه آن باید در حد پایینی باشد.

اجتماع پرنده *Pteropyrum aucheri*: در مسیلهای مستقر است. این اجتماع در واحدهای کوچکی ظاهر می‌شود، و در مناطق مختلف پارک گسترده است. به علت دسترسی به آب، اندازه گیاهان این اجتماع بزرگ است. بنا به بررسی مسلمی (۱۲)، این رویشگاه کمتر از ۱٪ رس، حدود ۸٪ لوم و ۹۱٪ شن دارد. بدون مشکل شوری بوده، سدیم آن ناچیز و EC آن ۴۵٪ میلی‌موس بر سانتی‌متر است. میانگین کلسیم و منیزیم این خاک‌ها ۶/۷ میلی‌اکی والان در لیتر است، و میزان تاج پوشش گونه اصلی با افزایش میزان آهک خاک گسترده‌تر می‌شود (۱۲).

اجتماع *Peganum harmala*: اجتماعی بیولوژیک است که در اثر تخریب اجتماع درمنه، در رویشگاه آن مستقر می‌شود، و چون مورد توجه حیوانات وحشی قرار نمی‌گیرد، با سرعت گسترش می‌یابد. در اجتماعات تخریب یافته دیگر نیز، که رویشگاه آنها مشکل تجمع املاح نداشته باشد، مستقر می‌گردد. پس هرگز در رویشگاه *Anabasis* استقرار نمی‌یابد. در حالت گسترده، تک اجتماع گونه‌ای ایجاد می‌کند که حدود ۲۴ هکتار مساحت دارد. کواردات‌گذاری در این اجتماع نگرفته است. مهم‌ترین اجتماع آن عبارت است از:

اجتماع *Peganum-Scariola orientalis*: که در اثر چرای مفرط، گونه *Artemisia sieberi* آن از بین رفت، *Peganum* جای آن را فراگرفته و در حال گسترش می‌باشد. ترکیب گونه‌ها شبیه اجتماع *Artemisia-Scariola* است که درمنه آن حذف شده باشد. مساحت این اجتماع ۱۳ هکتار است. فقط فهرست گونه‌ها تهیه شد.

اجتماع *Scariola orientalis*: در محلهای مختلف پارک مستقر

است. مقدار رس رویشگاه این اجتماع تقریباً دو برابر رویشگاه درمنه است. شرایط در این رویشگاه برای استقرار درمنه و *Anabasis aphylla* مناسب نیست، و گونه اخیر به صورت نادر و پراکنده در این اجتماع دیده می‌شود.

اجتماع *Convolvulus-Bunium*: در ارتفاعات کلاه قاضی مستقر است و جزو اجتماعات کوه سری محسوب می‌شود. گونه‌های اصلی آن سه گونه *Convolvulus fruticosus*، *Convolvulus acanthocladus* و *leiocalycinus* بوده و گونه *Bunium caroides* است. به علت پراکنده بودن گیاهان، فقط فهرست برداری از گونه‌ها انجام گرفت.

اجتماع *Tanacetum lingulatum*: که در رویشگاه سنگلاخی و صخره سنگی مستقر است، و آب به صورت سیلاب به محل می‌رسد. این اجتماع آب‌دوست تراز دیگر اجتماعات است.

اجتماع *Ephedra*: در دشت، اجتماعات یکدست را تولید کرده و گاهی هم وارد دیگر اجتماعات می‌شود. گونه‌های مختلف و تعدادی در داخل این اجتماع فهرست برداری شدند. تعدادی از آنها به صورت نادر و اتفاقی در این اجتماع می‌رویند، که این گونه‌ها جزو اجتماعات اطراف است. گونه اصلی این اجتماع *Ephedra strobilacea* است. گونه *Ephedra intermedia* در پارک به صورت نادر می‌روید و اجتماعی تشکیل نمی‌دهد.

اجتماع *Ebenus stellata*: که جزو رویش خلیج و عمانی (۴) است. در روی صخره سنگ‌های گرم و داغ مستقر می‌گردد، و شبیه گون بوده، دارای گل‌های زیبا با شاخه‌های خاردار است. این اجتماع غنی از گونه است، و گونه‌های زیادی هم به صورت گونه‌های نادر اجتماع ظاهر می‌گردند. مهم‌ترین اجتماع آن عبارت است از:

اجتماع *Ebenus-Amygdalus*: در ارتفاعات و بر روی صخره سنگ‌ها مستقر شده، هر کدام از این دو گونه، اجتماعی در رویشگاه‌های مختلف ایجاد کرده است. تنوع گونه‌ای این اجتماع بسیار زیاد بوده و اکرتون مناسبی در ارتفاعات ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ متر از سطح دریا به وجود آورده است. گونه‌های اجتماع *Ebenus* قسمت صخره سنگ‌ها، و گونه‌های اجتماع

در منطقه وجود دارد، که به علت پراکنده بودن آنها در سطح پارک و سطح محدود آنها، و نیز ناچیز بودن تاج پوشش گیاهی از توضیح بیشتر خودداری گردید.

طبق این بررسی، و با توجه به اجتماع و تراکم جمعیت گونه‌های گیاهی، گونه‌های کمیاب پارک را که جمعیت بسیار محدودی دارند، می‌توان به شرح ذیل معرفی کرد: *Lycium depressum*, **Ephedra strobilacea*, *Phragmites australis*, **Ficus sp.*, *Allium minutiflorum*, *Marsdenia erecta*, *Linum album*, *Dendrostellera lessertii*.

این گونه‌ها در طی این مطالعه، فقط در یک یا دو نقطه پارک مشاهده شده و جمعیت آنها بسیار محدود است. البته باید اشاره کرد که بجز گونه‌هایی که با علامت ستاره (*) نشانه گذاری شده، بقیه ممکن است در بیرون از پارک، جمعیت نسبتاً مناسبی داشته باشند و فقط در داخل پارک، گونه نادرند. اما دو گونه ستاره‌دار، جزو گونه‌های کمیاب محسوب می‌گردند، به خصوص گونه *Ficus sp.* که احتمال دارد «اندیمیک» منطقه باشد.

سپاسگزاری

از اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان، به خاطر تأمین هزینه طرح، و از همکاری آفیان مهندس مصطفی قلی نوروزی و دکتر جمال صالحی به خاطر همکاری در شناسایی نمونه‌های گیاهی، و مهندس احمد مختاری، مهندس مجید ایروانی و مهندس مصطفی درویش پوریان برای همکاری در عملیات صحراوی سپاسگزاری می‌شود.

است و به صورت اجتماعات مختلف غنی و فقیر از گونه دیده می‌شود. تیپ فقیر از گونه در اثر تجمع رسوبات سیلانی و سورتر شدن اراضی گونه‌ها تقلیل یافته است. برای استقرار اجتماع، EC خاک باید پایین باشد (۱۲)، که در خاک‌های شنی اتفاق می‌افتد.

اجتماع Scariola-Acantholimon: یکی از اجتماعات گونه Scariola است که در کوهپایه‌ها مستقر می‌شود. چون محل رویشگاه سه گونه *Acantholimon* است (به اجتماع آن مراجعه شود)، لذا با آنها ترکیب می‌گردد.

اجتماع Scariola-Artemisia: که دو گونه اول و دوم آن به وفور در پارک گسترده است. در این رویشگاه با توجه به وضعیت موزاییک خاک که دارای بافت شنی و نیز خاک لومی شنی است، هر دو گونه به اتفاق در کف آبراهه‌ها و مسیل‌ها سبز می‌شوند.

اجتماع Stipa spp.: یا دو گونه *Stipa barbata* و *Stipa parviflora* مشخص می‌شود، که در روی صخره سنگ‌ها تاج پوشش ضعیف ایجاد می‌کند. کوادرات‌گذاری انجام نشد.

اجتماع Zataria-Melica: در آبراهه‌های سنتگلاخی کوهستان مستقر می‌گردد. گونه اصلی آن *Zataria multiflora* و گونه دوم آن *Melica jacquemontii* است.

اجتماعات گیاهان آب‌دوست که در اطراف چشمه‌سارها دیده می‌شوند. در مساحت‌های محدود چند صد متر مریع استقرار یافته‌اند. از مهم‌ترین آنها می‌توان به اجتماعات زیر اشاره کرد: *Cyperus sp.*, *Juncus sp.*, *Salix sp.*، *Aster sp.* و *Phragmites australis* چند اجتماع کوچک و پراکنده دیگر هم

منابع مورد استفاده

- آریاوند، ا. ۱۳۷۵. بررسی مقدماتی اجتماعات گیاهی مناطق حفاظت شده کلاه قاضی واقع در جنوب غربی اصفهان (ایران). مجله زیست‌شناسی ایران ۲(۱): ۳۰-۷.
- آریاوند، ا.، ح. فتح‌پور، م. ت. معینیان و م. ر. محسن‌پور. ۱۳۷۴. بررسی وضعیت گونه‌های نادر جانوری و گیاهی استان اصفهان. اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان (گزارش چاپ نشده). صفحه ۳۲۲.
- بصیری، م. ۱۳۷۴. گونه‌های گیاهی و جانوری استان اصفهان. اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان (گزارش چاپ نشده). ص ۱۱۷ و ۶۷.

۴. جوانشیر، ک. ۱۳۵۵. اطلس گیاهان چوبی ایران. نجمون ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی. ص ۶۶-۶۴.
۵. خواجه الدین، س. ج. و. م. بصیری. ۱۳۶۸. فهرست گیاهان هر باریوم دانشکده کشاورزی منطقه مرکزی. دانشگاه صنعتی اصفهان (گزارش چاپ نشده). ۱۸۷ صفحه.
۶. خواجه الدین، س. ج. و. س. سلطانی کوپایی و. م. درویش پوریان. ۱۳۷۷. نقشه پوشش گیاهی پارک ملی کلاه قاضی. اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان (گزارش چاپ نشده). ۱۵۲ صفحه.
۷. شاردن، ژ. ۱۳۵۴. سیاحت نامه شاردن (ترجمه محمد عباسی). جلد دهم، مؤسسه چاپ و انتشارات امیر کبیر.
۸. قهرمان، ا. ۱۳۷۵. نمایه نامهای علمی ۲۰۰۰ گیاه در فلور رنگی ایران. ج ۱-۱۶. مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مرتع (جهاد سازندگی). ۲۵۴ صفحه.
۹. کریمی، م. ۱۳۶۶. گزارش آب و هوای مرکزی ایران (استان‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد)، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان. ۹۷ صفحه.
۱۰. لطیفیان، م. ح. ۱۳۷۰. پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی. سازمان حفاظت محیط زیست. ۵۲ صفحه.
۱۱. مبین، ص. ۱۳۷۵-۱۳۵۹. رستنی‌های ایران، فلور گیاهان آوندی. انتشارات دانشگاه تهران (۴ جلد).
۱۲. مسلمی، م. ر. ۱۳۷۶. بررسی رابطه پوشش گیاهی و خاک با استفاده از روش اوردیناسیون در پارک ملی کلاه قاضی اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس. ۱۰۶ صفحه.
۱۳. ورزبوم. ۱۳۶۸. مطالعات تفصیلی طرح جامع احیا و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی بخش غربی (زیر حوزه‌های شمالی و جنوبی) از حوزه آبخیز شرق جازموریان. جلد ۳، مرتع. وزارت کشاورزی. ص ۹-۲۰.
14. Goodall, D. W. and R. A. Perry. 1979. Arid-land Ecosystems: Structure, Functioning and Management. Cambridge University Press., Cambridge, Vol 1 & 2.
15. Kershaw, K. A. 1964. Quantitative and Dynamic Plant Ecology. Edward Arnold Ltd., London.
16. Khajeddin, S. J. 1995. A survey of the plant communities of the Jazmorian, Iran, using Landsat MSS data. Unpublished Ph. D. Thesis, University of Reading.
17. Kuchler, A. W. and L. S. Zonneveld. 1988. Vegetation Mapping. Kluwer Academic Publishers Group. The Netherlands.
18. Ministry of Industrial & Mine of Iran. 1978. Geological Map of Isfahan on Scale of 1/250000. Ministry of Industrial & Mine Geological Survey of Iran. 1 sheet map.
19. Moore, P. D. and S. B. Chapman. 1989. Methods in Plant Ecology.. Blackwell Scientific Publications, Oxford.
20. Muller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aimes and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons, New York.
21. Ter Braak Cajo. J. F. 1988. Manual of the CANOCO Software. Scientia Publishing, Budapest.