

## بررسی اثر زمان، میزان و نحوه اعمال تنظیم‌کننده‌های رشد بنزیل آمینو پورین و اسید جیبرلیک بر شکستن خواب بذر گیاه کرفس کوهی

ساره ظفریان\* و سعدالله هوشمند<sup>۱</sup>

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۱۲/۱۶؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۱/۱۸)

### چکیده

کرفس کوهی (*Kelussia odoratissima* M.) یکی از گیاهان دارویی مهم خانواده چتریان و بومی دامنه رشته کوه‌های زاگرس است که به علت برداشت‌های غیرمجاز در معرض انقراض می‌باشد. به منظور تسريع در شکستن خواب بذر این گیاه، آزمایشی در دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی به اجرا در آمد. بذر کرفس کوهی منطقه سرآقاسید، تحت تأثیر سه عامل مدت زمان (۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ روز پس از کشت)، ترکیب تنظیم‌کننده‌های رشد بنزیل آمینو پورین (BAP) (با غلظت صفر، ۰/۷۵ و ۰/۱۵ میلی‌گرم در لیتر) و اسید جیبرلیک (GA<sub>3</sub>) (با غلظت صفر، ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر) و نحوه اعمال تنظیم‌کننده‌های رشد (به دو صورت خیساندن بذرها در محلول هورمونی و اعمال هورمون به‌طور مستقیم در محیط کشت) قرار گرفت. در این آزمایش، ویژگی‌های درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و طول محور زیر لپه بررسی شد. نتایج نشان داد که مدت زمان ۱۰۰ روز پس از کشت به‌طور معنی‌داری (P≤۰/۰۱) در هر سه صفت بیشترین میزان را داشت. به‌طوری‌که میزان جوانه‌زنی ۸۶/۹۴ درصد، طول ریشه‌چه ۹/۴۳ سانتی‌متر و طول محور زیر لپه ۱۱/۶۴ سانتی‌متر بود. ضمن این‌که اثر متقابل عوامل معنی‌دار نبودند. بهترین ترکیب تیماری برای افزایش صفات درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و سرعت جوانه‌زنی، ترکیب تنظیم‌کننده‌های رشد BAP با غلظت L<sub>۰/۷۵ mg/L</sub> و GA<sub>3</sub> با غلظت ۵۰۰ mg/L و اعمال تنظیم‌کننده‌های رشد به‌طور مستقیم در محیط کشت است. برای افزایش صفت طول محور زیر لپه نیز تنها ترکیب GA<sub>3</sub> با غلظت ۵۰۰ mg/L توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول محور زیر لپه

۱. گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

\*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: sare\_zafarian@yahoo.com

کاهش می‌دهد (۵). استفاده از اسید جیرلیک (GA<sub>3</sub>) برای کنترل خواب اولیه بذرها پیشنهاد شده و از آن به عنوان محرک جوانه‌زنی یاد می‌شود (۶). استفاده از GA<sub>3</sub> جوانه‌زنی دانه‌های تیره چتریان و سایر تیره‌های گیاهی که در جوانه‌زنی به نور و سرما احتیاج دارند را تسهیل می‌نماید (۶، ۱۰ و ۱۱). محققین دیگر نیز بر تأثیر اسید جیرلیک بر جوانه‌زنی بذرها گونه‌های مختلف از سایر تیره‌های گیاهی تأکید نموده‌اند (۶، ۱۰ و ۳۰). سایتوکینین‌ها نیز در برطرف نمودن خواب بذرها مؤثرند (۲۱). مثلاً سایتوکینین‌ها باعث تسریع خواب‌شکنی بذر کرفس زراعی می‌شوند (۳ و ۲۵). نبئی و همکاران (۲۰۱۱) گزارش کردند که این هورمون‌ها در افزایش درصد جوانه‌زنی بذر ریواس مؤثرند (۲۰). در بررسی زمانی (۳۱) به منظور شکستن خواب بذر آنگوزه، تیمار ۰/۲۵ میلی‌گرم در لیتر هورمون BAP به همراه ۲۸ روز سرماده‌ی، بهترین تیمار تشخیص داده شد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر غلاظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بنزیل آمینو پورین و اسید جیرلیک و نحوه اعمال این هورمون‌های گیاهی در شکستن خواب بذر گیاه کرفس کوهی اجرا گردید.

## مواد و روش‌ها

این پژوهش در آذر ماه سال ۱۳۸۹ در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، به منظور شکستن خواب بذر گیاه کرفس کوهی، از توده سرآقاسید، از توابع استان چهارمحال و بختیاری، جمع‌آوری شده در سال ۱۳۸۸ (تهیه شده از منابع طبیعی فارسان) انجام شد. به منظور آماده‌سازی بذرها، پس از حذف ناخالصی‌ها، جهت حذف بذرها پوک، بذرها به مدت ۳۰ دقیقه در بشر حاوی آب مقطر ریخته و هر ۱۰ دقیقه هم زده شدند و نهایتاً بذرها بیکی که پس از ۳۰ دقیقه در سطح آب باقی ماندند، حذف گردیدند. جهت حذف آلودگی‌های سطحی، بذرها چند مرتبه با آب معمولی شسته شده و به مدت ۱۰ دقیقه روی همزن مغناطیسی قرار داده شدند. به منظور شستشوی مواد بازدارنده و کاهش مقاومت پوسته بذر، بذرها به مدت ۲۴ ساعت در برابر

## مقدمه

کرفس کوهی با نام علمی *Kelussia odoratissima* M. و نام محلی کلوس، گیاهی چند ساله، از خانواده چتریان است. این گیاه مرتعی و بومی ایران در دامنه رشته کوه‌های زاگرس می‌روید، از دیدگاه اقتصادی، اکولوژیک و تنوع زیستی دارای اهمیت فراوان است و آثار درمانی فراوانی برای آن گزارش شده است. این گیاه دارویی، دارای اثر ضد درد، ضد التهاب، آرام‌بخش و ضد سرفه می‌باشد (۸) و در درمان سرماخوردگی، رماتیسم، چربی خون، فشار خون و ناراحتی‌های قلبی و عروقی استفاده می‌شود (۱). هم‌چنین به علت عطر و اسانس خوبی که کرفس کوهی دارد، می‌توان از آن در صنایع غذایی و بهداشتی استفاده کرد. از دیدگاه اکولوژیک، این گیاه با ایجاد تاج، پوشش وسیع و ریشه ضخیم خود باعث حفاظت خاک شده و از فرسایش خاک جلوگیری می‌کند. بنابراین، می‌تواند تأثیر به سزاگی در حفظ آب و خاک نیز ایفا کند (۸). اما متأسفانه به علت برداشت غیرمجاز، در معرض انقراض می‌باشد. به طوری که گزارش شده که بیش از ۹۰٪ از رویشگاه‌های گیاه مزبور از بین رفته است (۱۳).

یکی از جنبه‌های مورد بررسی در جلوگیری از انقراض، شرایط مورد نیاز برای جوانه‌زنی و تعیین نیازهای اکولوژیک گیاه است (۹). به منظور سرعت بخشیدن به جوانه‌زنی می‌توان بذرها را تحت تیمارهای مختلف قرار داد و مناسب‌ترین شرایط را برای شکستن خواب بذر در هر گونه مشخص کرد (۱۸). مطالعات انجام شده روی گونه‌های خانواده چتریان، مواد بازدارنده شیمیایی را به عنوان عامل اصلی در عدم جوانه‌زنی و یکنواختی بذر دانستند (۱۲). مواد بازدارنده درونی در خواب بذرها بیکی که احتیاج به سرما دارند نقش مهمی ایفا می‌کنند (۲۸). در بسیاری از بذرها نیازمند سرما، سرماده‌ی باعث افزایش میزان تولید هورمون‌های محرک رشد می‌شود (۱۶)، به طوری که به کاهش مقادیر آبسیزیک اسید و افزایش GA<sub>3</sub> در بذر منجر شده و جوانه‌زنی را تحریک می‌کند. به همین دلیل، کاربرد جیرلین خارجی، طول دوره سرمای مورد نیاز این بذرها را

هد لامینار به محلول اضافه شد. نهایتاً، پس از کشت، درب پتري‌ها با پارافilm مسدود و به یخچال با دمای ۴ درجه سلسیوس منتقل و نگهداری شدند.

درصد جوانه‌زنی و خروج ریشه‌چه به طول یک میلی‌متر معیار جوانه‌زنی قرار گرفت و درصد جوانه‌زنی بر مبنای نسبت تعداد بذر جوانه‌زده به تعداد کل بذرها به دست آمد (۲۴). سرعت جوانه‌زنی براساس فرمول  $N/\sum(n/t)$  اندازه‌گیری شد (۱۷)، که در آن  $n =$  تعداد بذرهايی که جديداً در زمان  $t$  جوانه زده‌اند،  $t =$  تعداد روز پس از کاشت و  $N =$  تعداد کل بذر. طول ریشه‌چه (فاصله انتهای ریشه‌چه تا ابتدای محور زیر لپه) و طول محور زیر لپه (فاصله انتهای محور زیر لپه تا ابتدای دمبرگ) با استفاده از کولیس دیجیتال و بر حسب میلی‌متر اندازه‌گیری گردیدند.

داده‌های حاصل از آزمایش با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS 9.0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت رسم نمودارها نیز از نرم‌افزار Excel 2007 استفاده شد و مقایسه میانگین‌ها با آزمون فیشر، LSD انجام گردید.

## نتایج و بحث

در این بررسی، هیچ یک از بذرها در زمان ۲۵ روز پس از کشت جوانه نزدند. لذا از تجزیه و تحلیل آماری کنار گذاشته شدند. نتایج حاصل برای صفات درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول محور زیر لپه در ۴ دوره زمانی و سرعت جوانه‌زنی پس از طی ۱۰۰ روز پس از کشت در زیر شرح داده خواهند شد.

### درصد جوانه‌زنی

نتایج تجزیه واریانس (جدول ۱) نشان می‌دهد که درصد جوانه‌زنی به طور معنی‌داری ( $P < 0.01$ ) تحت تأثیر عوامل زمان، هورمون و نحوه اعمال هورمون قرار گرفت ولی هیچ یک از اثرهای متقابل این عوامل بر درصد جوانه‌زنی معنی‌دار نشدند.

جریان آب قرار گرفتند. پس از آن، مجدداً به مدت ۱۰ دقیقه روی همزن مغناطیسی حاوی آب مقطر قرار داده شدند. جهت ضد عفونی بذرها از یک روش سه مرحله‌ای شامل: ۱) قرار دادن بذرها به مدت یک دقیقه در اتانول ۷۰٪، ۲) انتقال آنها به محلول هیپوکلرید سدیم ۱۰٪ به مدت ۱۰ دقیقه همراه با تکان شدید دستی و ۳) پنج مرتبه شستشو با آب مقطر استریل، هر بار به مدت ۵ دقیقه، در زیر هود لامینار استفاده شد (۸). پس از آن بذرهاي ضد عفونی شده، با گاز استریل خشک گردیدند. در این آزمایش، به بررسی اثر فاکتورهای زمان (چهار دوره زمانی ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ روز پس از کشت)، دو هورمون BAP در سه غلظت (صفر، ۰/۷۵ و ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر) و GA<sub>3</sub> در سه غلظت (صفر، ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر) و نحوه اعمال هورمون (به دو صورت خیساندن بذرها پس از ضد عفونی به مدت ۲۴ ساعت در محلول هورمونی و اعمال هورمون به طور مستقیم در محیط کشت)، پرداخته شد.


آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی، با ۴ تکرار اجرا شد. هر واحد آزمایشی شامل یک پتري دیش استریل با قطر ۹ و ارتفاع ۱/۵ سانتی‌متر بود. به دلیل حساسیت بذرهاي کرفس کوهی به قارچ‌کش و عدم استفاده از آن، سعی گردید با ایجاد فاصله بین بذرها از انتقال آلودگی احتمالی تا حد زیادی جلوگیری گردد و لذا تعداد ۱۵ بذر در هر پتري دیش کشت شد.

به علت طولانی بودن زمان شکسته شدن خواب بذر، تهیه بستر مناسب مهم است، چرا که نیاز به دفعات مکرر آبیاری و باز شدن درب پتري‌ها باعث بالا رفتن میزان آلودگی می‌شود. بنابراین، از محیط کشت اتوکلاو شده حاوی آب مقطر و آگار به میزان ۶ گرم در لیتر استفاده شد. از آنجا که هورمون GA<sub>3</sub> جزو هورمون‌هایی است که قابلیت اتوکلاو شدن ندارد (۳۱)، در اعمال تیمارهای هورمون به صورت خیساندن و به طور مستقیم، پس از اتوکلاو نمودن محیط کشت حاوی آب مقطر، آگار و هورمون BAP، زمانی که دمای محلول به ۴۰ درجه سلسیوس رسید هورمون GA<sub>3</sub> با استفاده از فیلتراسیون و در زیر

جدول ۱. نتایج تجزیه واریانس عوامل مورد بررسی بر صفات درصد جوانهزنی، طول ریشه‌چه و طول محور زیرلپه


میانگین مربعات			درجه آزادی	منبع تغییر
طول محور زیرلپه	طول ریشه‌چه	درصد جوانهزنی		
۲۴۸۳/۸۴ **	۱۱۴۷/۶۲ **	۷۴۶۵۸/۳۲ **	۲	زمان (A)
۲/۸۷ *	۳/۹۳ *	۶۲۲/۷۹ **	۸	هورمون (B)
۳/۶۷ ns	۸/۴۳ *	۱۱۲۶/۸۲ **	۱	نحوه اعمال هورمون (C)
۰/۸۴ ns	۰/۹۱ ns	۱۴۴/۳۵ ns	۱۶	A* B
۰/۴۶ ns	۰/۲۹ ns	۱۵/۰۲ ns	۲	A* C
۰/۴۷ ns	۰/۱۷ ns	۴۹/۹۰ ns	۸	B* C
۰/۳۹ ns	۰/۱۷ ns	۹ ns	۱۶	A* B* C
۱/۲	۱/۶۷	۱۲۵/۷۸	۱۶۲	خطا
۲۱/۷۷	۲۶/۳۱	۱۹/۱۸		Cv

ns: بـه ترتیب معنی دار در سطوح احتمال ۱٪ و ۵٪ و بدون اختلاف معنی دار \*\*\*: و

شکل ۱. تأثیر زمان بر میانگین درصد جوانهزنی بذر. حروف غیریکسان بیانگر وجود تفاوت معنی دار در آزمون ( $LSD_{0.01} = ۴/۸۷$ ) است.

برای جوانهزدن را برطرف نماید (۲۷). مقایسه میانگین درصد جوانهزنی در زمانهای مختلف هورمونی در شکل ۲ آورده شده است. هورمون BAP با غلظت ۰/۷۵ میلی گرم در لیتر در ترکیب با هر سه غلظت هورمون GA<sub>3</sub> (صفر، ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم در لیتر) بیشترین میزان جوانهزنی را دارد و بیشترین این مقدار را هورمون BAP با غلظت ۰/۰۷۵ میلی گرم در لیتر در ترکیب با GA<sub>3</sub> در غلظت ۵۰۰ میلی گرم در لیتر و با ۶۵/۲۷ درصد داراست. هورمون BAP با غلظت ۱/۵ میلی گرم در لیتر نیز در شرایط ترکیب با هورمون

مقایسه میانگین درصد جوانهزنی در زمانهای مختلف (شکل ۱) بیانگر روند افزایشی و معنی دار گذشت زمان بر درصد جوانهزنی است. کمترین درصد جوانهزنی (۲۳/۵۱) درصد (مربوط به ۵۰ روز پس از کشت است و با گذشت زمان به ۱۰۰ روز، درصد جوانهزنی به حداقل مقدار ۸۶/۹۴ درصد رسید. در گونه *Chaerophyllum temulum* که هم خانواده کرفس کوهی است نیز رشد جنین فقط در یک دوره سرماده‌ی طولانی در دمای ۵ درجه سلسیوس اتفاق می‌افتد و استفاده از در دمای ۲۳ درجه سلسیوس نمی‌تواند نیاز سرمایی بذر GA<sub>3</sub>




شکل ۲. تأثیر هورمون بر میانگین درصد جوانهزنی بذر. حروف غیریکسان بیانگر وجود تفاوت معنی دار در آزمون ( $LSD_{0.01} = 8/43$ ) است.

نیست (۱۹). اگر تنها اثر سرما، افزایش میزان  $GA_3$  در بذر بود، استفاده از  $GA_3$  خارجی باید باعث سرعت بخشیدن به خوابشکنی بذر می‌گردید. ولی همان‌گونه که توضیح داده شد، در مورد کرفس کوهی، استفاده از این هورمون هیچ تأثیر مثبتی بر جوانهزنی بذر نداشته است. بنابراین، سرما علاوه بر افزایش  $GA_3$  درون‌زاد و تحریک رشد جنبین تکامل نیافته، نقش مهمی در تهیه محرك‌های لازم برای برطرف نمودن خواب بذر ایفا می‌کند که هنوز برای ما آشکار نشده است (۴).


همان‌طورکه در شکل ۳ مشاهده می‌شود، میزان جوانهزنی در دو حالت نحوه اعمال هورمون مورد بررسی تفاوت معنی داری نشان می‌دهد. به طوری که بذرهای خیسانده شده در هورمون به مدت ۲۴ ساعت، میزان جوانهزنی کمتر (۵۶/۱۷) درصد و بذرهای کشت شده در محیط کشت حاوی هورمون با (۶۰/۷۳) درصد، میزان جوانهزنی بیشتری را نشان می‌دهند. این نتیجه می‌تواند به دلیل وجود مستقیم هورمون در محیط کشت و استفاده از آن توسط بذرها طی مدت آزمایش باشد.

زمانی (۲۰۰۸) برای شکستن خواب بذر گیاه آنفوزه از ترکیب هورمونی  $BAP$  و  $GA_3$  به صورت محلول در محیط کشت (۳۱) و ولی وند (۲۶) برای شکستن خواب بذر کرفس کوهی از هورمون  $GA_3$  به صورت خیساندن بذرها در محلول به مدت ۲۴ ساعت استفاده کردند.

$GA_3$  (با غلظت ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر) باعث افزایش درصد جوانهزنی گردید و به تنها یی میزان جوانهزنی کمتری دارد. کمترین درصد جوانهزنی ۵۳/۳۳ درصد است که مربوط به هورمون  $GA_3$  در هر دو غلظت ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر است، و نشان‌دهنده عدم تأثیر این هورمون بر افزایش جوانهزنی بذرهای کرفس کوهی است. در آزمایشی که نئی و همکاران (۲۰) روی شکستن خواب بذر ریواس انجام دادند، اشاره شده که با افزایش مدت زمان سرما، مرتبًا به طور صعودی بر میزان جوانهزنی افزوده شده است. هم‌چنین، در این آزمایش، هورمون کیتین که نوعی سایتوکینین است باعث افزایش معنی دار درصد جوانهزنی شد. تأثیر تلفیقی اسید جیبریلیک و سرما‌دهی مرتبط بر شکستن خواب بذر این گیاه نیز افزایش معنی داری بر درصد جوانهزنی نشان داد (۲۰). در حالی که این هورمون تأثیر معنی داری بر افزایش جوانهزنی بذر کرفس کوهی نشان نداده است (۲۶). مطالعات نشان می‌دهد که سایتوکینین‌ها باعث افزایش فعالیت جیبریلین در سیستم بذر کرفس زراعی شده و منجر به تسريع خوابشکنی آن می‌شود (۳ و ۲۵). والک و هدایتی (۲۹) در مطالعات خود دریافتند که حضور  $GA_3$  جانشین مناسبی برای سرما در خواب بذرهای گونه *Osmorrhiza depauperata* نمی‌باشد. برای جوانه‌دار کردن بذرهای گلپر نیز  $GA_3$  محرك خوبی برای جوانهزنی بذرها



شکل ۳. تأثیر نحوه اعمال هورمون بر میانگین درصد جوانه‌زنی بذر. حروف غیریکسان بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار در آزمون  $LSD_{0.01}=3/97$  است.



شکل ۴. تأثیر زمان بر میانگین طول ریشه‌چه بذر. حروف غیریکسان بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار در آزمون  $LSD_{0.01}=0/56$  است.


تأثیر هورمون  $GA_3$  بر افزایش طول ریشه‌چه در نمودار مقایسه میانگین ۵ کاملاً مشهود است. به طوری که با افزایش غلظت این هورمون، طول ریشه‌چه روند افزایشی نشان می‌دهد. در حالی که هورمون  $BAP$  تأثیر معنی‌داری بر طول ریشه‌چه ندارد. به طور کلی، کوتاه‌ترین طول ریشه‌چه مربوط به شاهد و بلندترین طول مربوط به ترکیب  $GA_3$  با غلظت ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر و با غلظت ۷۵۰ میلی‌گرم در لیتر می‌باشد که به ترتیب برابر  $4/38$  و  $5/43$  میلی‌متر است.  $GA_3$  هورمونی است که به سرعت تقسیم سلولی را به صورت طولی افزایش می‌دهد (۱۴). در بررسی ولی وند (۲۶) نیز هورمون  $GA_3$  به تنها یک باعث افزایش طول ریشه‌چه گیاه کرفس کوهی شد.

شکل ۶ مربوط به مقایسه میانگین نحوه اعمال هورمون بر طول ریشه‌چه است که نشان‌دهنده برتری اعمال هورمون


#### طول ریشه‌چه

نتایج تجزیه واریانس (جدول ۱) بیانگر تأثیر معنی‌دار عوامل زمان ( $P<0/05$ ), هورمون و نحوه اعمال هورمون ( $P<0/05$ ) بر طول ریشه‌چه می‌باشد. مقایسه میانگین مدت زمان بر طول ریشه‌چه حاکی از تأثیر معنی‌دار این تیمار بر این صفت است (شکل ۴).

در این مقایسه، میانگین کوتاه‌ترین طول ریشه‌چه مربوط به زمان ۵۰ روز پس از کشت و بلندترین طول ریشه‌چه مربوط به ۱۰۰ روز پس از کشت است که به ترتیب  $1/83$  و  $9/43$  میلی‌متر می‌باشند. افزایش طول دوره سرماده‌ی مرطوب به عنوان عاملی محرک باعث افزایش ستز  $GA_3$  در بذرها می‌شود (۲۲). لذا افزایش طول دوره سرماده‌ی باعث افزایش طول ریشه‌چه می‌گردد.



شکل ۵. تأثیر هورمون بر میانگین طول ریشه‌چه بذر. حروف غیریکسان بیانگر وجود تفاوت معنی دار در آزمون ( $LSD_{0.05}=0.73$ ) است.




شکل ۶. تأثیر نحوه اعمال هورمون بر میانگین طول ریشه‌چه بذر. حروف غیریکسان بیانگر وجود تفاوت معنی دار در آزمون ( $LSD_{0.05}=0.34$ ) است.

(شکل ۷) نشان می‌دهد که افزایش مدت زمان، بلند شدن طول محور زیر لپه را در پی دارد. در این مقایسه، میانگین کمترین و بیشترین طول محور زیر لپه به ترتیب مربوط به مدت زمان ۵۰ روز پس از کشت با میانگین  $0.38 \text{ میلی‌متر}$  و  $1.00 \text{ روز}$  پس از کشت با میانگین  $11.64 \text{ میلی‌متر}$  می‌باشند. افزایش طول دوره سرماده‌ی به‌دلیل افزایش میزان تولید هورمون‌های محرک رشد نظریه اسید جیبریلیک و سایتوکینین‌ها (۱۶) و همچنین وجود این دو هورمون در این آزمایش، باعث افزایش رشد محور زیر لپه گردیده است.


به صورت محلول در محیط کشت است. به طوری که ریشه‌چه‌های بلندتر با میانگین  $5/11 \text{ میلی‌متر}$  مربوط به این تیمار است و تیمار خیساندن بذر در هورمون ریشه‌چه‌های کوتاه‌تری با میانگین طولی  $4/72 \text{ میلی‌متر}$  تولید کردند، که می‌توان گفت دسترسی مدامن بذر به هورمون می‌تواند علت آن باشد.

#### طول محور زیر لپه

نتایج تجزیه واریانس طول محور زیر لپه (جدول ۱) نشان‌دهنده تأثیر معنی دار زمان در سطح  $1\%$  و هورمون در سطح  $5\%$  بر این صفت می‌باشد. مقایسه میانگین زمان بر طول محور زیر لپه



شکل ۷. تأثیر زمان بر میانگین طول محور زیر لپه بذر. حروف غیریکسان بیانگر وجود تفاوت معنی دار در آزمون ( $LSD_{0.01}=0.47$ ) است.



شکل ۸. تأثیر هormون بر میانگین طول محور زیر لپه بذر. حروف غیریکسان بیانگر وجود تفاوت معنی دار در آزمون ( $LSD_{0.05}=0.62$ ) است.

طول محور زیر لپه گیاه کرفس کوهی می شود. این نتیجه با بررسی ولی وند (۲۶) روی همین گیاه هم خوانی دارد. منجر به افزایش تقسیمات سلولی و طویل تر شدن سلول می گردد. این هormون همچنین باعث افزایش انعطاف پذیری دیواره سلولی شده (۲) و اثر مثبتی بر افزایش طول گیاه دارد (۱۵ و ۲۳).


**سرعت جوانه زنی**  
نتایج تجزیه واریانس (جدول ۲) تأثیر معنی دار هormون

با مقایسه میانگین هormون بر طول محور زیر لپه (شکل ۸) نیز کمترین و بیشترین طول محور زیر لپه مشخص شده است که به ترتیب مرتب به تیمار شاهد (۴/۵۶ میلی متر) و تیمار هormونی GA<sub>3</sub> با غلظت ۵۰۰ میلی گرم در لیتر (۵/۶۳ میلی متر) می باشد. نکته ای که در اینجا مشهود است، برتری هormون GA<sub>3</sub> در هر دو غلظت ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم در لیتر نسبت به حالت ترکیبی این هormون با همین غلظت ها با هormون BAP است. به طور کلی، هormون BAP تأثیر معنی داری بر طول محور زیر لپه ندارد. ولی افزایش غلظت هormون GA<sub>3</sub> باعث افزایش

جدول ۲. تجزیه واریانس عوامل مورد بررسی بر سرعت جوانهزنی

منبع تغییر	درجه آزادی	میانگین مربعات
هورمون	۸	۰/۰۰۳۷**
نحوه اعمال هورمون	۱	۰/۰۰۷۷*
هورمون × نحوه اعمال هورمون	۸	۰/۰۰۰۲ ns
خطا	۵۴	۰/۰۰۱۲
Cv		۱۵/۷۴

ns: به ترتیب معنی‌دار در سطوح احتمال ۱٪ و ۵٪ و بدون اختلاف معنی‌دار \*\*؛

شکل ۹. تأثیر هورمون بر میانگین سرعت جوانهزنی بذر. حروف غیریکسان بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار در آزمون ( $LSD_{0.01}=0.046$ ) است.

تأثیر معنی‌دار نحوه اعمال هورمون بر سرعت جوانهزنی در شکل ۱۰ مشخص است. طبق این نمودار، خیساندن بذرها در هورمون نسبت به محلول در محیط کشت سرعت جوانهزنی کمتری دارد و برابر ۲۱٪ عدد در روز است. در حالی که در شرایط محلول در محیط کشت ۲۳٪ عدد در روز می‌باشد.


### نتیجه‌گیری

در این آزمایش، کلیه صفات در زمان ۱۰۰ روز پس از کشت بهترین عملکرد را داشتند. در حضور ۷۵ میلی‌گرم در لیتر BAP، درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی میزان بیشتری نشان دادند و اعمال هورمون  $GA_3$  با غلظت ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر باعث افزایش طول ریشه‌چه و محور زیر لپه شد. هم‌چنان، در شرایط هورمون محلول در محیط کشت، درصد جوانهزنی،

(P) و نحوه اعمال هورمون (۰/۰۵ < P) را بر سرعت جوانهزنی نشان می‌دهد.

مقایسه میانگین تأثیر هورمون بر سرعت جوانهزنی (شکل ۹) نشان می‌دهد که وجود هورمون BAP باعث افزایش معنی‌داری در سرعت جوانهزنی می‌شود و به‌طور کلی این هورمون با غلظت ۷۵ میلی‌گرم در لیتر برتری دارد.

هورمون  $GA_3$  به تنهایی تأثیر معنی‌داری بر این صفت نشان نمی‌دهد. در این شکل، تیمار شاهد با سرعت جوانهزنی ۰/۱۹۲ عدد در روز کمترین و هورمون BAP با غلظت ۷۵ میلی‌گرم در لیتر در ترکیب با هورمون  $GA_3$  با غلظت ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر و با ۲۵٪ عدد در روز بیشترین سرعت جوانهزنی را دارد. تیمار بذر با سایتوکنین باعث افزایش سرعت جوانهزنی در بذر ریواس شده است (۲۰).



شکل ۱۰. تأثیر نحوه اعمال هورمون بر میانگین سرعت جوانه‌زنی بذر. حروف غیریکسان بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار در آزمون (LSD<sub>0.05</sub>=۰/۰۱۶) است.

سرعت جوانه‌زنی با غلظت ۰.۷۵ mg/L BAP، هورمون GA3 با غالظت ۵۰۰ mg/L و اعمال هورمون به طور مستقیم در محیط کشت است که با افزایش زمان این صفات روند صعودی داشتند.

سرعت جوانه‌زنی و طول ریشه‌چه به طور معنی‌داری عملکرد بهتری داشتند. به طور کلی، بهترین ترکیب تیماری توصیه شده برای بهبود و افزایش کلیه صفات مربوط به ترکیب هورمون

#### منابع مورد استفاده

- Ahmadi, F. 1384. The effect of antioxidant *Kelussia odoratissima* on the several model systems in sunflower oil with the identification of aromatic compounds. MSc. Thesis, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. (In Farsi).
- Bagheri, H. and P. Azadi. 2002. Plant Tissue Culture, Techniques and Experiments. Jihad-e- Mashhad University. (In Farsi).
- Biddington, N. L. and T. H. Thomas. 1978. Thermodormancy in celery seed and its removal by cytokinins and gibberellins. *Physiologia Plantarum* 42(4): 401-405.
- Bretzloff, L.V. and N. E. Pellett. 1979. Effect of stratification and gibberellic acid on the germination of *Carpinus caroliniana* Walt. *Scientia Horticulturae* 14(5): 621-622.
- Chiwocha, S. D., A. J. Cutler, S. R. Abrams, S. J. Ambrose, J. Yang, A. R. Ross and A. R. Kermode. 2005. The mutation in *Arabidopsis thaliana* affects the abscisic acid, auxin, cytokinin and gibberellin metabolic pathways during maintenance of seed dormancy, moist chilling and germination. *Plant Journal* 42: 35-48.
- Eastmond, P. J. and R. Jones. 2005. Hormonal regulation of gluconeogenesis in cereal aleurone is strongly cultivar-dependent and gibberellins action involves SLENDER1 but not GAMYB. *Plant Journal* 44: 483-493.
- El-Dengawy, E. F.A. 2005. Promotion of seed germination and subsequent seedling growth of loquat (*Eriobotrya japonica* Lindl) by moist-chilling and GA3 applications. *Scientia Horticulturae* 105: 331-342.
- Forozandeh, A. 1386. The study practical methods of production and crop cultivation of *Kelussia odoratissima* M. (Klose). Management and Planning Organization of Chahar Mahal & Bakhtiari. (In Farsi).
- Jaberolansar, Z. 2005. Evaluation of genetic diversity of the KOM using chromosomal characteristics and traits of seed germination. MSc Thesis, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
- Gupta, V. 2003. Seed germination and dormancy breaking techniques for indigenous medicinal and aromatic plants. *Journal of Medicinal and Aromatic Plants Science* 25: 402-407.
- Hairong, W., G. Dongsheng and L. Xianli. 2005. Effects of plant growth regulators on content of phenolics in sweet cherry dormant flower buds and seed dormancy. *Acta Horticulturae* 32: 584-588.
- Kato, T., M. Kobayashi, N. Sasaki, Y. Kitahara and N. Takahashi. 1978. The coumarin herecленол as a growth inhibitor in parsley seed. *Phytochemistry* 17: 158-159.
- Khademi, K. 1387. Klose. <http://kelussia.blogfa.com/>
- Khoshkhoi, M., B. Sheibani, A. Rohani and A. A. Tafazoli. 2004. Principles of Horticulture. Shiraz University Publications.

15. Lahouti, M., M. Zare Hassan Abadi and R. Ahmadiyan. 2003. Biochemistry and Physiology of Plant Hormones. Ferdowsi University Publications.
16. Madam, B., M. Rahemi, A. Mousavi and P. Martinez-Gómez. 2011. Evaluation of the behavior of native Iranian almond species as rootstocks. *International Journal of Nuts and Related Sciences* 2(3): 29-34.
17. Maguire, J. D. 1962. Speed of germination in selection and evolution for seeding vigor. *Crop Science* 2: 176-177.
18. Mahmoodzadeh, A., M. V. Nojavan and Z. Bagheri. 1382. The effect of different treatments on seeds dormancy and germination of wild pigweed seeds. *Shahid Chamran University of Ahvaz* 25: 13-26.
19. Moravcova, L., I. Perglova, P. Pysek, V. Jarosik and J. Pergl. 2005. Effects of fruit position on fruit mass and seed germination in the alien species *Heracleum mantegazzianum* (Apiaceae) and the implications for its invasion. *Acta Oecologica* 28:1-10.
20. Nabaei, M., P. Roshandel and A. Mohammadkhani. 2011. Effective techniques to break seed dormancy and stimulate seed germination in *Rheum ribes* L. *Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants* 27 (2): 212-223.
21. Naidu, C. V. and G. Rajendrudu. 2001. Influence of kinetin and nitrogenous salts on seed germination of red sanders (*Pterocarpus santalinus*). *Seed Science and Technology* 29: 669-672.
22. Powell, L.E. 1987. Hormonal aspects of bud and seed dormancy in temperate-zone woody plants. *HortScience* 22: 845-850.
23. Salehi Eskandari, B. and M. Kharati kawaii. 2002. Review of Plant Physiology. Hayat Nasir Institute.
24. Scott, S. J., R. A. Jones and W. A. Williams. 1984. Review of data analysis methods for seed germination. *Crop Science* 24: 1192-1199.
25. Thomas, T. H. and J. Y. Staden. 1995. Dormancy break of celery (*Apium graveolens* L.) seeds by plant derived smoke extract. *Plant Growth Regulation* 17: 195-198.
26. Valivand, M. 2009. Steady seed dormancy and effect of priming on germination seeds of *Kelussia odoratissima* M. MSc. Thesis, Shahrekord University, Shahrekord, Iran. (In Farsi).
27. Vandeloek, F., N. Bolle and J. A. Van Assche. 2007. Seed dormancy and germination of the European *Chaerophyllum temulum* (Apiaceae), a member of a Trans-Atlantic Genus. *Annals of Botany* 100(2): 233-239.
28. Villiers, T. A. 1978. Dormancy and the Survival of Plants. Edward Arnold Publisher, Ltd., London.
29. Walck, J. L. and S. N. Hidayati. 2004. Germination ecophysiology of the Western North American species *Osmorrhiza deuperata* (Apiaceae): Implications of preadaptation and phylogenetic niche conservatism in seed dormancy evolution. *Seed Sciences Research* 14: 387-394.
30. Walck, J. L., S. N. Hidayati and N. Okagami. 2002. Seed germination ecophysiology of the Asian species *Osmorrhiza aristata* (Apiaceae): Composition with its North America congeners and implication for evolution of type of dormancy. *American Journal of Botany* 89: 829-835.
31. Zamani, A. 2008. Mass production of medicinal plants of *Ferula gommusa* using tissue culture techniques. MSc. Thesis, Shahrekord University, Shahrekord, Iran. (In Farsi).