

تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات زراعی و عملکرد ریحان

(Ocimum basilicum L.) در کشت مخلوط با لوبيا چشمبلبلی

(Vigna unguiculata L.) و رقابت با علفهای هرز

هدی آبادیان^{۱*}، مهرداد یارنیا^۲، همت الله پیردشتی^۳ و رحمت عباسی^۴

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۸/۶؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۵/۲۲)

چکیده

بهمنظور بررسی خصوصیات زراعی ریحان در کشت مخلوط با لوبيا چشمبلبلی، آزمایشی بهصورت کرت‌های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دو سال زراعی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا شد. عوامل مورد مطالعه شامل کنترل و عدم کنترل علفهای هرز، سه سطح کود نیتروژن (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) و ترکیب‌های مختلف کاشت شامل کشت خالص ریحان و لوبيا چشمبلبلی، کشت مخلوط افزایشی ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد ریحان بودند. در کنترل علفهای هرز، بالاترین عملکرد لوبيا چشمبلبلی (۶۸۴/۷۲ کیلوگرم در هکتار) و ماده خشک ریحان (۴۲۰/۳۷ کیلوگرم در هکتار) بهترتیب به نسبت افزایشی ۲۵ درصد و ۵۰ درصد ریحان همراه با مصرف ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار اختصاص یافت. بالاترین عملکرد انسانس در کنترل و عدم کنترل علفهای هرز ۶۹/۲۴ و ۷۰/۴۰ درصد نسبت به کشت خالص ریحان بهترتیب به کشت مخلوط افزایشی ۵۰ درصد و ۲۵ درصد ریحان همراه با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن اختصاص یافت. هم‌چنین وزن خشک اندام رویشی و عملکرد انسانس ریحان در تیمارهای کشت خالص به‌طور معنی‌داری بیشتر از تیمارهای کشت مخلوط بود. با این وجود، درصد برگ و نسبت برگ و گل به ساقه در گیاه ریحان، در تیمارهای کشت خالص، به‌طور معنی‌داری کمتر از تیمارهای کشت مخلوط بود. در شرایط رقابت با علفهای هرز، گیاه ریحان در ۲۵ درصد نسبت افزایشی همراه با ۱۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار، بیشترین درصد ساقه (۶۲/۱۸) و بیشترین ماده خشک (۱۶۰/۹۵ کیلوگرم در هکتار) را نسبت به بقیه تیمارها داشت. ارزیابی حداقل بهره‌وری سیستم (LER = ۱/۳۱) و نسبت برابری زمین (۱۵۱/۷) بهمقدار افزایشی ۵۰ درصد ریحان در کشت مخلوط با لوبيا چشمبلبلی همراه با ۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و کنترل علفهای هرز اختصاص یافت که نشان‌دهنده برتری کشت مخلوط نسبت به کشت خالص آنها بود.

واژه‌های کلیدی: کشت مخلوط، ریحان، عملکرد انسانس، شاخص بهره‌وری سیستم، نسبت برابری زمین

۱ و ۲. دانشجوی دکترا و دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

۳ و ۴. دانشیار و استادیار، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

*. مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: abadianh@yahoo.com

مقدمه


نوری رسیده به سطح زمین می‌گردد که در کشت خالص ریحان وجود ندارد. به طورکلی حضور چند گیاه در کشت مخلوط نسبت به یک گیاه در کشت خالص می‌تواند در صورت انتخاب درست گیاهان بهره‌وری بالاتری را از نظر زمانی و مکانی به همراه داشته باشد (۱).

نیتروژن به دلیل تحرک زیاد یون نیترات در خاک، اولین عنصری است که در میان عناصر غذایی در رقابت بین گیاه زراعی و علف‌های هرز، محدود می‌شود. بنابراین از یک طرف حجم ریشه گونه‌ها، تعیین کننده توانایی جذب نیتروژن بوده و از سوی دیگر قدرت رقابتی گیاه زراعی با افزایش باروری خاک به عمل افروزن کود نیتروژن بیشتر می‌شود (۶). با این حال تشديد رقابت و افزایش خسارت واردہ به گیاه زراعی در شرایط کمبود نیتروژن نیز گزارش شده است (۲). بنابراین این تحقیق با توجه به لزوم تولید سالم گیاهان دارویی، هم‌چنین علم اطلاعات کافی در خصوص تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر کشت مخلوط ریحان و لوبيا چشم‌بلبلی و ارزیابی کشت مخلوط براساس شاخص‌های زراعی در شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌های هرز انجام شد.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در دو سال زراعی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام گرفت. ارتفاع محل آزمایش حدود ۱۶ متر از سطح دریا و عرض جغرافیایی آن ۳۶ درجه و ۳۹ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی آن ۵۳ درجه و ۴ دقیقه شرقی است. تغییرات دما و بارندگی محل آزمایش در شکل ۱ نشان داده شد. در این آزمایش ۳۰ تیمار به صورت کرت‌های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار بررسی شد. کنترل و تداخل علف‌های هرز در طول فصل زراعی در کرت‌های اصلی، (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود اوره) در کرت‌های فرعی، ترکیب‌های مختلف کاشت شامل کشت خالص ریحان و لوبيا چشم‌بلبلی و نسبت‌های

امروزه کشت مخلوط به عنوان الگویی اقتباس شده از سیستم‌های پایدار طبیعی گیاهان از جمله مراتع است و مطالعات زیادی را در حوزه اکولوژی گیاهان زراعی به خود اختصاص داده است. در این سیستم روابط و همبستگی بین سوددهی تولید با ثبات اکولوژیک و محیط زیست به طور جامع نگریسته می‌شود (۱۹). کشت گیاهان دارویی و معطر از دیرباراز از جایگاه ویژه‌ای در نظام‌های سنتی کشاورزی ایران برخوردار بوده است و این نظام‌ها از نظر ایجاد تنوع و پایداری نقش مهمی ایفا می‌کرده‌اند (۱۳). گیاه دارویی ریحان (*Ocimum basilicum* L.)، گیاهی یک‌ساله و اسانس‌دار از خانواده نعناع می‌باشد که به عنوان گیاه سبزی، دارویی و ادویه‌ای استفاده می‌گردد، منشاء آن را ایران، هند و افغانستان ذکر کرده‌اند (۲۴). این خانواده بیشترین تعداد گونه‌های کشت شده در ایران را دارد (۱۴) اسانس این گیاه به طور عمده از برگ آن گرفته می‌شود که علاوه بر واریته گیاه، عوامل محیطی نیز بر روی میزان اسانس آن مؤثر می‌باشند (۳۵). کشت مخلوط را می‌توان نوعی کشاورزی فشرده، در زمان و مکان به حساب آورد (۲۹) که باعث افزایش عملکرد در واحد سطح (۲۶)، افزایش میزان بهره‌وری منابع مورد استفاده (۱)، کاهش مصرف سموم و آفت‌کش‌ها، کاهش قدرت رقابتی علف‌های هرز، افزایش نسبت برابری زمین، افزایش راندمان تولید (۲۹) و افزایش تنوع و ثبات زیستی در دراز مدت (۷) می‌شود. گیاهان در سیستم مخلوط را می‌توان طوری انتخاب کرد که یک گونه مستقیماً از تغییرات محیطی، که به وسیله دیگر گونه‌ها در کشت مخلوط پدید می‌آید، سود ببرد (۱۱)، به عنوان مثال می‌توان، کشت مخلوط جبوبات - زعفران (۱۴)، لوبيا - ریحان (۱)، سویا - نعناع (۱۷) اشاره نمود. کشت مخلوط بقولات با گیاهان دارویی توسط بسیاری از محققان گزارش شده است. در کشت مخلوط گیاه دارویی ریحان و لوبيا چشم‌بلبلی شرایط به گونه‌ای است که با برداشت ریحان در شرایط کشت مخلوط زمین کاملاً خالی از گیاه نمانده و حضور گیاه دوم مانع از هدر رروی تمامی منابع



شکل ۱. تغییرات دما و بارندگی محل آزمایش

جدول ۱. برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

رس (%)	سیلت (%)	شن (%)	بافت خاک (%)	فسفر (میلی گرم در کیلوگرم)	پتاسیم (میلی گرم در کیلوگرم)	نیتروژن کل (%)	اسیدیته (%)	کربن آلی (%)
۴۷/۳۰	۴۳/۷۰	۹/۰۰	۱۸/۷۳	۳۲۷/۵۰	۰/۱۷۸	۷/۸۱	۷/۸۱	۱/۷۸

نیتروژن نیز در مرحله رشد رویشی (30° روز پس از کاشت) به صورت نواری پای بوتهای ریحان و لوبيا چشم‌بلبلی به داخل شیارها در کرت‌های مورد نظر ریخته شد. از آنجا که یکی از اهداف این طرح، عدم استفاده از نهاده‌های شیمیایی از جمله انواع سموم و علفکش‌ها بود و همچنین بهدلیل تأثیر احتمالی این مواد بر روی ترکیبات دارویی ریحان، در تیمار کترول علف‌های هرز، وجین دستی صورت گرفت. طی فصل رشد آفت‌یا بیماری خاصی که احتیاج به کترول داشته باشد، مشاهده نشد. عملیات برداشت گیاه ریحان نیز در مرحله گل‌دهی (64 روز پس از کاشت) و بهمنظور تعیین عملکرد ریحان و لوبيا چشم‌بلبلی، برداشت از بخش ابتدایی هر کرت با حذف دو ردیف کناری و نیز 30 سانتی‌متر از بالای هر کرت صورت گرفت. همچنین برای تعیین اجزای عملکرد ریحان، ساقه، برگ و گل نمونه‌ها جدا گردید و سپس در آون 70 درجه سانتی‌گراد، بهمدت 48 ساعت جهت تعیین وزن خشک قرار گرفتند. انسانس نمونه‌ها به روش تقطری با آب با استفاده از دستگاه کلونجر از 50 گرم برگ ریحان بعد از دو ساعت استخراج و

کاشت افزایشی 25 ، 50 و 75 درصد ریحان با لوبيا چشم‌بلبلی) در کرت‌های فرعی فرعی قرار گرفتند. قبل از انجام آزمایش از لایه سطحی (30 - 0 سانتی‌متری خاک)، نمونه‌برداری و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن تعیین شد (جدول ۱). رقم کامران لوبيا چشم‌بلبلی و ریحان بنفش (توده محلی) به صورت هم‌زمان در اردیبهشت ماه 1389 و 1390 پس از آماده‌سازی زمین مطابق دستورالعمل‌های بهزارعی کشت شدند. ابعاد کرت‌های آزمایشی، 3×3 متر بود و هر کرت شامل 6 ردیف کاشت با فاصله ردیف 50 سانتی‌متر بود و بین کرت‌ها، دو خط به صورت نکاشت رها گردید. تک‌کشتی لوبيا چشم‌بلبلی و ریحان با تراکم مطلوب 200000 بوته در هکتار در نظر گرفته شدند. تیمارهای افزایشی ریحان با اضافه کردن 25 ، 50 و 75 درصد از تراکم مطلوب ریحان به کشت خالص لوبيا چشم‌بلبلی صورت گرفت. در نسبت‌های مختلف کشت افزایشی ریحان، ردیف‌های کاشت این دو گیاه به صورت یک در میان بودند. در زمان کاشت میزان 80 و 100 کیلوگرم در هکتار سولفات‌پتاسیم و سوپرفسفات تریپل به عنوان کود پایه به خاک اضافه شد. کود

کمترین مقدار (۴۲/۰۹) به مصرف ۱۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار اختصاص یافت. اما در تیمار تداخل، بیشترین نسبت ساقه (۶۰/۰۵) به تیمار کودی ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار اختصاص یافت که با تیمارهای کودی دیگر اختلاف معنی‌داری نشان نداد (جدول ۳). در حضور علفهای هرز بخش عمدہ‌ای از انرژی گیاه صرف رشد ساقه گشت تا بتواند در رقابت با علفهای هرز خود را به منابع نوری در بالای کانوپی گیاه نزدیک گرداند. هم‌چنین انتظار می‌رود قدرت رقابتی گیاه زراعی با افزایش باروری خاک به علت افرودن کود نیتروژن بیشتر شود (۶). با این حال تشدید رقابت و افزایش خسارت واردہ به گیاه زراعی در شرایط کمبود نیتروژن نیز گزارش شده است (۲۷ و ۳۴). در تیمار کترل علف هرز، بیشترین درصد ساقه (۴۹/۷۵) به تیمار کشت خالص ریحان و کمترین مقدار (۴۲/۸۳ درصد) به کشت مخلوط افزایشی ۵۰ درصد ریحان اختصاص یافت که با دیگر نسبت‌های کشت مخلوط تفاوت معنی‌داری نشان نداد (جدول ۴). درصد ساقه در کشت خالص بیشتر از تیمارهای دیگر کشت مخلوط بود و با افزایش تراکم ریحان، در کشت مخلوط این نسبت کاهش پیدا کرد. در کشت مخلوط، لوبيا چشم‌بلبلی از طریق سایه‌اندازی بر ریحان موجب شد نور کمتری به قسمت‌های پایین کانوپی برسد و ساقه‌های ریحان نور کمتری جذب کرده و رشد آنها محدود شد، درصورتی که در تیمارهای کشت خالص ساقه‌ها نور بیشتری دریافت کردند. لاسانتان و همکاران (۲۳) در کشت مخلوط ذرت و کاساوا گزارش کردند که تعداد انشعابات ساقه در کاساوا در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص کاهش یافته است. هم‌چنین در آزمایش دیگری مشاهده شد ارقامی از جو که دارای درصد ساقه بیشتری بودند درصد ماده خشک نیز در آنها بیشتر بود، هم‌چنین تراکم بذر اثری بر درصد برگ و درصد ساقه نداشت (۷). در تداخل علف هرز، نسبت ساقه در بین الگوهای کشت اختلاف معنی‌داری نشان نداد و بیشترین (۵۹/۴۸) به نسبت افزایشی ۲۵ درصد ریحان و کمترین مقدار (۵۷/۳۲ درصد) به نسبت افزایشی ۷۵ درصد ریحان اختصاص

اندازه‌گیری و درصد و عملکرد انسانس در واحد سطح محاسبه گردید.

به منظور ارزیابی عملکرد دو گیاه در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص، شاخص نسبت برابری زمین (Land Equivalent Ratio) از رابطه ۱ (۳۶) و شاخص تولید سیستم (System productivity index) یا استاندارد کردن عملکرد محصول دوم (ریحان) نسبت به محصول اول (لوبيا چشم‌بلبلی) از رابطه ۲ (۲۲) استفاده شد:

$$LER = (LER_b + LER_c) = \frac{y_{bc}}{y_{bb}} + \frac{y_{cb}}{y_{cc}} \quad (1)$$

$$SPI = \frac{y_{cc}}{y_{bb}} \times (Y_{bc} + Y_{cb}) \quad (2)$$

که در این رابطه‌ها LER_b و LER_c به ترتیب نسبت برابری زمین ریحان و لوبيا چشم‌بلبلی، Y_{bb} و Y_{cc} میانگین عملکرد ریحان و لوبيا چشم‌بلبلی در تک‌کشتی، Y_{bc} و Y_{cb} میانگین عملکرد ریحان و لوبيا چشم‌بلبلی در کشت مخلوط بود. تجزیه مرکب داده‌ها با کمک نرم‌افزار آماری SAS (Ver. 6.12) و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنی‌دار (LSD) در سطح ۵ درصد انجام شد.

توزیع ماده خشک در ریحان

اثرات متقابل مدیریت علفهای هرز و کود نیتروژن و مدیریت علفهای هرز و الگوهای مختلف کاشت بر درصد ساقه، برگ، گل در ماده خشک و نسبت برگ و گل به ساقه در سطح یک درصد معنی‌دار شد و معنی‌دار نبودن اثر سال روی توزیع ماده خشک نشان داد که اثرات محیطی روی صفات مورد بررسی در هر دو سال یکسان عمل نموده‌اند (جدول ۲).

درصد ساقه

سهم ساقه با افزایش به کارگیری مصرف نیتروژن در شرایط کترل علف هرز کاهش یافت (جدول ۳). مقایسه میانگین برهمکنش کود نیتروژن و کترل علف هرز نشان داد که بیشترین درصد ساقه (۴۹/۲۶) به عدم مصرف کود نیتروژن و

جدول ۲. تجزیه واریانس مرکب صفات رویشی، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان تحت تأثیر

مدیریت علف‌های هرز، مقادیر کود نیتروژن و الگوهای مختلف کاشت

عملکرد اسانس	درصد گل در ماده به ساقه	درصد گل در خشک	درصد برگ در ماده خشک	درصد ساقه در ماده خشک	درجه آزادی	منابع تغییرات
۰/۰۳۸ ns	۰/۰۰۸ ns	۰/۶۱۴ ns	۹/۳۴ ns	۵/۱۶ ns	۱	سال (Y)
۱/۱۴	۰/۰۲۲	۹/۷۷	۳۸/۸۲	۱۰/۸۸	۴	تکرار × سال
۱۸۴/۵۲**	۹/۵۸**	۱۳۷۱/۰۳**	۱۸۴۵/۹۹**	۶۳۹۸/۸۰**	۱	مدیریت علف هرز (W)
۱/۷۹ ns	۰/۰۰۰ ns	۱/۶۲ ns	۱۲/۴۱ ns	۵/۰۵ ns	۱	W × Y
۱/۱۲	۰/۰۰۹	۷/۰۷	۱۵/۳۰	۳/۶۳	۴	(a) اشتباہ
۱۲/۱۱**	۰/۲۲۸**	۱۹/۸۰**	۱۱/۲۶ ns	۱۲۱/۳۰**	۲	نیتروژن (N)
۰/۰۶۱ ns	۰/۰۰۴ ns	۰/۰۱۵ ns	۱/۸۴ ns	۱/۵۸ ns	۲	N × Y
۸/۶۹۱ **	۰/۰۵۵ **	۱۰/۴۶ **	۱۹۴/۷۰ **	۲۹۴/۲۹ **	۲	N × W
۰/۱۳۳ ns	۰/۰۰۴ ns	۰/۱۴۶ ns	۰/۷۵۱ ns	۱/۵۵ ns	۲	N × W × Y
۰/۰۸۶	۰/۰۰۷	۰/۵۶۵	۵/۳۴	۴/۶۵	۱۶	(b) اشتباہ
۱۵/۱۳**	۰/۲۵۷**	۲۰/۶۶**	۶۳/۳۱**	۱۴۲/۳۵*	۳	الگوی کاشت (P)
۰/۱۰۴ ns	۰/۰۰۲ ns	۰/۲۳۷ ns	۱/۶۱ ns	۱/۲۱ ns	۳	P × Y
۷/۰۱**	۰/۱۳۸**	۱۰/۶۳**	۶۷/۰۴**	۵۲/۰۲**	۳	P × W
۰/۰۷۸ ns	۰/۰۰۲ ns	۰/۶۳۸ ns	۳/۱۱ ns	۱/۲۳ ns	۳	P × W × Y
۰/۲۵۶ ns	۰/۰۱۱ ns	۰/۴۳۱ ns	۴/۱۸ ns	۳/۸۵ ns	۶	P × N
۰/۰۴۴ ns	۰/۰۰۲ ns	۰/۲۵۱ ns	۰/۹۴۶ ns	۰/۸۹۹ ns	۶	P × N × Y
۰/۳۶۳**	۰/۰۰۹ ns	۰/۱۷۴ ns	۳/۵۱ ns	۳/۸۵ ns	۶	P × N × W
۰/۰۷۷ ns	۰/۰۰۲ ns	۰/۱۲۸ ns	۱/۲۴ ns	۰/۸۹۱ ns	۶	P × N × W × Y
۰/۱۲۲	۰/۰۰۷	۰/۸۲۹	۵/۵۵	۴/۰۹	۷۲	باقي مانده (اشتباه c)

* و **: بهترین معنی دار در سطح احتمال ۰.۱٪ و ns: غیر معنی دار

درصد برگ

کنترل علف‌هرز در شرایط کوددهی و عدم کوددهی اثرات متفاوتی بر روی نسبت برگ ریحان از خود به جای می‌گذارد در تیمار بدون کود و کنترل علف هرز موجب کاهش نسبت برگ شد درحالی‌که با افزایش تیمار کودی خصوصاً در ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار نسبت برگ در ماده خشک کل افزایش یافت (جدول ۳). براساس این نتایج، در مجاورت کود نیتروژن و کنترل علف هرز فرصت کافی برای رشد و توسعه برگ‌های

یافت. با افزایش تراکم ریحان در کشت مخلوط از نسبت ساقه در ماده خشک کاسته شد (جدول ۴). در اوایل فصل رشد به دلیل رشد آهسته این گیاه و عدم همپوشانی در بین ردیف‌های کاشت، آشیان‌های بیشتری در اختیار علف‌های هرز قرار گرفت و در نتیجه تعداد علف‌های هرز در واحد سطح و سایه‌اندازی آنها افزایش یافت، به طوری‌که قدرت رقابتی گیاه زراعی با کاهش تراکم ریحان در کشت مخلوط افزایش یافت و نسبت ساقه را در ماده خشک افزایش داد.

جدول ۳. اثر مدیریت علف‌های هرز و مقادیر مختلف کود نیتروژن (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) بر صفات رویشی ریحان

نیتروژن درصد ساقه در ماده خشک درصد برگ در ماده خشک درصد گل در ماده خشک نسبت برگ و گل به ساقه (کیلوگرم در هکتار)				
کنترل علف هرز				
۱/۰۳ ^c	۹/۹۱ ^b	۴۰/۸۳ ^{bc}	۴۹/۲۶ ^b	صفر
۱/۲۱ ^b	۱۰/۹۱ ^{ab}	۴۳/۸۴ ^{ab}	۴۵/۲۳ ^c	۵۰
۱/۳۷ ^a	۱۲/۱۳ ^a	۴۵/۷۸ ^a	۴۲/۰۹ ^c	۱۰۰
تداخل علف هرز				
۰/۷۶ ^d	۴/۳۰ ^c	۳۹/۰۷ ^{cd}	۵۶/۶۳ ^a	صفر
۰/۷۱ ^d	۴/۶۷ ^c	۳۶/۶۹ ^d	۵۸/۶۴ ^a	۵۰
۰/۶۶ ^d	۴/۷۶ ^c	۳۵/۱۹ ^d	۶۰/۰۵ ^a	۱۰۰

میانگین اعداد که دارای حروف مشترک می‌باشند در سطح ۵ درصد اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.

جدول ۴. اثر مدیریت علف‌های هرز و کشت مخلوط افزایشی (۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد ریحان و ۱۰۰ درصد لوپیا چشم‌بلبلی)

بر صفات رویشی ریحان				
الگوهای کاشت ریحان: لوپیا چشم‌بلبلی	درصد ساقه در ماده خشک	درصد برگ در ماده خشک	درصد گل در ماده خشک	نسبت برگ و گل به ساقه
کنترل علف هرز				
۱/۲۱ ^a	۱۲/۴۳ ^a	۴۲/۲۳ ^{ab}	۴۵/۳۴ ^c	% ۱۰۰: % ۲۵
۱/۳۳ ^a	۱۱/۵۰ ^{ab}	۴۵/۶۷ ^a	۴۲/۸۳ ^c	% ۱۰۰: % ۵۰
۱/۲۶ ^a	۱۰/۴۹ ^{bc}	۴۵/۳۲ ^a	۴۴/۱۹ ^c	% ۱۰۰: % ۷۵
۱/۰۱ ^b	۹/۵۶ ^c	۴۰/۶۹ ^{bc}	۴۹/۷۵ ^b	۰: % ۱۰۰
تداخل علف هرز				
۰/۶۸ ^c	۵/۸۵ ^d	۳۴/۶۷ ^c	۵۹/۴۸ ^a	% ۱۰۰: % ۲۵
۰/۷۲ ^c	۵/۴۲ ^d	۳۶/۳۵ ^{de}	۵۸/۲۳ ^a	% ۱۰۰: % ۵۰
۰/۷۴ ^c	۴/۷۲ ^d	۳۷/۹۶ ^{cd}	۵۷/۳۲ ^a	% ۱۰۰: % ۷۵
۰/۷۰ ^c	۲/۳۵ ^e	۳۸/۹۴ ^{bc}	۵۸/۷۱ ^a	۰: % ۱۰۰

میانگین اعداد که دارای حروف مشترک می‌باشند در سطح ۵ درصد اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.

ریحان فراهم می‌شود که بر عملکرد انسانس بسیار حائز اهمیت است. در کنترل علف هرز، درصد برگ در کشت مخلوط به طور معنی‌داری بیشتر از کشت خالص بود و در سطوح بالای کود نیتروژن این نسبت افزایش یافت. به طوری که بیشترین درصد برگ ریحان در تیمار کشت مخلوط افزایشی ۵۰ درصد ریحان قرار داشتند، کمبود نور ناشی از کشت مخلوط، بیشتر بر روی

به طوری که عملکرد اسانس نسبت به کشت خالص در تیمار کنترل ($69/24$ درصد) و در تداخل علف هرز ($70/40$ درصد) به ترتیب به نسبت افزایشی 50 و 25 درصد ریحان و مصرف 100 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار اختصاص یافت (شکل ۲). گزارش شده است که میزان درصد اسانس با افزایش نفوذ نور به درون کانوپی مخلوط در تراکم‌های کم، بیشتر می‌شود (30). همچنین نور یکی از مهم‌ترین عوامل برای فتوستز می‌باشد که تأثیر زیادی بر افزایش درصد اسانس دارد و چنان‌چه گیاهی از فضای کمتری در کانوپی برخوردار باشد باید حتماً در نسبت‌های بیشتری در ترکیب کاشت قرار گیرد، تا بتواند عملکرد بیشتری را تولید نماید (۱).

ماده خشک ریحان

با توجه به جدول ۵ تجزیه واریانس مرکب داده‌های ریحان مشخص شد، بالاترین میانگین عملکرد ریحان ($526/72$) کیلوگرم در هکتار) در کنترل علف‌های هرز و مصرف 100 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در سال دوم به دست آمد در واقع شرایط آب و هوایی مطلوب‌تر موجب بهره‌وری بیشتر از عوامل محیطی و افزایش رشد رویشی ریحان در سال دوم شد. با افزایش کود نیتروژن در هکتار، عملکرد ماده خشک ریحان افزایش یافت که دلیل آن تولید بیشتر سرشاخه‌های گل دار و برگ و در نتیجه تولید بیشتر در واحد سطح بود (۲ و ۳۳). اما در تداخل علف‌های هرز در هر دو سال زراعی، با افزایش کود نیتروژن عملکرد ریحان نیز افزایش یافت اما این تفاوت در سطح کودی مختلف معنی دار نبود (شکل ۳).

در کنترل علف هرز، بیشترین عملکرد ریحان ($752/06$) کیلوگرم در هکتار) به کشت خالص در سال دوم و کمترین مقدار ($243/92$ کیلوگرم در هکتار) به نسبت افزایشی 25 درصد ریحان و لوبيا چشم‌بلبلی در سال اول اختصاص یافت و در تداخل با علف هرز، کشت خالص ($291/04$ کیلوگرم در هکتار) در سال اول با کاهش 61 درصدی نسبت به شرایط کنترل بیشترین عملکرد و نسبت افزایشی 75 درصد ریحان با


ساقه اثر کرده و نسبت ساقه را در گیاه کاهش داد، کاهش درصد ساقه در گیاه باعث شد نسبت برگ به کل گیاه افزایش یابد. بنابراین تیمارهایی که درصد ساقه در آنها بیشتر بود دارای درصد برگ کمتری بودند (۹). رضوانی مقدم (۳۱) در تحقیق خود بر روی خصوصیات رشد سورگم علوفه‌ای عنوان کرد یک ارتباط منفی بین درصد برگ و عملکرد ماده خشک وجود دارد بدین معنی که با افزایش عملکرد ماده خشک، درصد برگ کاهش پیدا کرد. سینگ و همکاران (۳۳) گزارش کردند که درصد برگ نعناع در کشت مخلوط بالاتر از کشت خالص بود. همچنین در کشت مخلوط سویا و نعناع بالاترین درصد برگ ماده خشک در کشت مخلوط این دو گیاه گزارش شد (۱۷). در تیمار تداخل علف هرز، نسبت برگ کاهش یافت که دلیل آن می‌تواند کاهش ورود نور به داخل کانوپی در الگوهای کشت باشد، کاهش ورود نور باعث سایه‌اندازی و افزایش میزان تخصیص مواد به ساقه برای رسیدن به نور شد و به تبع آن کاهش نسبت برگ به ساقه، روی داده است. در بررسی لیمن و دایک (۱۶) گزارش شده است که علف هرز شدیداً درصد برگ و سطح برگ گیاهان را در کشت مخلوط کاهش می‌دهد.

نسبت برگ و گل به ساقه

در کنترل علف هرز بیشترین و کمترین مقدار به نسبت افزایشی 50 درصد ریحان و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و کشت خالص ریحان و عدم مصرف کود نیتروژن اختصاص یافت. این نسبت با افزایش کود نیتروژن زیاد شد، ولی در تداخل با علف هرز این نسبت تفاوت معنی داری با هم نداشتند (جدول ۳ و ۴).

عملکرد اسانس ریحان

اثر مقابل مدیریت علف‌های هرز، سطوح مختلف کود نیتروژن و الگوی کاشت بر عملکرد اسانس در سطح یک درصد معنی دار شد (جدول ۲). عملکرد اسانس با افزایش مصرف کود نیتروژن، به دلیل افزایش نسبت برگ به ساقه افزایش یافت.




شکل ۲. تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروزن (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) و کشت مخلوط افزایشی (۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد ریحان و ۱۰۰ درصد لویبا چشمبلبلی) بر درصد عملکرد اسانس نسبت به کشت خالص در کنترل و تداخل علف‌های هرز.
میانگین اعداد که دارای حروف مشترک می‌باشند در سطح ۵ درصد اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.

جدول ۵. تجزیه واریانس مرکب شاخص‌های رقابتی لویبا چشمبلبلی و گیاه دارویی ریحان تحت تأثیر

مدیریت علف‌های هرز، سطوح مختلف کود نیتروزن و الگوهای مختلف کاشت

شاخص بهره‌وری سیستم	نسبت برابری زمین	ماده خشک ریحان	علکرد دانه لویبا چشمبلبلی	درجه آزادی	منابع تغییرات
۱۱۹۲۹۲۰/۷۳**	۰/۰۳۸ ns	۱۷۷۶۶/۶۶ ns	۱۹۵۵۷۳/۱۶۹ ns	۱	سال (Y)
۲۳۶۲۳/۷۱	۰/۰۱۷	۲۴۹۹۴/۰۶	۱۱۱۹۱۱/۱۲۷	۴	تکرار × سال
۱۸۶۹۲۳۸/۶۹**	۰/۵۰۰ **	۲۳۸۹۴۸۹/۹۱ **	۲۶۸۳۰۰۵/۷۸۰ **	۱	مدیریت علف‌هرز
۹۵۰۵۷۱/۱۱ **	۰/۰۰۴ ns	۱۳۰۳۸۴/۷۸ *	۴۳۹۰۰/۷۷۲۵ ns	۱	W × Y
۱۰۰۵۰/۱۹	۰/۰۰۷	۱۶۱۸۸/۲۳	۱۲۱۵۶/۱۷۷	۴	اشتباه (a)
۱۰۱۶۴۸۶/۸۱ **	۰/۰۷۴ **	۱۲۳۷۴۰/۵۳ **	۲۴۰۰۲۵/۲۰۳ **	۲	نیتروزن (N)
۵۷۰۵۱/۲۲ **	۰/۰۰۳ ns	۸۹۸/۶۲ ns	۲۰۱۴/۸۴۷ ns	۲	N × Y
۱۷۹۰۴۱/۵۷ **	۰/۰۲۵ *	۳۳۸۹۳/۱۱ **	۵۶۳۴۴/۵۰۴ **	۲	N × W
۱۰۴۷۶/۸۴ ns	۰/۰۴۹ **	۳۷۰۳۰۶ **	۱۸۵۴/۴۲۱ ns	۲	N × W × Y
۱۰۷۶۰/۹۰	۰/۰۰۶	۷۳۱/۹۱	۲۵۳۷/۹۸۸	۱۶	اشتباه (b)
۱۰۳۱۲/۷۷ *	۰/۰۲۹ ns	۵۹۸۰۴۷/۰۱ **	۱۸۷۷۴۷/۳۱۲ **	۲	الگوی کاشت (P)
۲۳۱۶/۶۰ ns	۰/۰۳۶ ns	۶۲۵۹/۸۲ **	۲۳۹۷/۷۹۵ ns	۲	P × Y
۵۷۳۸۸/۰۳ **	۰/۱۵۹ **	۱۲۰۷۱۱/۱۶ **	۲۳۴/۲۷۳ ns	۲	P × W
۱۲۸۹/۴۹ ns	۰/۰۱۴ ns	۳۹۵۰/۹۲ ns	۱۶۰۲/۲۹۳ ns	۲	P × W × Y
۹۲۰/۴۹ ns	۰/۰۰۲ ns	۱۲۹۲/۰۹ ns	۷۰۵/۶۲۹ ns	۴	P × N
۱۲۱۷/۸۲ ns	۰/۰۰۸ ns	۱۰۶۲/۷۱ ns	۹۵۰/۹۷۱ ns	۴	P × N × Y
۲۲۵۱/۱۷ ns	۰/۰۰۲ ns	۴۱۰۶/۰۹ *	۴۳۳/۲۳۰ ns	۴	P × N × W
۳۷۶۲/۷۹ ns	۰/۰۱۸ ns	۹۲۵/۹۱ ns	۲۱۱۷/۷۹۹ ns	۴	P × N × W × Y
۲۸۷۷/۸۳	۰/۰۱۳	۱۶۴۳/۷۳	۱۲۷۳/۴۵۷	۴۸	باقي مانده (اشتباه c)

* و **: بهترین معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ و ۱٪ ns: غیر معنی‌دار



شکل ۴. اثر متقابل سال و کشت مخلوط افزایشی (۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد ریحان و ۱۰۰ درصد لوبيا چشم‌بلبلي) بر ماده خشک ریحان در شرایط کنترل و تداخل علف‌های هرز. ميانگين اعداد که دارای حروف مشترك مي باشند در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داري با يكديگر ندارند.


کيلوگرم در هكتار) به تيمار ۵۰ کيلوگرم در هكتار کود نيتروژن و با افزایش سطح کودی به ۱۰۰ کيلوگرم در هكتار از مقدار آنها کاسته شد، کمترین آن (۲۷۱/۷۴) کيلوگرم در هكتار) به عدم مصرف کود نيتروژن و تداخل با علف‌های هرز اختصاص یافت که با دیگر سطوح کودی از نظر آماری تفاوت معنی داري نشان ندادند. با افزایش کود نيتروژن به ۵۰ کيلوگرم در هكتار، عملکرد دانه لوبيا چشم‌بلبلي به طور معنی داري افزایش یافت، اما با مصرف ۱۰۰ کيلوگرم در هكتار کود نيتروژن کاهش محسوسی در عملکرد دانه مشاهده شد (شکل ۵). هيبس و مکالو (۱۰) بيان کردنده که تحت رژيم‌های بالاي نيتروژن، تثبيت نيتروژن در لگوم‌ها کاهش می‌يابد، در اين حالت گونه غير لگوم تهاجم خواهد داشت و رقابت بين گونه‌اي برای عامل محدود کننده شدت می‌يابد. هم‌چنين جريانياما و هارورو (۱۲) طی آزمایش نشان دادند که عملکرد لوبيا چشم‌بلبلي با مقدار نيتروژن بالاتر از ۶۰ کيلوگرم در هكتار، کاهش می‌يابد. در الگوهای مختلف کشت مخلوط، بيشترین عملکرد دانه (۵۶۴/۲۱) کيلوگرم در هكتار) به کشت خالص اختصاص یافت (شکل ۶). هم‌چنين در کشت مخلوط، بيشترین عملکرد لوبيا چشم‌بلبلي (۴۳۷/۴۹) کيلوگرم در هكتار) به نسبت افزایشی ۲۵ درصد ریحان اختصاص یافت که با نسبت افزایشی ۵۰ درصد ریحان در کشت مخلوط تفاوت معنی داري نشان نداد، اما اين

شکل ۳. اثر مقابل سال و مقادير مختلف کود نيتروژن (صفرا، ۵۰ و ۱۰۰ کيلوگرم در هكتار) بر ماده خشک ریحان در شرایط کنترل و تداخل علف‌های هرز. ميانگين اعداد که دارای حروف مشترك مي باشند در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داري با يكديگر ندارند.

۹۳/۵۵ کيلوگرم در هكتار کمترین مقدار را داشتند که با دیگر نسبت‌های افزایشی ۵۰ و ۷۵ درصد ریحان در يك گروه آماري قرار گرفت (شکل ۴). در اين آزمایش نيز با افزایش تدریجي تراکم ریحان در کشت مخلوط با لوبيا چشم‌بلبلي، عملکرد آن نيز بهمان ترتیب کاهش یافت که علت آن وجود رقابت بين گونه‌اي ریحان با لوبيا چشم‌بلبلي بر سر جذب نور و از طرف دیگر با افزایش تراکم، رقابت درون گونه‌اي بوته‌های ریحان، افزایش یافته که باعث کاهش جذب منابع شده و در نهایت کاهش رشد و عملکرد ریحان را بهمنبال داشت. پيرزاد و همکاران (۲۸) نيز با بررسی اثر رقابت در کشت مخلوط سويا و ذرت با استفاده از روش عکس عملکرد بيان داشتند که عملکرد سويا بهشدت تحت تأثير تراکم ذرت قرار مي‌گيرد، ولی از آنجايي که رقابت درون گونه‌اي سويا بسيار كمتر از رقابت بين گونه‌اي ذرت و سويا مي‌باشد، افزایش تراکم سويا بر عملکرد آن بي تأثير است.

عملکرد دانه لوبيا چشم‌بلبلي


تجزيه واريانس مرکب داده‌ها نشان داد که اثر م مقابل مدیريت علف‌های هرز و کود نيتروژن و اثر ساده الگوهای کشت بر عملکرد دانه لوبيا چشم‌بلبلي در سطح يك درصد معنی دار بود (جدول ۵). در کنترل علف هرز بيشترین عملکرد دانه (۶۹۶/۹۵)



شکل ۶. اثر کشت مخلوط افزایشی (۰، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد ریحان و ۱۰۰ درصد لوبيا چشم‌بلبلي) بر عملکرد دانه لوبيا چشم‌بلبلي ميانگين اعداد که داراي حروف مشترك مي باشند در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داري با يكديگر ندارند.

و کمترین مقدار ($LER = 1/0.4$) نيز در سال اول در تيمار تداخل با علف هرز و عدم مصرف کود نيتروژن مشاهده شد (شکل ۷). افزایش LER با زياد شدن مقادير نيتروژن در آزمایشات پال و همكاران (۲۵) در نيجريه و چاوهري و روساريو (۵) در فيليبين ديده شد.

در حضور و عدم حضور علف‌های هرز در همه نسبت‌های کشت مخلوط نسبت برابري زمين بيشتر از يك است که نشان از برتری و سودمندی کشت مخلوط دو گونه نسبت به تک‌کشتی هر يك از گونه‌ها دارد (شکل ۸). بيشترین LER کل به ترتيب ۱/۳۱ به نسبت افزایشی ۵۰ درصد ریحان در کترل علف هرز و در تداخل با علف هرز ۱/۲۲ به نسبت افزایشی ۲۵ درصد ریحان اختصاص یافت که نسبت به سایر الگوهای کشت برتری داشت (شکل ۸) و دليل آن نيز احتمالاً به خاطر شرایط رشدی مناسب‌تر در اين نسبت کشت بود که باعث رقابت کمتر گیاهان و استفاده بهتر از منابع رشدی و درنتیجه گسترش بيشتر سطح برگ و ساقه‌های جانبي شد. در اين نسبت‌های کشت در عاري و عدم عاري بود، که باعث توليد بيشتر ماده خشک و متعاقب آن افزایش عملکرد شد. ميرهاشمی و همكاران (۲۱) بيان داشتند که بيشترین و کمترین نسبت برابري زمين در کشت مخلوط زينيان و شبليله به ترتيب در تيمار مخلوط ردیفی و دو ردیفی با ۱/۴۷ و ۱/۲۸ مشاهده شد. كوچکي و همكاران (۱۴) نيز با مطالعه کشت مخلوط زعفران و مرزنجوش گزارش کردند




شکل ۵. اثر مقادير مختلف کود نيتروژن (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هكتار) بر عملکرد دانه لوبيا چشم‌بلبلي در شرایط کترول و تداخل علف‌های هرز. ميانگين اعداد که داراي حروف مشترك مي باشند در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داري با يكديگر ندارند.


تفاوت با نسبت افزایشی ۷۵ درصد ریحان معنی دار بود (شکل ۶). علت افزایش عملکرد در کشت خالص نسبت به تيمارهای کشت مخلوط می تواند به دليل عدم رقابت درون‌گونه‌ای و بروز گونه‌ای لوبيا چشم‌بلبلي با ریحان در کشت خالص بر سر جذب نور باشد، که اين امر باعث افزایش جذب نور به وسیله کانوبی گیاه و در نتیجه، بهبود فتوسنتز شده که در نهايیت افزایش عملکرد اقتصادي لوبيا چشم‌بلبلي را به دنبال داشت. همچنان محققین ديگر معتقدند برتری عملکرد در کشت خالص می تواند ناشی از افزایش رقابت در کشت مخلوط باشد به طوري که عملکرد گیاهان به طور معنی داري در کشت مخلوط نسبت به تک‌کشتی کاهش می‌يابد (۸ و ۱۴). در همین زمينه در کشت مخلوط افزایشی جو و یونجه، عملکرد بیولوژیک جو از ۶ تا ۶۲ درصد کاهش پیدا کرد (۱۵).

کارابي استفاده از زمين و شاخص‌های بهره‌وری

اثرات ساده و متقابل سال، مدیرiyت علف‌های هرز و مقادير مختلف کود نيتروژن و نسبت‌های کشت مخلوط بر نسبت برابري زمين و شاخص بهره‌وری سيسitem در سطح يك درصد معنی دار بود (جدول ۵). همچنان بيشترین نسبت برابري زمين در سال دوم ($LER = 1/66$) در سال دوم به تيمار کترول علف هرز و مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هكتار کود نيتروژن اختصاص یافت که با تيمار کودی ۵۰ کیلوگرم در هكتار تفاوت معنی داري نشان نداد




شکل ۸. اثر کشت مخلوط افزایشی (۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد ریحان و ۱۰۰ درصد لوپیا چشم‌بلیلی) بر نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و تداخل علف‌های هرز. میانگین اعداد که دارای حروف مشترک می‌باشند در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند.




شکل ۹. اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) بر شاخص بهره‌وری سیستم در شرایط کنترل و تداخل علف‌های هرز. میانگین اعداد که دارای حروف مشترک می‌باشند در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند.

با افزایش سطح کودی بر بهره‌وری سیستم افزوده شد، به‌طوری‌که سطح کودی ۱۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن (SPI = ۷۱۸/۳۸) بیشترین تولید را به‌خود اختصاص داد (شکل ۱۰). در عدم حضور علف‌های هرز شاخص بهره‌وری سیستم تحت تأثیر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط قرار نگرفت اما در تیمار آلدوده با افزایش نسبت‌های کشت شاخص بهره‌وری سیستم کاهش یافت به‌طوری‌که بیشترین مقدار (SPI = ۷۲۴/۱۳) به نسبت افزایشی ۲۵ درصد ریحان اختصاص یافت که با نسبت افزایشی ۵۰ درصد ریحان تفاوت معنی داری نشان نداد (شکل ۱۱). در این راستا آگنهو و همکاران (۳) در بررسی عملکرد و شاخص‌های رقابتی کشت مخلوط افزایشی باقلا و جو با نسبت ۱۰۰ درصد جو و نسبت‌های متفاوت باقلا، کاهش عملکرد جو متناسب با افزایش نسبت بذر و عملکرد




شکل ۷. اثر سال و مقادیر مختلف کود نیتروژن (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) بر نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و تداخل علف‌های هرز. میانگین اعداد که دارای حروف مشترک می‌باشند در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند.



شکل ۹. اثر سال بر شاخص بهره‌وری سیستم. میانگین اعداد که دارای حروف مشترک می‌باشند در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند.

که بیشترین نسبت برابری زمین (۱/۲۱) برای الگوی کاشت یک ردیف زعفران و یک ردیف مرزنگوش و کمترین آن (۰/۸۷) در الگوی کاشت سه ردیف زعفران و یک ردیف مرزنگوش مشاهده شد.

مقدار LER بالاتر در تیمارهای مخلوط‌دهنده استفاده بهتر از زمین نسبت به تک‌کشتی بوده است در تحقیقات سایر پژوهشگران برتری کشت مخلوط لگوم - ریحان (۱)، لگوم - گندم (۴) و لگوم - ذرت (۲۵) گزارش شده است. با توجه به تجزیه مرکب داده‌ها بر شاخص بهره‌وری سیستم جدول ۵ مشخص شد که تولید سیستم (SPI = ۹۱۲/۵۲) در سال اول بیشتر از سال دوم بود (شکل ۹). در شرایط عاری از علف هرز، بیشترین تولید سیستم (SPI = ۱۱۹۲/۶۹) به سطح کودی ۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و در شرایط آلدوده به علف هرز،



شکل ۱۱. اثر کشت مخلوط افزایشی (۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد ریحان و ۷۵ درصد لوبیا چشم‌بلبلی) بر شاخص بهره‌وری سیستم در شرایط کنترل و تداخل علف‌های هرز. میانگین اعداد می‌باشند در سطح ۵ درصد اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.

اندام رویشی و عملکرد اسانس ریحان در تیمارهای کشت خالص به طور معنی‌داری بیشتر از تیمارهای کشت مخلوط بود. با این وجود، درصد برگ و نسبت برگ و گل به ساقه، در تیمارهای کشت خالص، به طور معنی‌داری کمتر از تیمارهای کشت مخلوط بود. در تیمارهای مختلف کشت مخلوط افزایشی، حجم بالای کانوپی لوبیا چشم‌بلبلی در مقایسه با ریحان باعث سایه‌اندازی بر ریحان و در نتیجه کاهش جذب نور شد که این امر منجر به کاهش رشد، فتوستز و به‌تبع آن میزان ماده خشک در این گیاه گردید، به طوری که بالاترین میزان شاخص‌های رشد مورد مطالعه، در کشت خالص ریحان مشاهده گردید. هم‌چنین با توجه به غالب بودن لوبیا چشم‌بلبلی و بالاتر بودن نسبت برابری زمین برای شاخص‌های رشد این گیاه در مقایسه با ریحان، چنین به‌نظر می‌رسد که لوبیا چشم‌بلبلی از کشت مخلوط با ریحان اثر مثبت پذیرفته است.

باقلا را گزارش نمودند. بنابر گزارش این محققان در ترکیب کشت ۳۷/۵ درصد باقلا (میزان مطلوب باقلا) + ۱۰۰ درصد جو، عملکرد کل مخلوط، شاخص تولید سیستم ($SPI = ۲۹۴۰$) حداقل بوده است.

نتیجه‌گیری

در کشت مخلوط لوبیا چشم‌بلبلی و ریحان، در شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌های هرز بیشترین عملکرد به کشت مخلوط افزایشی ۵۰ و ۲۵ درصد ریحان اختصاص یافت که به دلیل کاهش رقابت درون و بین گونه‌ای بوده و با افزایش کود نیتروژن موجب افزایش رقابت‌پذیری آنها با علف‌های هرز شده است. بالاترین عملکرد اسانس نسبت به کشت خالص ریحان در کنترل و عدم کنترل علف‌های هرز به ترتیب به کشت مخلوط افزایشی ۵۰ و ۲۵ درصد ریحان همراه با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن اختصاص یافت. هم‌چنین وزن خشک

منابع مورد استفاده

- Alizadeh, Y., A. Koocheki and M. Nassiri Mahallati. 2010. Evaluation of radiation use efficiency of intercropping of bean (*Phaseolus vulgaris* L.) and herb sweet basil (*Ocimum basilicum* L.). *Iranian Journal of Agroecology* 2 (1): 94-104. (In Farsi).
- Anwar, M., D. D. Patra, S. Chand, K. Alpesh, A. A. Naqvi and S. Khanuja. 2005. Effects of organic manures and inorganic fertilizer on growth herb and oil yield, nutrient accumulation and oil quality of French basil. *Commun. Soil Science and Plant Analysis* 36: 1737- 1746.
- Agegnehu, G., G. Amare and S. Woldeyesus. 2006. Yield performance and land use efficiency of barley and faba bean mixed cropping in Ethiopian highlands. *European Journal of Agronomy* 25:202-207.
- Banik, P., A. Midya, B. K. Sarkar and S. S. Ghose. 2006. Wheat and chickpea intercropping systems in an additive

- series experiment: advantages and weed smothering. *European Journal of Agronomy* 24: 325–332.
5. Chowdhury, M. K. and E. L. Rosario. 1992. Phosphorus utilization efficiency as effected by component population rhizobial inoculation on applied nitrogen in maize/mungbean intercropping. *Experimental Agriculture* 28: 255-263.
 6. Evans, S. P., S. Z. Kenezovic, J. L. Lindquist, C. A. Shapiro and E. E. Blankenship. 2003. Nitrogen application influences the critical period for weed control in corn. *Weed Science* 51:301-306.
 7. Grivani, G. M. 1993. Effect of density on agronomic characteristics, nutritive value and yield of forage barley under dryland conditions. MSc. Thesis. Ferdowsi University. Mashhad. Iran.
 8. Hamzee, J., G. Ahmadvand, M. A. Abutalebian. 2011. The effect of additive intercropping on weed suppression, yield and yield components of pea and barley. *Iranian Journal of Crop Production and Processing* 2 (3): 43-55. (In Farsi).
 9. Hasanzadeh, A., A. Koocheki, H. Khazaee and M. Nassiri Mahallati. 2011. Effect of plant density on organic characteristics savory (*Satureja hortensis* L.) and clover (*Trifolium resupinatum* L.). *Iranian Journal of Field Crops Research* 6: 920-929. (In Farsi).
 10. Hiebsch, C. K. and R. E. McCollum. 1987. Area × time equivalency ratio: A method for evaluating the productivity of intercrops. *European Journal of Agronomy* 79: 15-22.
 11. Vandermeer, J. H. 2000. The Ecology of Intercropping. (Translated). Publication of Jahad Daneshgahi Mashhad. Mashhad. (In Farsi).
 12. Jeranyama, P. and R. R. Harwood. 2000. Realy intercropping of sunnhemp and cowpea into a smalholder maize system in Zimbabwe. *European Journal of Agronomy* 92: 239-244.
 13. Koocheki, A. R, M. Nassiri Mahallati and F. Najafi. 2004. The agrobiodiversity of medicinal and aromatic plants in Iran. *Field Crop Research* 2: 208-214. (In Farsi with English Summary).
 14. Koocheki, A., S. Najibnia and B. Lalehgani. 2009. Evaluation of saffron yield (*Crocus sativus* L.) in intercropping with cereals, pulses and medicinal plants. *Agricultural Research* 1: 173- 182. (In Farsi with English Summary).
 15. Ledgard, S. F. 1991. Transfers of fixed nitrogen from white Clover to associated grasses in swards grazed by dairy cows estimated using 15 N methods. *Plant and Soil* 131: 215-223.
 16. Liebman, M. and E. Dyck. 1993. Crop rotation and intercropping strategies for weed management. *Ecological Applications* 3: 92- 122.
 17. Maffei, M. and M. Mucciarelli. 2003. Essential oil yield in peppermint/ soybean strip intercropping. *Field Crops Research* 84: 229–240.
 18. Mahmoodi, S. 2001. The study of competition echophysiology between corn (*Zea mays*) and lambsquarter (*Chenopodium album*). Phd Thesis. Tehran University. Tehran. Iran.
 19. Mazaheri, D. 1998. Intercropping. Tehran University Publications. Tehran. (In Farsi).
 20. Mazaheri, D. 2008. Intercropping. (2nd Edition). Tehran University Publications. Tehran. (In Farsi).
 21. Mir Hashemi, S. M., A. Koocheki, M. Parsa, M. Nasiri Mahalati. 2009. The study of advantage intercropping in different levels of manure and planting pattern. *Iranian Journal of Agricultural Research* 7(1): 259-269. (In Farsi).
 22. Odo, P. E. 1991. Evaluation of short and tall sorghum varieties in mixtures with cowpea in the Sudan savanna of Nigeria: land equivalent ratio, grain yield and system productivity index. *Experimental Agriculture* 27: 435–441.
 23. Olasantan, F. O., H. C. Ezumah and E. O. Lucas. 1996. Effects of intercropping with maize on the microenvironment, growth and yield of cassava. *Journal of Agriculture, Ecosystems and Environment* 57: 149-158.
 24. Omidbeigi, R. 2000. Production and Processing Medicinal Plants. Ghods Publication. Mashhad. Iran. (In Farsi).
 25. Pal, U. R., B. A. Kalu., J. C. Norman and D. K. Adedzwa. 1988. N and P fertilizer use in soybean /maize mixture. *Journal of Agronomy and Crop Science* 160 (2): 132-140.
 26. Pandita, A. K., M. H. Saha and A. S. Bali, 2000. Effect of row ratio in cereal-legume intercropping systems on productivity and competition functions under Kashmir condition. *Indian Journal of Agronomy* 45: 48-53.
 27. Peterson, D. E. and J. D. Nalewaja. 1992. Environment influence green foxtail (*Setaria viridis*) competition with wheat (*Triticum aestivum*). *Weed Technology* 6: 607-610.
 28. Pirzad, A., A. Javanshir, H. Alyari and M. Moghadm. 2002. The competition in mono and intercropping of corn and soybean using reciprocal yield approach. *Iranian Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources*. 9: 85-100. (In Farsi).
 29. Poggio, S. L. 2005. Structure of weed communities occurring in monoculture and intercropping of field pea and barley. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 109: 48-58.
 30. Putnam, D. H. and D. L. Allan. 1992. Mechanisms for over yielding in a sunflower-mustard intercrop. *European Journal of Agronomy* 84:188-195.
 31. Rezvani Moghaddam, P. 1990. The effect of different levels of nitrogen fertilizer on the nutritive value and growth characteristics of four forage sorghum cultivars. MSc. Thesis, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad.
 32. Russel, S. and B. Kaldul. 2001. Effect of nitrogen and phosphuros fertilization for cron and soybean intercrops.

- Australian Journal of Agriculture 19: 323-337.
- 33. Singh, V. P., B. N.Chattersee and D. V. Singh. 1989. Response of mint specie to nitrogen fertilization. *Journal of Agricultural Science and Technology* 36: 267- 271.
 - 34. Tollenaar, M., S. P. Nissanka, A. Aguilera, S. F. Weise and C. J. Swanton. 1994. Effect of weed interference and soil nitrogen on four corn hybrids. *Agronomy Journal* 86:596–601.
 - 35. Vina, A. and E. Murillo. 2003. Essential oil composition from twelve varieties of basil (*Ocimum* spp.) grown in Columbia. *Journal of Brazilian Chemical Society* 14: 744–749.
 - 36. Willey, R.W., 1979. Intercropping its importance and research needs. I. Competition and yield advantages. *Field Crop Abstract* 32: 1–10.