

مطالعه مولکولی و بیان ژن‌های فتوستزی و فرآیند پیری در برگ پرچم و سایر برگ‌ها در گیاه جو

سعید نواب پور^{*۱}

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۹/۱۹؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۱۱/۸)

چکیده

به منظور بررسی اهمیت برگ پرچم در جو زراعی (واریته هوردا) از نظر برخی صفات فیزیولوژیک و بیان برخی ژن‌های مهم فتوستزی و پیری برگ، آزمایشی در شرایط مزرعه در سال ۲۰۰۳ در محل ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه وارویک انگلستان انجام شد. به منظور افزایش دقیق و امکان مقایسه آماری میانگین صفات مورد مطالعه، آزمایش با چهار تکرار صورت پذیرفت. نمونه‌برداری تصادفی از برگ پرچم و سایر برگ‌ها در سه زمان تعیین شده طی دوره رشد انجام گرفت. صفات مورد ارزیابی شامل میزان کلروفیل a و b، مقدار CO_2 خالص ثبیت شده برگ، نسبت Fv/Fm، ساختار سطح اکسیداسیون سلولی (TBARM) و بیان ژن‌های فتوستزی و پیری برگ بودند. میزان تغییرات کلروفیل طی مراحل نمونه‌برداری روند کاهشی نشان داد. این مسئله در مورد سایر برگ‌ها شدت بیشتری داشت. میزان ثبیت CO_2 خالص در برگ پرچم ضمن برتری مقداری، ثبات بیشتری نیز طی مراحل نمونه‌برداری نسبت به سایر برگ‌ها داشت. میزان ساختار سطح اکسیداسیونی سلولی در خلال مراحل پیری برگ به سرعت افزایش یافت. بیان ژن‌های فتوستزی RCBS، LhcII و Cab تشابه نسبی زیادی داشتند و عموماً با پیشرفت پیری برگ، به ویژه در مورد سایر برگ‌ها، به طور قابل توجهی کاهش داشتند. در مورد ژن‌های واپسی به پیری، تنوع قابل ملاحظه‌ای حاصل گردید. الگوی بیان ژن‌های پیری MTI و CATI شباهت زیادی داشتند، ولی ژن‌های SODI و SAG12 بیان متفاوتی را نشان دادند. جمع‌بندی نتایج مبین نقش ارزنده برگ پرچم در افزایش تولید دانه بود. این مهم با توجه به تداوم فتوستز، میزان کلروفیل و سرعت نسبی کمتر بروز نتش اکسیداسیون طی روند پیری در برگ پرچم، در مقایسه با سایر برگ‌ها، توجه پذیر بود. در این راستا، فعالیت ژن‌های فتوستزی و ژن‌های واجد نقش هموستاتیک در خلال پیری بیان ممتازی در برگ پرچم نشان دادند.

واژه‌های کلیدی: جو زراعی، کلروفیل، فتوستز، پیری برگ، برگ پرچم، بیان ژن

۱. استادیار اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: s.navabpour@yahoo.com

مقدمه

شارنبرگ و همکاران (۳۸) ضمن ارزیابی میزان پیشرفت پیری و Fv/Fm نسبت II با اندازه‌گیری RNA و ایجاد کتابخانه cDNA طی مراحل رشد و پیری طبیعی در برگ پرچم و تیمار تاریکی نمودند. نتایج منجر به معرفی برخی کلون‌ها در مسیر مشترک پیری و تیمار تاریکی گردید. از جمله مهم‌ترین این ژن‌ها می‌توان به سیستئین پروتئاز، گلیکول ترانسفراز و فاکتور رونویسی (Transcription factor) اشاره کرد (۳۸). راندمان فتوستتر، تداوم آن و ساز و کارهای تنظیمی وابسته همگی توسط الگوی بیان ژن‌ها کنترل می‌شوند. نتایج برخی مطالعات در شرایط تنش‌های زنده و غیرزنده حاکی از افت معنی‌دار بیان ژن‌های فتوستتری نظریه ژن (Rubisco small sub-unit RCBS) در گیر در تولید آنزیم ریسیکو است (۶ و ۲۴).

از منظر ژنتیک-فیزیولوژیک، پیری برگ (Leaf senescence) یک مرحله مهم نمو است که به لحاظ ژنتیکی و فیزیولوژیک بسیار حائز اهمیت است. ژن‌های زیادی در این مرحله فعال می‌شوند و در عین حال برخی ژن‌ها نیز غیرفعال می‌گردند. از مشخصه‌های بارز پیری، روند تغییرات منظم و کنترل شده فعل و انفعالات فیزیولوژیک است. از جمله این رخدادها توقف فتوستتر، تجزیه کلروپلاست، کاهش چشمگیر کلروفیل و تجزیه پروتئین‌ها و سایر مولکول‌های بزرگ حیاتی به منظور انتقال مواد به دانه است (۲۸). از دیگر وقایع مهم در خلال پیری، افزایش سطح رادیکال‌های فعال اکسیژن است که به تبع آن ژن‌های پاد اکسیدان نظری کاتالاز، سوپر اکسید دیسموتاز و اسکوربیک پراکسیداز افزایش نسخه‌برداری نشان می‌دهند (۲۷). اگر چه رادیکال‌های مزبور در غلظت‌های زیاد سمی و مخرب بوده و موجب خسارت به غشاء سلولی و پراکسیداسیون مولکول‌های حیاتی می‌گردند، ولی در غلظت‌های کمتر به عنوان فاکتورهای سیگنالی (Signaling factor) در بیان ژن‌ها ایفای نقش می‌نمایند (۸). نقش رادیکال سوپر اکسید در بیان ژن‌های دفاعی PR1 و PR5 گزارش شده است (۱۵). هم‌چنین پراکسید هیدروژن با افزایش فعالیت مسیر متابولیک آنزیم MAP کیناز

در عرصه جهانی، جو زراعی (*Hordeum vulgare L.*) به لحاظ اهمیت و سطح زیر کشت، چهارمین محصول و در بین غلات در ایران حائز رتبه دوم است. سطح زیر کشت جهانی جو طی دو دهه اخیر با رکورد خیره کننده ۸۰٪ افزایش مواجه بوده است. این امر، علاوه بر سازگاری وسیع اکولوژی، به دلیل مصارف متعدد این محصول در تغذیه انسان و دام و کاربردهای صنعتی می‌باشد (۱ و ۱۰). افزایش راندمان تولید دانه به طور مؤثر در گرو بهبود صفات وابسته، به ویژه اجزای عملکرد، است. در عین حال، برگ پرچم در تولید ماده خشک و روند انتقال مواد فتوستتری به دانه نقش ارزنده‌ای را ایفا می‌کند (۲۲). مخصوصات مورفو‌لولژیک برگ پرچم نظریه اندازه، شکل و زاویه قرارگیری و خصوصیات فیزیولولژیک مرتبط مانند محتوای کلروفیل و راندمان فتوستتر از جمله عوامل مهم در افزایش عملکرد دانه محسوب می‌گردد (۱۳). مطالعات ژنتیکی انجام شده در خصوص برخی خصوصیات برگ پرچم از قبیل طول، عرض و زاویه قرارگیری در گیاه حاکی از کمی بودن این صفات و کنترل آنها توسط تعداد زیادی ژن بوده است (۳۹). با این حال، اطلاعات محدودی در سطح سلولی از روند تغییرات بیان ژن‌های مهم فتوستتری و در گیر در فرآیند پیری برگ پرچم در گیاه جو وجود دارد (۳).

ارزیابی روند بیان ژن‌های در گیر در فرایندهای فتوستتر و پیری برگ امکان توجیه بسیاری از فعل و انفعالات فیزیولوژیک را که منجر به تغییرات صفات مهم زراعی می‌گردد در سطح سلولی و به لحاظ مولکولی فراهم می‌آورد (۱۵). در این راستا، نتایج تحقیقات کروپینسکا و همکاران (۱۹) مبین کاهش بیان ژن Lhc (Light harvesting complex) در مراحل پایانی پیری برگ پرچم در جو بود. پروتئین کد شده توسط ژن مزبور واجد نقش کنترلی در میزان رادیکال‌های فعل اکسیژن (Reactive Oxygen Species (ROS)) تولید شده ناشی از شدت تشعشع نوری است. همزمان با کاهش بیان این ژن، نسبت کلروفیل a به b افزایش معنی‌دار نشان داد (۱۹).

(۳۵) استفاده گردید. مقدار ۵٪ گرم نمونه برگ (به صورت منجمد شده) کاملاً خرد و با ۱۰ میلی لیتر استون ۸۰٪ مخلوط شد. پس از سانتریفوژ، میزان جذب در طول موج‌های ۶۴۶ و ۶۶۳ نانومتر توسط دستگاه جذب نوری (Uvikon930 Watford) ثبت گردید. میزان کلروفیل a و کلروفیل b و کلروفیل کل براساس روابط زیر محاسبه گردید:

$$chl_a = \frac{12}{25} A_{663/6} - \frac{2}{55} A_{646/6} \quad [1]$$

$$chl_b = \frac{20}{31} A_{646/6} - \frac{4}{91} A_{663/6} \quad [2]$$

$$Tchl = \frac{16}{76} A_{646/6} - \frac{6}{34} A_{663/6} \quad [3]$$

که chla و chlb و Tchl به ترتیب میزان کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل بر حسب میلی گرم بر میلی لیتر است.

اندازه‌گیری TBARM (Thiobarbituric acid reactive material) در این سنجش، که معیاری برای اندازه‌گیری میزان تنفس اکسیداسیونی است، مقدار اسید تیوباریتوريک که محصول نهایی و نسبتاً پایدار واکنش اکسیداسیون مولکول‌های بزرگ (چربی‌ها) است، تعیین می‌شود. در این خصوص، از روش هگگ و همکاران (۱۲) با تغییراتی استفاده گردید. مقدار ۰/۵ گرم نمونه برگ را هموژنیزه نموده و یک میلی لیتر اسید تری کلروفاستیک (w/v ۱۵٪) به آن اضافه شد. محلول حاضر با افزودن ۱۰ میلی لیتر استون به شدت مخلوط (ورتکس) و با دور ۴۷۵۰ دقیقه به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ گردید. رسوب کوچکی که پس از سانتریفیوژ حاصل شد را با ۵ میلی لیتر استون شستشو داده، ورتکس و مجدداً با همان دور به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ نموده و آخرین مرحله چهار مرتبه تکرار شد. پس از آن، مقدار ۳ میلی لیتر اسید هیپوفسفوریک (۰/۱٪) و یک میلی لیتر اسید تیوباریتوريک (w/v ۰/۶٪) افزوده و محلول برای مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۱۰۰°C قرار داده شد. سپس واکنش با سرد کردن سریع لوله‌ها در داخل یخ متوقف گردید. مقدار جذب محلول حاصل با طول موج‌های ۵۳۲ و ۵۹۰ نانومتر به وسیله دستگاه جذب نوری (Uvikon930 Watford) ثبت گردید.

الگوی زمانبندی باز و بسته شدن روزنه‌ها را تعیین می‌کند (۲۹). با توجه به مطالب یاد شده، این مطالعه به منظور دستیابی به اهداف زیر طرح ریزی شده است: ۱) ارزیابی روند بیان برخی ژن‌های مهم فتوستزی و وابسته به پیری در برگ پرچم و سایر برگ‌ها و ۲) بررسی تغییرات خصوصیات فیزیولوژیک و شاخص‌های بیوشیمیابی در برگ پرچم و سایر برگ‌ها و ارتباط آنها با بیان ژن‌ها.

مواد و روش‌ها

مواد گیاهی و صفات مورد بررسی

بذر گیاه جو زراعی، واریته هوردا (Hordeum vulgare L. cv) به مدت ۱۰ دقیقه به وسیله واکتس GS39 (Zadok's) در صد ضد عفنونی شده و در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه وارویک انگلستان در سال ۲۰۰۳ میلادی به صورت دستی کشت گردید. هر واحد آزمایشی شامل ۶ ردیف کشت به طول حدود ۳ متر بود که در چهار تکرار اجرا گردید. ردیف‌های کناری به عنوان حاشیه لحاظ گردیدند و نمونه‌برداری از ۴ ردیف وسط با رعایت حاشیه طولی صورت پذیرفت. واریته هوردا از ازقام پرمحصول جو زراعی شش پر با ارتفاع و زمان رسیدگی متوسط است. نمونه‌برداری از برگ پرچم در زمان ظهور کامل برگ پرچم (کد GS39 Zadok's) و ۲۰ روز بعد در خلال پر شدن دانه‌ها (کد GS71 Zadok's) انجام شد. در مورد سایر برگ‌ها، علاوه بر زمان‌های یاد شده، در زمان حداقل رشد (کد GS35 Zadok's) نیز نمونه‌برداری تصادفی انجام گرفت. نمونه‌برداری برگ پرچم از تعداد ده برگ پرچم قطع شده به طور تصادفی در هر تکرار انجام شد و پس از آن مقدار مورد نیاز برای هر اندازه‌گیری یا سنجش توزین گردید. در مورد سایر برگ‌ها، در هر تکرار ده بوته تصادفی انتخاب و کلیه برگ‌ها به جز برگ پرچم برداشت و برای هر اندازه‌گیری یا سنجش مقدار مورد نیاز استحصال گردید.

اندازه‌گیری کلروفیل

به منظور اندازه‌گیری میزان کلروفیل از روش پورا و همکاران

٪٪ در غلظت $2\mu\text{g}/\text{ml}$ در فریزر ۷۰°C - درجه سلسیوس نگهداری شد.

هیبریداسیون RNA با کاوشگر DNA نشاندار فسفر رادیو اکتیو (آنالیز نورترن بلاط)

در ابتدا انتقال RNA به ژل آگارز و الکتروفوروز آن انجام شد. پس از حذف قسمت‌های اضافی ژل، RNA به غشاء نایلونی Hybond N+ (Amersham) بالفروزن NaOH ۵٪ مولار در مدت حداقل ۱۰ ساعت متقل گردید. به منظور انجام هیبریداسیون، ابتدا کاوشگر کلون‌های مورد مطالعه (جدول ۱) به سیله ستون سفاروز خالص‌سازی شد. کاوشگر تک رشته را در محیط بافری به غشاء حامل RNA افزوده و به مدت یک شب در شیکر 65°C درجه سلسیوس قرار گرفت. غشا را با محلول $0.2\times\text{SSC}/1\%\text{SDS}$ شستشو و پس از خشک کردن در کاست فیلم x-ray در فریزر ۷۰°C درجه سلسیوس به مدت ۲۴ ساعت نگهداری کرده و سپس ظاهر گردید.

نتایج و بحث

عملکرد دانه

میزان عملکرد دانه در شرایط حذف کامل برگ پرچم (800 g/m^2 در مترمربع) در مقایسه با وضعیت طبیعی رشد (990 g/m^2 در مترمربع) کمتر بود. برحسب انتظار، تفاوت بسیار معنی‌داری بین مقدار عملکرد دانه در شرایط مذکور حاصل گردید. این موضوع که نشان‌دهنده نقش مؤثر برگ پرچم در ماده‌سازی است توسط سایر پژوهشگران نیز گزارش شده است (۱۵ و ۱۷).

میزان کلروفیل

متوسط مقادیر کلروفیل در برگ پرچم و سایر برگ‌ها در شکل ۱ نشان داده شده است. میزان تغییرات کلروفیل طی مراحل نمونه‌برداری روند کاهشی نشان داد. این مسئله در مورد سایر برگ‌ها شدت بیشتری داشت. مقدار کلروفیل ^a در تمام نمونه‌ها بیشتر از مقدار متناظر کلروفیل ^b بود. این مسئله ممکن است به

میزان CO_2 خالص ثبیت شده

برای اندازه‌گیری دی‌اکسیدکربن ثبیت شده از دستگاه قابل حمل آنالیزر مادون قرمز (Ciras-1, System, UK) استفاده شد. اندازه‌گیری‌ها روی برگ گیاه انجام شد. میزان غلظت میان در سطح $۳۶\text{ }\mu\text{l/liter}$ بر لیتر با پاشیدن CO_2 خالص به همراه $200\text{ }\mu\text{l/liter}$ در دقیقه با رطوبت نسبی $70-60\%$ درصد تنظیم شد. دمای داخلی اتفاقک حدود $25\pm 1^{\circ}\text{C}$ درجه سلسیوس بود. با نصب لامپ هالوژن خارج از پنجره اتفاقک دستگاه، با رسم منحنی استاندارد اشباع نوری در دامنه صفر تا $2000\text{ }\mu\text{l/liter}$ میکرومول بر مترمربع بر ثانیه، مقدار ثبیت CO_2 خالص استاندارد و برحسب واحد میکرو مول CO_2 بر مترمربع بر ثانیه تنظیم گردید.

پارامترهای فلورسانس کلروفیل


پارامترهای نسبت Fv/Fm با استفاده از دستگاه قابل حمل فلومتر (PAM-2000,Walz,Germany) و برنامه نرمافزار DA-2000 walz براساس روش کروس و وايس (۱۸) محاسبه گردید.

استخراج RNA

مقدار 3 g نمونه منجمد برگ در نیتروژن مایع هموزنیزه گردید. مقدار $10\text{ }\mu\text{l/liter}$ فل و $15\text{ }\mu\text{l/liter}$ بافر $(100\text{ }\mu\text{M Tris-HCl pH 9, 200 }\mu\text{M NaCl, 5 }\mu\text{M Dithiotheitol, 1% (w/v), 20mM EDTA})$ سانتریفیوژ با دور $3000\textrm{ rpm}$ در دقیقه به مدت 10 دقیقه انجام شد. مایع بالای لوله به آرامی جمع‌آوری و با افزودن مقدار مساوی کلروفرم عمل سانتریفیوژ 2 تا 3 بار به همین ترتیب تکرار گردید. مقدار 0.33 ml لیتیوم کلراید 8 Molar افزوده و در دمای 4°C درجه سلسیوس به مدت یک شب قرار گرفت. استخراج RNA با انجام سانتریفیوژ لوله‌ها با سرعت $10000\textrm{ rpm}$ دور در دقیقه به مدت 10 دقیقه در دمای 4°C درجه سلسیوس ادامه یافت. پس از شستشوی RNA استخراجی با اتانول

جدول ۱. لیست ژن‌های کلون شده مورد استفاده و اطلاعات مربوطه

منبع	نقش و فعالیت	نام اختصاری کلون
Mackerness <i>et al.</i> , 1999	ژن فتوستتری کدکننده آنزیم روپیسکو	RBCS
Escoubas <i>et al.</i> , 1995	ژن فتوستتری کدکننده کمپلکس پروتئین فعال در فتوسیستم II	LhcII
Escoubas <i>et al.</i> , 1995	ژن فتوستتری کترل انرژی نوری	Cab
Navabpour <i>et al.</i> , 2003	ژن متالوتاینین واجد نقش هموستاتیک آنتی اکسیدانی	MTI
Buchanan Wollaston <i>et al.</i> , 1997	ژن کاتالاز کترل کننده میزان H_2O_2	CATI
Mackerness <i>et al.</i> , 1999	ژن سوپر اکسید دیسموتاز کترل کننده میزان یون سوپر اکسید	SODI
Noh and Amasino, 1999	ژن اختصاصی پیری کدکننده سیستئین پروتئاز	SAG12



شکل ۱. میزان کلروفیل a و b در برگ پرچم و سایر برگ‌ها طی زمان‌های نمونه‌برداری شامل: ۱. حداقل رشد رویشی سایر برگ‌ها (کد GS35 زادوکس)، ۲. ظهرور کامل برگ پرچم (کد GS71 زادوکس) و ۳. پرشدن دانه (کد GS39 زادوکس) است. میزان کلروفیل برگ پرچم در نمونه‌های مراحل ۲ و ۳ اندازه‌گیری شد. محاسبه میانگین‌ها در هر مرحله از ۴ نمونه تصادفی برگ انجام شد. مقدار خطای معیار برای هر میانگین در شکل نشان داده شده است.

معنی‌داری نسبت به سایر برگ‌ها نشان داد. این مسئله می‌تواند توجیه فیزیولوژیک خوبی از نقش ارزنده برگ پرچم در تولید ماده فتوستتری در زمان پرشدن دانه را فراهم آورد (۱۷). هم‌چنین نزدیک بودن مقادیر کلروفیل a و b، با توجه به نقش آنها در سیستم فتوستتری I و II، درخور توجه است (۲).

دلیل تجزیه سریع‌تر کلروفیل b و یا تبدیل کلروفیل b به a باشد. اگرچه ساز و کار فیزیولوژیک چرخه تبدیل کلروفیل a و b کاملاً مشخص نیست (۳۵) ولی دو مکانیزم شیمیابی و آنزیمی در این ارتباط معرفی شده‌اند (۱۶). مقادیر کلروفیل a و b، به خصوص در مراحل پایانی رشد، در برگ پرچم برتری

میزان ثبیت CO₂

طرفی، در واکنش تبادلی مرتباً به یکدیگر تبدیل می‌شوند. از این رو، اندازه‌گیری مستقیم آنها توسط کیت‌های پر هزینه اگر چه میسر است ولی برخی اوقات به دلیل پیچیدگی کاربرد، این روش‌ها دقیق را ندارند (۱۴). در این ارتباط، استفاده از سنجش TBRAM CO_2 ضمن سهولت نسبی انجام آن، دقیق قابل توجهی داشته و در مطالعات زیادی مد نظر قرار گرفته است (۷ و ۳۲). نتایج سنجش TBRAM در این مطالعه در شکل ۳ نشان داده شده است. میزان شاخص TBRAM در برگ پرچم طی دو مرحله نمونه‌برداری تفاوت چشمگیری نشان نداد، در حالی که در مورد سایر برگ‌ها با پیشرفت روند پیری برگ افزایش معنی‌داری در مقدار TBRAM حاصل شد. به نظر می‌رسد که ثبات بیان نسبی ژن‌های پاد اکسیدان طی مراحل نمونه‌برداری در برگ پرچم در مقایسه با سایر برگ‌ها (شکل ۴) دلیل موجهی در این ارتباط باشد. همبستگی منفی و معنی‌دار (-0.76) بین مقادیر TBRAM و میزان کلروفیل به دست آمد.

به طور مشابهی، همبستگی منفی و معنی‌داری نیز بین TBRAM و میزان ثبیت CO_2 (-0.68) ملاحظه شد. بالا بودن شاخص TBRAM میان فراوانی رادیکال‌های فعال اکسیژن و شدت فرآیندهای اکسیداتیو است. اصولاً غلظت‌های زیاد رادیکال‌های مذبور در اکسیداسیون مولکول‌های حیاتی نظیر پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و چربی‌ها نقش دارند (۱۱). در حالی که سطوح متعادل این رادیکال‌ها در القای سازگاری نسبی سلول‌ها برای ایجاد تداوم فعالیت‌های حیاتی سلولی وجود اهمیت زیادی است (۲۰). بر این اساس، و با توجه به نتایج این مطالعه، چنین به نظر می‌رسد که تداوم روند فعالیت‌های سلولی در برگ پرچم در مقایسه با سایر برگ‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر بوده است.


بیان ژن‌ها

روند بیان ژن‌های فتوستتری با اندک تفاوت، شباهت زیادی در


میزان ثبیت CO_2 خالص و شاخص Fv/Fm برگ پرچم و سایر برگ‌ها در شکل ۲ نشان داده شده است. میزان ثبیت CO_2 خالص در برگ پرچم بیشتر از مقدار مربوطه در سایر برگ‌ها بود و روند کاهش مقدار آن طی مراحل نمونه‌برداری شدت بیشتری نسبت به برگ پرچم نشان داد. هم‌چنین میزان نسبت Fv/Fm در برگ پرچم ضمن برتری نسبت به سایر برگ‌ها، ثبات بیشتری طی مراحل پایانی نمونه‌برداری نشان داد. بر این اساس، چنین به نظر می‌رسد که فعالیت فتوستتری در برگ پرچم طی فرآیند پیری تداوم بیشتری داشته است. این مسئله که در ارقام با پتانسیل بالای تولید گزارش شده است (۱۹) می‌تواند به دلیل میزان بالای پروتئین Lhc باشد. وجود این پروتئین در صفحات تیلاکوئید کلروپلاست مانع از بروز اکسیداسیون تشعشع نوری و کترول تولید سطوح بالای ROS و به تبع آن جلوگیری از تنش اکسیداتیو می‌گردد (۱۹). بیان بیشتر ژن Lhc طی زمان‌های نمونه‌برداری در برگ پرچم در مقایسه با سایر برگ‌ها و سطوح نسبی پایین‌تر شاخص سطح اکسیداسیون سلولی (TBRAM) مؤید صحت این نتیجه‌گیری می‌باشد. نتایج مشابهی توسط سایر محققین در این خصوص گزارش شده است (۳۷). در عین حال، نتایج مطالعه سبات و همکاران (۳۶) متفاوت بود. این مسئله به دلیل روش بررسی آنها و انجام اندازه‌گیری‌ها در برگ جدا شده از گیاه حاصل شده است. به نظر می‌رسد نتایج به دست آمده از اندازه‌گیری روی گیاه دقت دقیق عمل بیشتری داشته باشد.

شاخص اکسیداسیون سلولی (TBARM)


از منظر مولکولی، پیری برگ مرحله‌ای با تشدييد فرآيندهای اکسیداتیو است که طی آن فراوانی رادیکال‌های فعال اکسیژن بالا می‌رود (۲۸). تعداد این رادیکال‌ها زیاد است و عموماً طول عمر کوتاهی در حد اعشار ثانیه دارند. از



شکل ۲. میزان خالص ثبیت CO_2 و نسبت F_v/F_m در برگ پرچم و سایر برگ‌ها طی زمان‌های نمونه برداری شامل: ۱. حداقل رشد رویشی سایر برگ‌ها (کد GS35 زادوکس)، ۲. ظهور کامل برگ پرچم (کد GS39 زادوکس) و ۳. پرشدن دانه (کد GS71 زادوکس) است. اندازه‌گیری مقادیر در مورد برگ پرچم در مراحل ۲ و ۳ انجام شد. محاسبه میانگین‌ها در هر مرحله از ۴ نمونه تصادفی برگ انجام شد. مقدار خطای معیار برای هر میانگین در شکل نشان داده شده است.



شکل ۳. میزان شاخص اکسیداسیون سلولی (TBRAM) در برگ پرچم و سایر برگ‌ها طی زمان‌های نمونه برداری شامل: ۱. حداقل رشد رویشی سایر برگ‌ها (کد GS35 زادوکس)، ۲. ظهور کامل برگ پرچم (کد GS39 زادوکس) و ۳. پرشدن دانه (کد GS71 زادوکس) است. میزان TBRAM در مورد برگ پرچم در مراحل ۲ و ۳ انجام شد. محاسبه میانگین‌ها در هر مرحله از ۴ نمونه تصادفی برگ انجام شد. خطای معیار برای هر میانگین در شکل نشان داده شده است.



شکل ۴. مقایسه روند بیان ژن‌های فتوستتزی و پیری در برگ پرچم و سایر برگ‌ها در جو زراعی. مراحل نمونه‌برداری شامل: ۱. حداقل رشد رویشی سایر برگ‌ها (کد GS35 زادوکس)، ۲. ظهور کامل برگ پرچم (کد GS39 زادوکس) و ۳. پر شدن دانه (کد GS71 زادوکس) است. در هر مرحله استخراج RNA برگ انجام و با انتقال به غشاء حساس با کلون‌های فوق هیبرید گردید. با انتقال غثای به کاست رادیوگرافی و ظهور فیلم رادیوگرافی، نتایج به صورت فوق مرتب شد. شاهد ۱ و ۲: به ترتیب شامل محلول پاشی آب بر برگ پرچم و سایر برگ‌ها. ۱. تنش اکسیداتیو با محلول پاشی نیترات نقره با غلظت ۱ میلی‌مولار اعمال و نمونه‌برداری ۴۸ ساعت پس از انجام شد. ۲. پاتوژن مورد استفاده ایزووله سازگار ۲ (Aheco 2 *peronospora parasitica*) بود. نمونه‌برداری ۵ روز پس از آلودگی (اسپورپاشی برگ) انجام شد. به منظور حصول اطمینان از میزان بارگیری برابر در هر چاهک از rRNA 18s استفاده شد.

پیری داشته باشد (۲۵). میزان کاهش این ژن‌ها در برگ پرچم به طور قابل توجهی کمتر بود که با نتایج حاصله در مورد مقادیر کلروفیل، تثبیت CO_2 و نسبت Fv/Fm مطابقت دارد (شکل‌های ۱ و ۲). همچنان افت میزان نسخه‌برداری ژن‌های مزبور تحت تأثیر عامل بیماری زا نیز چندان زیاد نبود. از این‌رو امکان تفاوت مسیر ژنتیکی بیان آنها محتمل به نظر می‌رسد (۶). ژن MT1 کدکننده پروتئین متالوتایین است. این پروتئین با

نمونه‌های مختلف نشان دادند (شکل ۴). در مورد هر سه ژن فتوستتزی RCBC و LhcII و Cab محسوسی در میزان نسخه‌برداری تحت تأثیر تنش اکسیداتیو ناشی از محلول پاشی نیترات نقره دیده شد. این روند کاهشی بیان ژن‌های مزبور با پیشرفت پیری برگ طی مراحل نمونه‌برداری در سایر برگ‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای دیده شد. این مسئله می‌تواند دلالت بر مسیر مشترک بیان این ژن‌ها طی تنش اکسیداتیو و مرحله

بسته شدن روزنه‌ها را تنظیم می‌نماید (۲۹). از این‌رو، بررسی میزان فعالیت CAT1 و در پی آن تنظیم سطح متعادل میزان H_2O_2 اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه، میزان نسخه‌برداری این ژن در شرایط تنش اکسیداتیو نیترات نقره و طی مراحل پیری در سایر برگ‌ها افزایش چشمگیری نشان داد (شکل ۴). این افزایش تحت تأثیر عامل بیماری‌زا نیز ملاحظه شد. بر این اساس، وجود مسیر ژنتیکی مشترک، به ویژه در مقاطع نهایی بیان ژن، محتمل به نظر می‌رسد.

ژن سوپراکسید دیسموتاز (SODI) کدکننده گروه پروتئین‌های متالوآنژیم است. محصول آنزیمی این ژن توانایی پاکسازی یون سوپراکسید را داراست. یون سوپراکسید قابلیت تبدیل به پراکسید هیدروژن را با شدت بالایی دارد (۴). در شرایط پیری سلولی، افزایش غلظت یون سوپراکسید به عنوان اولین حلقه زنجیره رادیکال‌های آزاد رخ می‌دهد (۷). بنابراین نقش ژن SODI در کاهش فراوانی یون سوپراکسید و تعدیل غلظت آن به طور مؤثر در تنظیم غلظت متعادل سایر رادیکال‌های فعال، از جمله پراکسید هیدروژن و رادیکال هیدروکسیل، مهم خواهد بود (۲۹). این مسئله با توجه به شدت مضاعف فعالیت یون هیدروکسیل و خسارت مستقیم آن به DNA اهمیتی دو چندان دارد (۴). تأثیر سطوح متعادل یون سوپراکسید در فعل نمودن ژن‌های دفاعی نظری PR1 و PR5 ثابت شده است. از طرفی این یون به عنوان یک مولکول انتقال پیام ثانویه با کترول میزان تولید پراکسید هیدروژن روند بیان برخی ژن‌های درگیر در فرآیند پیری و فتوستزی را تعدیل می‌نماید (۲۴). در این مطالعه، میزان بیان ژن SODI طی مراحل پیری چندان زیاد نبود. ضمناً اختلاف زیادی بین روند تغییرات نسخه‌برداری در برگ پرچم و سایر برگ‌ها دیده نشد. میزان بیان این ژن تحت تأثیر عامل بیماری‌زا نیز افزایش محسوسی نسبت به شاهد نشان نداد. در حالی که ژن مزبور واکنش مثبت و معنی‌داری به تنش اکسیداتیو ناشی از نیترات نقره نشان داد، براساس این نتایج، به نظر می‌رسد مسیرهای ژنتیکی متفاوتی در بیان این ژن وجود دارد. کلون SAG12 کدکننده پروتئین آنزیمی سیستئین پروتئاز

وزن مولکولی کم و غنی از اسید آمینه سیستئین نقش مهمی در کترول یون‌های فلزی سرمی دارد (۲۸). در برخی سلول‌های جانوری و قارچ‌ها کترول بیان این ژن توسط یون‌های فلزی صورت می‌پذیرد. این ژن گروه فامیلی گستردۀ داشته و ایزوژن‌های زیادی در بین موجودات مختلف دارد. از این‌رو الگوی بیان آن در اندام‌های مختلف تنوع زیادی دارد (۷). نتایج برخی مطالعات حکایت از نقش تعیین‌کننده این ژن در القای مقاومت نسبت به اثر اکسیدانی رادیکال‌های فعل اکسیژن دارد (۲۸). در این مطالعه نیز بیان قابل توجهی برای این ژن در تیمار القای تنش اکسیداتیو نیترات نقره و طی مراحل پیری در سایر برگ‌ها دیده شد (شکل ۴). هم‌چنین نقش این ژن در فرآیند پیری حائز اهمیت است. از مهم‌ترین رخدادها طی فرآیند پیری، انتقال مولکول‌های بزرگ پس از تجزیه از برگ‌های مسن‌تر به انکارناپذیر دال بر نقش MT1 در کمک به دوام و بقای سلول‌های برگ به منظور انتقال کامل مواد پروتئینی و ذخیره‌ای به دانه وجود دارد (۶ و ۲۸). این موضوع می‌تواند دلیل موججه در تحلیل بیان بالای میزان نسخه‌برداری این ژن در نمونه‌های برگ پرچم باشد.

ژن CAT1 کدکننده آنزیم کاتالاز، و واجد نقش آنتی اکسیدانی می‌باشد. این ژن با پاکسازی رادیکال پراکسید هیدروژن (H_2O_2) نقش مهمی در تنظیم غلظت هیدروژن دارد. اگرچه غلظت زیاد پراکسید هیدروژن منجر به بروز تنش اکسیداتیو و خسارت‌های سلولی می‌گردد، ولی براساس نتایج برخی مطالعات، تأثیر غلظت‌های متعادل H_2O_2 به عنوان یک فاکتور انتقال پیام در بیان ژن‌ها و تنظیم فعالیت‌های سلول گزارش شده است (۲۴، ۲۸ و ۳۳). از آن جمله، پراکسید هیدروژن در تشکیل دیواره لیگنینی سلول‌های گیاهی نقش مهمی دارد (۲۱). هم‌چنین این رادیکال در بیان ژن‌های مسیر تولید هورمون‌های انتیلن، اسید جازمونیک و اسید سالسیلیک نقش مهمی ایفا می‌کند (۲۳). پراکسید هیدروژن با افزایش فعالیت مسیر متابولیک آنزیم MAP کیناز الگوی زمان‌بندی باز و

صفات فیزیولوژیک و بیان ژن‌های مهم فتوستتری و پیری برگ بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان تغییرات کلروفیل طی مراحل نمونه برداری روند کاهشی داشت. میزان تثبیت CO_2 خالص در برگ پرچم بیشتر بود و ثبات بیشتری نیز طی مراحل نمونه برداری نسبت به سایر برگ‌ها داشت. میزان شاخص سطح اکسیداسیونی سلولی در خلال مراحل پیری برگ به سرعت زیاد شد. بیان ژن‌های فتوستتری RCBS، MTI و Cab شباهت نسبی زیادی داشتند و با پیشرفت پیری برگ به طور قابل توجهی کاهش یافتند. الگوی بیان ژن‌های SODI و CATI پیری MTI و SAG12 تفاوت داشتند. به طور کلی، نتایج میین نقش مهم برگ پرچم در افزایش تولید دانه جو بود. این مسئله با توجه به تداوم فتوستتری، میزان کلروفیل و سرعت نسبی کمتر بروز تنش اکسیداتیو طی روند پیری در برگ پرچم، در مقایسه با سایر برگ‌ها، توجیه پذیر بود. ضمناً، فعالیت ژن‌های فتوستتری و ژن‌های واجد نقش هموستاتیک در خلال پیری بیان ممتازی در برگ پرچم نشان دادند.

می‌باشد که نقش آن شکستن زنجیره پلی پپتیدی پروتئین‌های بزرگ و تجزیه آنها به اسیدهای آمینه است. اصولاً انتقال مواد ذخیره‌ای (مولکول‌های بزرگ) تنها از طریق تجزیه و تفکیک آنها به اجزای کوچک‌تر امکان‌پذیر می‌باشد (۲۵). اهمیت این مسئله در خلال فرآیند پیری با توجه به ضرورت انتقال مولکول‌های بزرگ قبل از نکروز و مرگ سلولی بسیار زیاد است (۲۷). در این تحقیق بیان ژن SAG12 تنها در مرحله نهایی پیری در سایر برگ‌ها چشمگیر بود. این موضوع در سایر مطالعات نیز گزارش شده است و بر این اساس این کلون جزو ژن‌های اختصاصی پیری معرفی شده است (۲۸ و ۲۷). از نتایج درخور توجه، میزان بیان این ژن در مرحله پر شدن دانه در برگ پرچم بود. از آنجا که ژن SAG12 در مرحله نهایی پیری بیان می‌شود، به نظر می‌رسد برگ پرچم تداوم بیشتری در ادامه ماده‌سازی را دارد. بیان بالای نسبی کلون‌های MTI، RBCS و LhcII، cab مؤید این موضوع می‌باشد.

نتیجه‌گیری

اهمیت برگ پرچم در جو زراعی (واریته هوردا) از نظر برخی

منابع مورد استفاده

1. Arzani, A. 1378. Breeding Field Crops. Isfahan University of Technology Press, 606 p. (In Farsi).
2. Basaga, H. S. 1989. Biochemical aspects of free radicals. *Biochemistry and Cell Biology* 68: 989-998.
3. Baum, M., S. Grando, G. Backes, A. Jahoor, A. Sabbagh and S. Ceccarelli. 2003. QTLs for agronomic traits in the Mediterranean environment identified in recombinant inbred lines of the cross ‘Arta’×*H. spontaneum* 41-1. *Theoretical and Applied Genetics* 107(7): 1215-1225.
4. Bowler, C., M. Van Montagu and D. Inze. 1992. Superoxide dismutase and stress tolerance. *Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology* 43: 83-116.
5. Buchanan-Wollaston, V. and C. Ainsworth. 1997. Leaf senescence in *Brassica napus*: cloning of senescence related genes by subtractive hybridization. *Plant Molecular Biology* 33: 821-834.
6. Butt, A., K. Mousley, K. Morris, J. Beynon, C. Can, E. Holub, J. T. Greenberg and V. Buchanan-Wollaston. 1998. Differential expression of a senescence-enhanced metallothionein in *Arabidopsis* in response to isolates of *Peronospora parasitica* and *Pseudomonas syringae*. *Plant Journal* 16(2): 209-221.
7. Choi, H. W., Y. J. Kim, S. C. Lee, J. K. Hong and B. K. Hwang. 2007. Hydrogen peroxide generation by the pepper extracellular peroxidase CaPO₂ activates local and systemic cell death and defense response to bacterial pathogens. *Plant Physiology* 145: 890-904.
8. Dat, J., E. Vandebaele, M. Vranova, M. Van Montagu, D. Inze and F. Van Breusegem. 2000. Dual action of the active oxygen species during plant stress responses. *Cell Molecular Life Science* 57: 779-795.
9. Escoubas, P., L. Lajide and J. Mizutani. 1995. Termite antifeedant activity in *Aframomum melegueta*. *Phytochemistry* 40: 1097-1099.
10. FAO. 2005. FAOSTAT. <http://faostat.fao.org/>.
11. Golden, T. A., D. Hinerfeld and S. Melov. 2002. Oxidative stress and aging: Beyond correlation. *Aging Cell* 1: 117-123.

12. Hagege, D., A. Nouvelot, J. Boucard and T. Gaspar. 1990. Malondialdehyde titration with thiobarbiturate in plant extracts: Avoidance of pigment interference. *Phytochemical Analysis* 1: 86-89.
13. Hirota, O., M. Oka and T. Takeda. 1990. Sink activity estimation by sink size and dry matter increase during the ripening stage of barley (*Hordeum vulgare*) and rice (*Oryza sativa*). *Annals of Botany* 65(4): 349-354.
14. Hodges, D. M., J. M. Delong, C. F. Forney and R. K. Prange. 1999. Improving the thiobarbituric acid-reactive-substances assay for estimating lipid peroxidation plant tissues containing anthocyanin and other interfering compounds. *Planta* 207: 604-611.
15. Humbeck, K., S. Quast and K. Krupinska. 1996. Function and molecular changes in the photosynthetic apparatus during senescence of flag leaves from field-grown barley plants. *Plant Cell and Environment* 19: 337-344.
16. Ito, H., T. Ohtsuka and A. Tanaka. 1996. Conversation of chlorophyll b to chlorophyll a via 7-hydroxymethyl chlorophyll. *The Journal of Biological Chemistry* 271: 1475-1479.
17. Jukanti, A., N. Heidlebaugh, D. Parrott, I. Fischer, K. McInnerney and A. Fischer. 2008. Comparative transcriptome profiling of near-isogenic barley (*Hordeum vulgare*) lines differing in the allelic state of a major grain protein content locus identifies genes with possible roles in leaf senescence and nitrogen reallocation. *New Phytologist* 77: 333-349.
18. Krause, G.H. and E., Weis. 1991. Chlorophyll fluorescence and photosynthesis: The basics. *Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology* 42: 313-349.
19. Krupinska, K., M. Mulisch, J. Hollmann, K. Tokarz, W. Zschiesche, H. Kage, K. Humbeck and W. Bilger. 2011. An alternative strategy of dismantling of the chloroplasts during leaf senescence observed in a high-yield variety of barley. *Physiologia Plantarum* 118(2): 189-200.
20. Larkindale, J. D., J. R. Hall, M. Knight and E. Vierling. 2005. Heat stress phenotypes of *Arabidopsis* mutants implicate multiple signaling pathways in the acquisition of thermo tolerance. *Plant Physiology* 138: 882-897.
21. Lewis, N. G. and E. Yamamoto. 1990. Lignin-occurrence, biogenesis and biodegradation. *Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology* 41: 455-496.
22. Li, Z., S. R. M. Pinson, J. W. Stansel and A. H. Paterson. 1998. Genetic dissection of the source-sink relationship affecting fecundity and yield in rice (*Oryza sativa* L.). *Molecular Breeding* 4(5):419-426.
23. Mackerness, S.A.H. 2000. Plant responses to ultraviolet-B (UV-B: 280-320 nm) stress. What are the key regulators? *Plant Growth Regulators Journal* 32: 27-39.
24. Mackerness, S. A. H., B. R. Jordan and B. Thomas. 1999. Reactive oxygen species in the regulation of photosynthetic genes by ultraviolet-B radiation (UV-B: 280-320 nm) in green and etiolated buds of pea (*Pisum sativum* L.). *Journal of Photochemistry and Photobiology* 48: 180-188.
25. Mackerness, S. A. H., C. F. John, B. Jordan and B. Thomas. 2001. Early signaling components in ultraviolet-B responses: Distinct roles for different reactive oxygen species and nitric oxide. *FEBS Letters* 489: 237-242.
26. Munné-Bosch, S. and L. Alegre. 2004. Die and let live: Leaf senescence contributes to plant survival under drought stress. *Functional Plant Biology* 31: 203-216.
27. Navabpour, S. and M. B. Bagherieh Najjar. 2008. Molecular and biochemical analysis of oxidative stress and UV-B radiation in *Brassica napus*. *Journal of Agricultural Science and Natural Resources* 15(5): 23-33.
28. Navabpour, S., K. Morris, E. Harrison, S. Makerness and V. Buchanan-Wollaston. 2003. Expression of senescence enhanced genes in response to oxidative stress. *Journal of Experimental Botany* 54: 2285-2292.
29. Neill, S. J., R. Desikan, A. Clarke, R. Hurst and J. T. Hancock. 2001. Hydrogen peroxide and nitric oxide as signalling molecules in plants. *Journal of Experimental Botany* 52: 9-17.
30. Noh, Y. S. and R. M. Amasino. 1999. Identification of a promoter region responsible for the senescence-specific expression of SAG12. *Plant Molecular Biology* 41: 181-194.
31. Orozco-Cardenas, M. L., J. Narvaez-Vasquez and C. A. Ryan. 2001. Hydrogen peroxide acts as a sound messenger for the induction of defense genes in tomato plants in response to wounding, systemin, and methyl jasmonate. *Plant Cell* 13: 179-191.
32. Page, T., G. Griffiths and V. Buchanan-Wollaston. 2001. Molecular and biochemical characterization of postharvest senescence in broccoli. *Plant Physiology* 125: 718-727.
33. Pitzschke, A., C. Forzani and H. Hirt. 2006. Reactive oxygen species signaling in plants. *Antioxidative Redox Signal* 8: 1757-1764.
34. Porra, R. J. 1997. Recent progress in porphyrin and chlorophyll biosynthesis. *Photochemistry and Photobiology* 65: 492-516.
35. Porra, R. J., W.A. Thompson and P.E. Kriedmann. 1989. Determination of accurate extinction coefficients and simultaneous equations for assaying chlorophylls a and b extracted with four different solvents: Verification of the concentration of chlorophyll standards by atomic absorption spectroscopy. *Biochemistry and Biophysics Acta* 975: 384-394.

36. Sabat, S. C., A. Grover and P. Mohanti. 1989. Senescence induced alternations in the electron transport chain in wheat (*Triticum aestivum* L.) leaf chloroplasts. *Journal of Photochemistry and Photobiology* 3: 175-183.
37. Saito, A., T. Iino, K. Sonoike, E. Miwa and K. Higuchi. 2010. Remodeling of the major light-harvesting antenna protein of PSII protects the young leaves of barley (*Hordeum vulgare* L.) from photoinhibition under prolonged iron deficiency. *Plant Cell Physiology* 51(12): 2013-2030.
38. Scharrenberg, C., J. Falk, S. Quast, K. Haussühl and K. Humbeck. 2003. Isolation of senescence-related cDNAs from flag leaves of field grown barley plants. *Physiologia Plantarum* 118(2): 278-288.
39. Zheng, T. 1999. Effects of some photosynthetic organs on milking and grain yield of barley. *Barley Science* 1: 21-22.