

ارزیابی تحمل ژنوتیپ‌های مختلف برنج به شوری آب آبیاری

سمر جعفری‌راد^۱، محسن زواره^{۲*}، محمدرضا خالیدیان^۳ و مجتبی رضایی^۴

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۳/۳۱؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰)

چکیده

به منظور بررسی پاسخ هفت ژنوتیپ برنج (خزر، SA13، دیلم، سنگ‌جو، سپیدرود، لاین ۸۳۱ و T5)، به سطوح مختلف شوری آب آبیاری و تعیین شاخص‌های تحمل آنها به شوری، آزمایشی به صورت گلدانی زیر باران‌گیر با آرایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار و پنج سطح شوری (۱، ۲، ۴، ۶ و ۸ دسی‌زیمنس بر متر) در مؤسسه تحقیقات برنج کشور - رشت در سال ۱۳۹۰ اجرا شد. با استفاده از داده‌های عملکرد دانه در دو محیط با تنش شوری (۸ دسی‌زیمنس بر متر) و بدون تنش (۱ دسی‌زیمنس بر متر)، شاخص حساسیت به تنش (SSI)، شاخص تحمل (TOL)، میانگین بهره‌وری تولید (MP)، میانگین هندسی قابلیت تولید (GMP)، میانگین هارمونیک (HM)، شاخص تحمل به تنش (STI)، شاخص عملکرد (YI) و شاخص پایداری عملکرد (YSI) محاسبه و میزان همبستگی آنها با عملکرد دانه برآورد شد. نتایج نشان داد که شاخص‌های تحمل و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های مورد مطالعه، تفاوت بسیار معنی‌داری با یکدیگر داشتند. در بین شاخص‌های مورد استفاده، STI و MP توانایی بهتری در شناسایی ژنوتیپ‌های برنج متحمل به شوری داشتند. در این آزمایش، بیشترین عملکرد بوته در هر دو شرایط بدون تنش و تنش (به ترتیب ۱۹/۷۱ و ۱۰/۶۹ گرم) مربوط به لاین T5 بود. کمترین عملکرد بوته در شرایط بدون تنش مربوط به رقم‌های سنگ‌جو (۱۲/۴۲ گرم) و دیلم (۱۱/۸۴ گرم) بود. در شرایط تنش، کمترین عملکرد در رقم خزر (۴/۲۹ گرم) دیده شد. بیشترین درصد کاهش عملکرد با افزایش شوری مربوط به رقم خزر (۶۹/۴۹ درصد) و کمترین آن مربوط به رقم سنگ‌جو (۳۱/۴۸ درصد) بود. در کل، می‌توان لاین‌های T5 و ۸۳۱ و رقم‌های سپیدرود و سنگ‌جو را به عنوان ژنوتیپ‌های احتمالاً برتر در هر دو شرایط شور و غیر شور برای آزمایش‌های بعدی در نظر گرفت.

واژه‌های کلیدی: آب شور، بهبود عملکرد، تحمل تنش، شاخص مقاومت، میانگین بهره‌وری

۱ و ۲. به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

۳. استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

۴. پژوهشگر مؤسسه تحقیقات برنج کشور و دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ساری

*. مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: mzavareh@guilan.ac.ir

مقدمه

برنج دومین غله مهم جهان است که غذای اصلی بیش از نیمی از مردم دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد. این گیاه که بین عرض های جغرافیایی ۵۳ درجه شمالی تا ۴۰ درجه جنوبی کشت می شود (۱۷)، در ایران هم جایگاه ویژه ای دارد. سطح زیر کشت آن در ایران نزدیک به ۵۳۵۸۱۳ هکتار است که حدود ۱۸۱۶۹۴ هکتار از آن در استان گیلان قرار دارد (۳۴).

شوری آب و خاک از جمله عواملی هستند که می توانند کشت بسیاری از گیاهان، از جمله برنج را محدود کنند. شوری خاک به دلیل ایجاد سمیت و جلوگیری از جذب آب و عناصر غذایی و برهم زدن توازن آنها، یکی از مهم ترین محدودیت های رشد گیاهان زراعی و یکی از مشکلات بزرگ کشت های آبی محسوب می شود (۳). از آنجا که بسیاری از تنش ها، از جمله شوری و خشکی، با هم برهمکنش دارند، تحمل و حساسیت به یک تنش می تواند بر تحمل و حساسیت به تنش های دیگر هم اثر بگذارد (۵) که این حالت در بین جنس های مختلف و حتی بین گونه های مختلف یک جنس، متفاوت است. تنوع پاسخ ژنوتیپ های برنج به خشکی و شوری و مشاهده برهمکنش بین تنش ها نشان می دهد که ممکن است تحمل به خشکی در برنج، با تحمل آن به شوری در ارتباط باشد. تحمل به شوری یک ویژگی ژنتیکی پیچیده است که توسط تعداد زیادی ژن کنترل می گردد (۲۱ و ۲۲) و مقدار آن در بین گونه های مختلف و حتی ژنوتیپ های درون یک گونه متفاوت است.

برنج از جمله گیاهانی است که حساسیت زیادی به شوری داشته و این حساسیت در آغاز مرحله رشد زایشی بیشتر از سایر مراحل است (۱۸). استفاده از آب شور در دوره رشد رویشی باعث تأخیر در گل دهی، رسیدگی برنج، کاهش تعداد پنجه، کاهش زیست توده و سطح برگ و در مرحله رشد زایشی باعث کاهش تعداد خوشه چه پر، خوشه بارور، وزن صد دانه، درصد باروری دانه و افزایش نسبت پنجه های نابارور می شود (۷ و ۱۶). اثرات این تنش بر عملکرد در شرایط هوای گرم و

تأخیر زیاد بیشتر می شود (۴). در این شرایط کاشت ارقام متحمل به تنش شوری برای کاهش اثر شوری لازم به نظر می رسد.

برای بررسی واکنش ارقام به تنش شوری از شاخص های متفاوتی استفاده می شود که یکی از آنها شاخص حساسیت به تنش (SSI) است (۱۰) که مقادیر کمتر آن نشان دهنده مقاومت بیشتر یک ژنوتیپ به تنش است. بنابراین، گزینش براساس شاخص SSI باعث ایجاد ژنوتیپ هایی با عملکرد نسبتاً پایین در شرایط عادی و عملکرد بالا در شرایط تنش می گردد (۸ و ۹). از شاخص های دیگر می توان به شاخص تحمل (TOL) و میانگین حسابی یا بهره وری تولید (MP) اشاره کرد (۳۳). مقادیر بالای شاخص تحمل (TOL) بیانگر حساسیت بیشتر به تنش بوده و هرچه مقدار آن کمتر باشد، مطلوب تر است. گزارش شده که انتخاب براساس SSI و TOL منجر به گزینش ژنوتیپ هایی با عملکرد کمتر در شرایط بدون تنش و عملکرد نسبتاً بیشتر در شرایط تنش شده است (۲۳). انتخاب بر مبنای شاخص MP به گزینش ژنوتیپ هایی با پتانسیل عملکرد بالاتر ولی با تحمل به تنش پایین تر منجر می شود (۲۶). شاخص های تحمل به تنش (STI) و میانگین هندسی بهره وری (GMP) برای شناسایی ژنوتیپ هایی که در هر دو شرایط عادی و تنش عملکرد مطلوبی تولید می کنند، پیشنهاد شده اند (۸). شاخص GMP حساسیت کمتری به اختلاف عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش دارد، لذا کمتر تحت تأثیر عملکرد نسبتاً بالا در یکی از محیط ها قرار می گیرد؛ بنابراین، شاخص مناسبی برای تشخیص ارقامی با تولید مطلوب در هر دو محیط تنش و نرمال می باشد. گزارش شده که شاخص تحمل به تنش (STI) شاخص مناسبی برای انتخاب ژنوتیپ ها جهت دستیابی به عملکرد بالا تحت شرایط تنش می باشد (۸). این شاخص، ژنوتیپ هایی که دارای عملکرد بالا در هر دو شرایط تنش و بدون تنش هستند را از سایر گروه ها جدا می کند. بر پایه واکنش ژنوتیپ ها در شرایط وجود و یا عدم وجود تنش، چهار گروه ژنوتیپ هایی که عملکرد بالایی در هر دو محیط تنش و بدون تنش دارند (A)،

جدول ۱. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده

ویژگی‌های خاک	مقدار
درصد شن	۹
درصد سیلت (لای)	۳۶
درصد رس	۵۵
اسیدیته خاک	۶/۳
درصد نیتروژن کل	۰/۲۳
فسفر قابل دسترس (میلی گرم در کیلوگرم خاک)	۱۵/۶
پتاسیم قابل دسترس (میلی گرم در کیلوگرم خاک)	۲۳۴
کربن آلی (درصد)	۲/۵
شوری عصاره اشباع خاک (دسی‌زیمنس بر متر)	۰/۱۷
بافت خاک	رسی

مواد و روش‌ها

این پژوهش در سال ۱۳۹۰ در مؤسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت با عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۱۲ دقیقه و ۷۹ ثانیه شمالی و طول ۴۹ درجه و ۳۸ دقیقه و ۷۷ ثانیه شرقی و با ارتفاع ۲۶/۴ متر از سطح دریای آزاد انجام شد. به منظور بررسی پاسخ هفت ژنوتیپ برنج (خزر و SA13 از گروه حساس، دیلم از گروه میانه و سنگ‌جو، سپیدرود، لاین ۸۳۱ و T5 از گروه متحمل به تنش خشکی (۱۳)، به سطوح مختلف شوری و تعیین شاخص‌های تحمل آنها بر مبنای عملکرد دانه، آزمایشی به صورت گلدانی زیر باران‌گیر، با آرایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. ژنوتیپ‌های مذکور در پنج سطح شوری NaCl و CaSO_4 با نسبت ۱:۲ (هدایت الکتریکی ۱ (شاهد)، ۲، ۴، ۶ و ۸ دسی‌زیمنس بر متر) مورد بررسی قرار گرفتند. اطراف باران‌گیر مورد استفاده کاملاً باز بوده و اجازه تهویه هوا و جریان باد را فراهم می‌کرد تا دما و رطوبت نسبی درون آن از محیط بیرون تفاوت معنی‌داری نداشته باشد. آزمایش در گلدان‌هایی با قطر دهانه ۲۵ سانتی‌متر و عمق ۲۷ سانتی‌متر، حاوی ۹ کیلوگرم خاک (جدول ۱) و سه نشاء انجام شد. کود مصرفی با توجه به نتایج آزمون خاک (جدول ۱) تعیین شد. تمامی فسفر ۰/۰۶۶ گرم در کیلوگرم خاک خشک)، پتاس ۰/۰۸۸ گرم در کیلوگرم خاک خشک) و نصف مقدار نیتروژن ۰/۰۶۶ گرم در کیلوگرم خاک خشک) به صورت پایه

ژنوتیپ‌هایی که عملکرد بالایی فقط در شرایط محیطی بدون تنش دارند (B)، ژنوتیپ‌هایی که عملکرد خوبی فقط در شرایط تنش دارند (C) و ژنوتیپ‌هایی که عملکرد پایینی در هر دو محیط تنش و بدون تنش دارند (D) مشخص شده است (۸). بر این اساس، شاخصی مناسب‌تر است که بتواند ژنوتیپ‌های گروه A را از سایر گروه‌ها تشخیص دهد (۸). ژنوتیپ‌های پایدارتر بر اساس این شاخص دارای مقادیر بالاتر STI هستند، بنابراین انتظار می‌رود که با استفاده از این شاخص ژنوتیپ‌های گروه A از سایر گروه‌ها قابل تفکیک باشند. میانگین هارمونیک (HM) هم شاخص دیگری است که برای بررسی نمود ژنوتیپ‌ها در شرایط تنش و شرایط بهینه معرفی شده است (۸).

علاوه بر موارد بالا، شاخص‌های پایداری عملکرد (YSI) (۶) و شاخص عملکرد (YI) (۱۲) هم معرفی شده است. YI موجب رتبه‌بندی ارقام بر حسب میزان عملکرد تولیدی آنها در محیط تنش می‌گردد (۳۲) درحالی‌که YSI نشان‌دهنده میزان مقاومت ژنتیکی یک رقم به تنش می‌باشد، در نتیجه رقم یا ژنوتیپی با میزان بالای شاخص عملکرد باید عملکرد بالایی در هر دو محیط تنش و بدون تنش تولید نماید. در کل بیان شده که رقم یا ژنوتیپی که YI، STI، HM، GMP، MP و YSI بیشتر و SSI و TOL کمتری دارد، متحمل‌تر می‌باشد (۱۵ و ۲۵). شاخص‌های بالا عمدتاً برای تنش خشکی استفاده شده‌اند و

جدول ۲. تجزیه واریانس عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج در

تیمارهای مختلف شوری		
منابع تغییر	درجه	میانگین مربعات
شوری	۴	۴/۲۸**
شوری × ژنوتیپ	۲۴	۰/۱۱**
خطا	۷۰	۰/۰۳۵
CV%		۲۳/۷۵

ns, ** و * : به ترتیب غیر معنی‌دار و معنی‌دار در سطح ۱٪ و ۵٪

و بقیه نیتروژن در مرحله حداکثر پنجه زنی استفاده شد. نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ترتیب از منابع اوره، سوپر فسفات تربیل و سولفات پتاسیم بودند. آبیاری گلدان‌ها به گونه‌ای انجام شد که همیشه حداقل ۵ سانتی‌متر آب روی خاک گلدان‌ها موجود باشد. پس از ده روز آبیاری با آب معمولی، تیمارهای شوری اعمال شدند. برای جلوگیری از انباشت نمک در طول فصل چند بار گلدان‌ها آبشویی شدند. بدین صورت که پس از گذشت هر دو هفته، آب شور گلدان‌ها تخلیه شده و به مدت یک روز به آنها آب معمولی داده می‌شد و دوباره اعمال تیمارهای شوری ادامه می‌یافت. در زمان رسیدگی فیزیولوژیک، بوته‌ها برداشت شدند و وزن شلتوک به عنوان عملکرد دانه در نظر گرفته شد.

برای ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌ها از لحاظ عملکرد دانه و تعیین ارقام مقاوم‌تر به تنش، از شاخص‌های زیر استفاده شد: SSI: شاخص حساسیت به تنش (۱۰)، TOL: شاخص تحمل (۲۶)، MP: میانگین عملکرد یا میانگین بهره‌وری یا میانگین حسابی (۲۶)، GMP: میانگین هندسی بهره‌وری (۸)، STI: شاخص تحمل به تنش (۸)، HM: میانگین هم‌ساز یا هارمونیک (۸)، YI: شاخص عملکرد (۱۲) و YSI: شاخص پایداری عملکرد (۶) به ترتیب از روابط ۱ تا ۸ به دست آمدند:

$$SSI = \frac{(1 - \frac{Y_s}{Y_p})}{SI} \quad (۱)$$

$$SI = 1 - \frac{\bar{Y}_s}{\bar{Y}_p}$$

$$TOL = Y_p - Y_s \quad (۲)$$

$$MP = \left(\frac{Y_p + Y_s}{2} \right) \quad (۳)$$

$$GMP = \sqrt{Y_p Y_s} \quad (۴)$$

$$STI = \frac{Y_p \times Y_s}{(\bar{Y}_p)^2} \quad (۵)$$

$$HM = \frac{2Y_p Y_s}{(Y_p + Y_s)} \quad (۶)$$

$$YI = \frac{Y_s}{Y_p} \quad (۷)$$

$$YSI = \frac{Y_s}{Y_p} \quad (۸)$$

که در آنها SI = شاخص تنش؛ Y_p = عملکرد ژنوتیپ مورد نظر در محیط بدون تنش؛ Y_s = عملکرد ژنوتیپ مورد نظر در محیط دارای تنش (EC = ۸)؛ $\bar{Y}_p$ = میانگین عملکرد همه ژنوتیپ‌ها در محیط بدون تنش و $\bar{Y}_s$ = میانگین عملکرد همه ژنوتیپ‌ها در محیط دارای تنش است.

به منظور تعیین مناسب‌ترین شاخص برای تشخیص ژنوتیپ‌های متحمل به تنش، همبستگی بین عملکرد (در شرایط تنش و بدون تنش) و شاخص‌های مختلف از نرم‌افزار SAS 9.1 استفاده شد. تفکیک دقیق‌تر ژنوتیپ‌ها بر اساس نمودار سه بعدی X، Y و Z صورت گرفت که بدین منظور از نرم‌افزار آماری SPSS 16 استفاده گردید. شاخص‌هایی که در هر دو محیط دارای همبستگی نسبتاً بالایی با عملکرد دانه بودند، به عنوان بهترین شاخص‌ها شناسایی و توابع عملکرد به همراه ضریب تبیین به دست آمدند.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس (جدول ۲) نشان داد که شوری، ژنوتیپ و برهمکنش آنها تأثیر بسیار معنی‌داری بر عملکرد دانه داشته است که بیانگر تفاوت واکنش ژنوتیپ‌ها در شوری‌های مختلف در تولید دانه است.

محاسبه شاخص‌ها بر پایه عملکرد دانه نشان داد که بر پایه SSI چهار ژنوتیپ خزر، SA13، سپیدرود و ۸۳۱ در گروه

جدول ۳. مقایسه میانگین شاخص‌های تحمل و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج در محیط بدون تنش (P) و دارای تنش (S)

YSI	YI	HM	GMP	MP	STI	SSI	TOL	Y _s	Y _p	رقم
۰/۳۱ ^b	۰/۶۰ ^c	۵/۳۱ ^c	۶/۰۸ ^d	۹/۱۷ ^c	۰/۲۵ ^c	۱/۲۸ ^a	۹/۷۶ ^a	۴/۲۹ ^c	۱۴/۰۶ ^{dc}	خزر
۰/۳۰ ^b	۰/۷۲ ^{bc}	۶/۲۹ ^{bc}	۷/۰۹ ^{cd}	۱۰/۶۸ ^{bc}	۰/۳۶ ^{bc}	۱/۲۹ ^a	۱۱/۱۸ ^a	۵/۰۹ ^{bc}	۱۶/۲۸ ^{bc}	SA13
۰/۴۲ ^{ab}	۰/۹۴ ^{bc}	۸/۶۰ ^{bc}	۹/۵۸ ^{bc}	۱۱/۶۷ ^{bc}	۰/۴۵ ^{bc}	۱/۰۶ ^{ab}	۹/۵۵ ^a	۶/۹۰ ^{bc}	۱۶/۴۵ ^{bc}	سپیدرود
۰/۴۵ ^{ab}	۱/۱۳ ^{ab}	۹/۹۲ ^{ab}	۱۰/۸۸ ^{ab}	۱۳/۳۱ ^{ab}	۰/۶۱ ^{ab}	۱/۰۱ ^{ab}	۱۰/۲۰ ^a	۸/۲۱ ^{ab}	۱۸/۴۲ ^{ab}	لاین ۸۳۱
۰/۶۹ ^a	۰/۹۲ ^{bc}	۷/۷۰ ^{bc}	۸/۳۴ ^{bcd}	۹/۳۳ ^c	۰/۳۵ ^{bc}	۰/۵۸ ^b	۵/۰۱ ^{bc}	۶/۸۲ ^{bc}	۱۱/۸۴ ^d	دیلیم
۰/۶۸ ^a	۱/۱۸ ^{ab}	۹/۵۰ ^{ab}	۹/۹۳ ^{bc}	۱۰/۴۶ ^c	۰/۴۴ ^{bc}	۰/۵۸ ^b	۳/۹۰ ^c	۸/۵۱ ^{ab}	۱۲/۴۲ ^d	سنگ‌جو
۰/۵۴ ^{ab}	۱/۴۹ ^a	۱۲/۵۰ ^a	۱۳/۵۶ ^a	۱۵/۲۰ ^a	۰/۸۷ ^a	۰/۸۴ ^{ab}	۹/۰۱ ^{ab}	۱۰/۷۰ ^a	۱۹/۷۱ ^a	T5

در هر ستون میانگین‌هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند براساس آزمون LSD، اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال ۱٪ ندارند.

Y_p = عملکرد در شرایط بدون تنش (گرم در بوته) و Y_s = عملکرد در شرایط تنش (گرم در بوته)، SSI = شاخص حساسیت به تنش، TOL = شاخص تحمل، MP = میانگین عملکرد، GMP = میانگین هندسی بهره‌وری، STI = شاخص تحمل به تنش، HM = میانگین همساز یا هارمونیک، YI = شاخص عملکرد و YSI = شاخص پایداری عملکرد

در شرایط بدون تنش و دارای تنش زیاد نباشد (۳۲).

نتایج مقایسه میانگین شاخص‌های GMP و HM (جدول ۳) نیز نشان داد که لاین T5 و پس از آن لاین ۸۳۱ بدون اختلاف معنی‌دار از هم، بیشترین مقدار این شاخص‌ها را داشته‌اند درحالی‌که رقم خزر کمترین مقدار این دو شاخص را به خود اختصاص داد. به‌علاوه، لاین T5 در شرایط بدون تنش (۱۹/۷۱ گرم در بوته) و در شرایط شور (۱۰/۶۹ گرم در بوته) هم بیشترین عملکرد دانه را داشت (جدول ۳). بیشترین مقدار عددی YI هم متعلق به لاین T5، سنگ‌جو و لاین ۸۳۱ بود. بر اساس شاخص پایداری عملکرد (YSI)، ژنوتیپ‌های دیلم، سنگ‌جو، T5، لاین ۸۳۱ و سپیدرود بدون اختلاف معنی‌دار در یک گروه قرار گرفتند و بیشترین مقدار این شاخص را به خود اختصاص دادند (جدول ۳). در مجموع، با توجه به مقدار شاخص‌های STI، MP، GMP، HM و YI می‌توان گفت که احتمالاً لاین T5 بیشترین تحمل و رقم خزر بیشترین حساسیت را به تنش شوری نشان داده است. اما مقادیر پایین‌تر شاخص‌های SSI و TOL در رقم سنگ‌جو (جدول ۳)، آن را به‌عنوان رقم مقاوم‌تر مطرح می‌کند. در این مطالعه شاخص STI به‌خوبی توانست ژنوتیپ‌هایی که در هر دو شرایط تنش و بدون

حساس به شوری و ژنوتیپ‌های سنگ‌جو، دیلم و T5 در گروه مقاوم به شوری قرار می‌گیرند (جدول ۳) زیرا پایین بودن مقدار این شاخص نشان‌دهنده تحمل بیشتر ژنوتیپ به تنش می‌باشد. از نظر شاخص TOL که مقادیر بالای آن نشانگر حساسیت بیشتر به تنش بوده و لذا، مقادیر کمتر آن مطلوب است، رقم سنگ‌جو کمترین حساسیت را نسبت به تنش نشان داد، پس از آن ژنوتیپ‌های دیلم و T5 به‌عنوان متحمل‌ترین ژنوتیپ‌ها گروه‌بندی شدند (جدول ۳). انتخاب بر اساس شاخص TOL اغلب موجب گزینش ژنوتیپ‌هایی می‌شود که در شرایط معمول دارای عملکرد نسبتاً پایینی هستند. به‌عبارت دیگر شاخص مذکور قادر به تفکیک ژنوتیپ‌های متحمل به تنش از ژنوتیپ‌هایی که پتانسیل عملکرد کمتر دارند، نیست. بنابراین انتخاب بر اساس شاخص تحمل زمانی ارزشمند است که گیاه برای محیط‌های دارای تنش در نظر باشد. محاسبه و مقایسه شاخص STI و MP برای ژنوتیپ‌ها نشان داد که لاین T5 و لاین ۸۳۱ بدون اختلاف معنی‌دار از هم، بیشترین و رقم خزر کمترین مقدار این دو شاخص را به خود اختصاص داده‌اند (جدول ۳). با این حال، انتخاب ژنوتیپ‌ها بر اساس شاخص MP زمانی سودمند است که شدت تنش و اختلاف بین عملکرد

جدول ۴. ضرایب همبستگی بین شاخص‌های تحمل و عملکرد ژنوتیپ‌ها در شرایط بدون تنش (Y_p) و دارای تنش (Y_s)

YSI	YI	HM	GMP	MP	STI	SSI	TOL	Y_s	Y_p	
-۰/۴۱	۰/۴۶	۰/۵۵	۰/۶۱	۰/۹۰**	۰/۷۷*	۰/۴۰	۰/۷۲	۰/۴۵	۱	Y_p
۰/۶۰	۰/۱۰**	۰/۹۹**	۰/۹۸**	۰/۸۰*	۰/۹۰**	-۰/۶۲	-۰/۳۰	۱		Y_s
-۰/۹۱**	-۰/۲۸	-۰/۱۸	-۰/۱۰	۰/۳۴	۰/۱۲	۰/۹۱**	۱			TOL
-۰/۱۰**	-۰/۵۹	-۰/۵۲	-۰/۴۶	-۰/۰۴	-۰/۲۵	۱				SSI
۰/۲۴	۰/۹۱**	۰/۹۴**	۰/۹۶**	۰/۹۷**	۱					STI
۰/۰۲	۰/۸۱*	۰/۸۶*	۰/۹۰**	۱						MP
۰/۴۴	۰/۹۸**	۰/۱۰**	۱							GMP
۰/۵۰	۰/۹۹**	۱								HM
۰/۵۸	۱									YI
۱										YSI

* و **: به ترتیب معنی‌دار در سطوح احتمال ۵٪ و ۱٪.


Y_p = عملکرد در شرایط بدون تنش، Y_s = عملکرد در شرایط تنش، SSI = شاخص حساسیت به تنش، TOL = شاخص تحمل، MP = میانگین عملکرد، GMP = میانگین هندسی بهره‌وری، STI = شاخص تحمل به تنش، HM = میانگین همساز یا هارمونیک، YI = شاخص عملکرد و YSI = شاخص پایداری عملکرد

مورد استفاده بوده‌اند (۲). ارزیابی قابلیت استفاده از شاخص‌های تحمل خشکی در هیبریدهای آفتابگردان هم نشان داد که شاخص STI برای شناسایی هیبریدهای پر محصول و متحمل به تنش خشکی آفتابگردان از سایر شاخص‌ها مؤثرتر می‌باشد (۱۵). در گزارش دیگری نیز بین شاخص STI و عملکرد دانه در هر دو محیط تنش و بدون تنش، همبستگی مثبت و معنی‌داری به‌دست آمد (۱۴).


براساس نتایج این پژوهش (جدول ۳)، لاین T5 و ۸۳۱ در گروه A (دارای عملکرد بالا در هر دو شرایط بهینه و تنش)، لاین SA13 و رقم سپیدرود در گروه B (عملکرد بالا در شرایط بدون تنش ولی با کاهش عملکردی به‌ترتیب ۶۸/۷۳ و ۵۸/۰۵ درصد در شرایط تنش)، رقم سنگ‌جو در گروه C (عملکرد بالا در شرایط بدون تنش و کاهش عملکرد در شرایط تنش) و رقم دیلم و خزر در گروه D (عملکرد پایین در هر دو شرایط تنش و بدون تنش) قرار گرفتند. کاهش عملکرد دو رقم اخیر در تنش شوری به‌ترتیب ۴۲/۳۹ و ۶۹/۵ درصد بود.

با توجه به این‌که بهترین شاخص برای غربال کردن ژنوتیپ‌های متحمل‌تر به تنش، شاخصی است که همبستگی بالایی با عملکرد دانه در هر دو شرایط عادی و تنش داشته باشد (۲۸)، ضرایب همبستگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج

تنش عملکرد نسبتاً بالایی داشتند را شناسایی نماید (جدول ۳). از آنجا که بر مبنای تقسیم‌بندی ارایه شده (۲۱)، ژنوتیپ‌هایی که در گروه A قرار می‌گیرند برای گزینش بهتر هستند، لذا می‌توان انتظار داشت که ژنوتیپ‌های T5 و ۸۳۱ در هر دو محیط عملکرد بالاتری داشته باشند. در آزمایشی که روی ژنوتیپ‌های گندم تحت تنش شوری در استان گلستان (۲۹) و در آزمایش دیگری که روی ارقام نیشکر در تنش شوری در اصفهان (۳۳) انجام شد نیز شاخص STI به‌عنوان مطلوب‌ترین شاخص تحمل به تنش برای ارزیابی‌های مرتبط با گزینش ژنوتیپ‌های برتر معرفی شد. در آزمایش دیگری که روی ۳ واریته کلزا انجام شد، شاخص‌های MP، GMP و STI به‌عنوان مناسب‌ترین شاخص‌ها برای گزینش ژنوتیپ‌های با عملکرد بالا در هر دو شرایط تنش و عدم تنش معرفی شدند (۳۰). در آزمایشی که توسط رنجبر و روستا (۲۴) روی ۱۴ ژنوتیپ گندم در شرایط شور انجام شد همبستگی معنی‌داری بین متوسط عملکرد ژنوتیپ‌ها با شاخص‌های STI و MP مشاهده شد. در این بررسی نیز STI و MP به‌عنوان مناسب‌ترین شاخص‌ها مشخص شدند و به‌خوبی توانستند ژنوتیپ‌ها را از هم تفکیک نمایند. گزارشی هم وجود دارد که تأکید می‌کند دو شاخص STI و MP در جداسازی ارقام گروه A مؤثرتر از بقیه شاخص‌های



شکل ۲. پراکنش ژنوتیپ‌ها بر اساس عملکرد در شرایط بدون تنش (YP)، تنش (YS) و شاخص میانگین حسابی (MP)




شکل ۱. پراکنش ژنوتیپ‌ها بر اساس عملکرد در شرایط بدون تنش (YP)، تنش (YS) و شاخص تحمل تنش (STI)

گرم در بوته و برای رقم خزر به ترتیب برابر ۱۴/۰۶ و ۴/۲۹ گرم در بوته است (جدول ۲). در یک مطالعه دیگر که با هدف بررسی تحمل به شوری ارقام بومی و اصلاح شده برنج ایرانی انجام شد نیز رقم خزر به عنوان رقمی بسیار حساس به شوری معرفی شده است (۲۷).

به منظور بررسی دقیق‌تر پایداری عملکرد ژنوتیپ‌ها و همچنین، دستیابی به ژنوتیپ‌های با عملکرد دانه بیشتر در هر دو شرایط تنش و بدون تنش، از نمودار پراکنش سه بعدی استفاده گردید که در آن، عملکرد دانه در شرایط عادی روی محور Z ها، عملکرد دانه در شرایط تنش روی محور X ها و شاخص‌های برتر به دست آمده در بررسی‌های فوق (STI یا MP) روی محور Y ها نمایش داده شد (شکل ۱ و ۲). برای نشان دادن روابط بین این سه متغیر و تفکیک ژنوتیپ‌های گروه A از سایر گروه‌ها (B، C و D) و تشخیص سودمندی شاخص مورد نظر به عنوان معیاری برای انتخاب ژنوتیپ‌های پربازده و متحمل‌تر به تنش، سطح X-Y به وسیله خطوط متقاطع به چهار گروه A، B، C و D تقسیم گردید.

در بررسی این شکل‌ها (۱ و ۲) مشاهده شد که لاین‌های T5 و ۸۳۱ در گروه A قرار گرفتند که STI و MP بالایی نیز دارند. این یافته بر سودمندی این شاخص‌ها در تفکیک ژنوتیپ‌های گروه A از دیگر گروه‌ها تأکید می‌کند. بنابراین، ژنوتیپ‌های مذکور را می‌توان به عنوان ژنوتیپ‌های متحمل‌تر و با عملکرد

نشان داد که دو شاخص STI و MP دارای همبستگی مثبت و بسیار معنی‌دار با عملکرد دانه در هر دو شرایط نرمال و تنش بودند (جدول ۴). GMP، HM و YI در شرایط تنش همبستگی مثبت و بسیار معنی‌داری با عملکرد دانه داشتند ولی همبستگی آنها با عملکرد در شرایط بدون تنش معنی‌دار نبود (جدول ۴). بین شاخص SSI و عملکرد دانه در هیچ‌یک از شرایط تنش و بدون تنش همبستگی معنی‌داری دیده نشد (جدول ۴) که مشابه آن در برخی پژوهش‌های دیگر هم مشاهده شده است (۱۵). شاخص‌های YSI و TOL نیز با عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش همبستگی معنی‌داری نشان ندادند (جدول ۴). همبستگی مثبت و معنی‌دار شاخص‌های SSI و TOL بیانگر این نکته است که استفاده از این دو شاخص در غربالگری ژنوتیپ‌ها سبب گزینش ژنوتیپ‌هایی با پتانسیل عملکرد کمتر در شرایط بدون تنش می‌گردد. معنی‌داری همبستگی STI و MP با عملکرد دانه در هر دو شرایط تنش و بدون تنش نشان می‌دهد که این دو شاخص احتمالاً در شناسایی ژنوتیپ‌هایی که در هر دو شرایط توانایی تولید عملکرد بیشتری دارند، موفق‌تر خواهند بود. بنابراین، با توجه به یافته‌های این آزمایش و در نظر گرفتن این دو شاخص برای گزینش ژنوتیپ‌ها، لاین T5 به عنوان متحمل‌ترین و رقم خزر به عنوان حساس‌ترین ژنوتیپ در نظر گرفته می‌شوند. عملکرد دانه لاین T5 در رژیم‌های آبیاری معمول و تنش شوری به ترتیب معادل ۱۹/۷۱ و ۱۰/۶۹



مؤلفه اول

شکل ۳. ترسیم گرافیکی بای پلات بر اساس مؤلفه اول و دوم

برای ژنوتیپ‌های مورد مطالعه در برنج

داده‌اند را می‌توان به‌عنوان ژنوتیپ‌های پایدارتر و متحمل‌تر به تنش در نظر گرفت. از آنجا که لاین T5 و بعد از آن، لاین ۸۳۱ در مجاورت بردار بهترین شاخص‌ها (MP و STI) و در ناحیه مربوط به ژنوتیپ‌های متحمل‌تر به تنش قرار گرفته‌اند، لذا، هر دوی آنها را می‌توان در گروه A در نظر گرفت. در کل، بر اساس یافته‌های به‌دست آمده از شاخص‌های مقاومت و ترسیم بای پلات می‌توان گفت که احتمالاً لاین T5 متحمل‌ترین ژنوتیپ در بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه است.

استفاده از تکنیک تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و ترسیم بای پلات به‌منظور گروه‌بندی ژنوتیپ‌های در شرایط تنش، علاوه بر گیاه برنج (۱۹)، در گیاهان دیگری از جمله بزرک (۲۰)، سویا (۳۶)، ماش (۳۵) و نیشکر (۳۳) نیز گزارش شده است.

توابع عملکرد بر حسب سطوح شوری آب آبیاری

معادلات برازش یافته روی داده‌های عملکرد ژنوتیپ‌ها در سطوح مختلف شوری دارای ضریب تبیینی برابر یا بیش از ۷۸ درصد (دیلیم) بودند که نشان‌دهنده برازش مناسب توابع بر داده‌های آزمایشی است. از نتایج برازش داده‌های عملکرد لاین SA13 مشخص می‌شود که عملکرد این ژنوتیپ در شوری ۷ دسی‌زیمنس بر متر به صفر می‌رسد که بیانگر حساسیت زیاد این ژنوتیپ به شوری است (شکل ۴).

بیشتر در هر دو شرایط نرمال و تنش معرفی کرد.

برای مطالعه روابط سه متغیر می‌توان از نمودار سه بعدی استفاده نمود ولی در صورتی که بررسی روابط بیش از سه متغیر به‌صورت هم‌زمان مدنظر باشد، ترسیم گرافیکی بای پلات سودمند می‌باشد. لذا تجزیه بای پلات گابریل ابزار مفیدی به‌منظور بررسی هم‌زمان کلیه شاخص‌های تحمل به تنش و عملکرد دانه در شرایط بدون تنش و تنش هم‌چنین بررسی دقیق‌تر تحمل به تنش ژنوتیپ‌ها می‌باشد (۱۱).

تجزیه به مؤلفه‌های اصلی

نظر به بررسی ضرایب همبستگی شاخص‌های مقاومت به تنش و به‌دست آمدن همبستگی بالا بین این شاخص‌ها، گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها بر اساس شاخص‌های تحمل به تنش از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی انجام شد. تجزیه به مؤلفه‌های اصلی روی شاخص‌ها نشان داد که حدود ۹۹/۲۸ درصد از تغییرات کل توسط دو مؤلفه اصلی اول توجیه می‌شود (جدول ۵). مؤلفه اصلی اول ۶۴/۸۱ درصد از تغییرات را توجیه نمود. این مؤلفه با عملکرد در هر دو شرایط تنش و بدون تنش هم‌چنین شاخص‌های STI، MP، GMP، HM و YI همبستگی مثبت و بالا و با شاخص SSI همبستگی منفی نشان داد (جدول ۶)، لذا مؤلفه اول به‌عنوان مؤلفه پتانسیل عملکرد و تحمل به تنش شوری معرفی گردید. به عبارت دیگر این مؤلفه قادر به شناسایی ژنوتیپ‌های با پتانسیل عملکرد بالا می‌باشد و لذا، مقادیر بیشتر مؤلفه اول مطلوب‌تر است. مؤلفه دوم ۳۴/۴۷ درصد از تغییرات را توجیه کرد (جدول ۵) و در این مؤلفه شاخص‌های TOL و SSI نقش بیشتری داشتند (دارای ضرایب مثبت و بالایی بودند). بنابراین مؤلفه مذکور را می‌توان مؤلفه حساسیت به تنش نامید.

با توجه به زوایای خطوط شاخص‌ها در نمایش گرافیکی بای پلات (شکل ۳)، ملاحظه می‌شود که شاخص‌های STI و MP با عملکرد دانه در هر دو شرایط (نرمال و تنش)، همبستگی مثبت دارند. با توجه به رابطه مؤلفه‌ها و شاخص‌های مورد بررسی، ژنوتیپ‌هایی که در گوشه سمت راست بای پلات قرار گرفته و از لحاظ مؤلفه اول مقادیر بیشتری به خود اختصاص

جدول ۵. مؤلفه‌های اصلی، مقادیر ویژه، میزان واریانس توجیه‌شده توسط آنها برای شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش

مؤلفه	مقدار ویژه	واریانس توجیه شده (%)	واریانس جمعی
۱	۶/۴۸۱	۶۴/۸۱۱	۶۴/۸۱۱
۲	۳/۴۴۷	۳۴/۴۷۳	۹۹/۲۸۴


جدول ۶. بردارهای ویژه مؤلفه‌های اصلی برای شاخص‌های مورد مطالعه روی ژنوتیپ‌ها

شاخص	Y_p	Y_s	TOL	SSI	STI	MP	GMP	HM	YI	YSI
مؤلفه اول	۰/۷۵۵	۰/۹۲۴	۰/۰۸۷	-۰/۲۸۴	۰/۹۹۳	۰/۹۶۷	۰/۹۷۹	۰/۹۶۳	۰/۹۳۱	۰/۲۶۷
مؤلفه دوم	۰/۶۵۲	-۰/۳۷۹	۰/۹۹۰	۰/۹۵۳	۰/۰۳۳	۰/۲۵۳	۰-/۱۹۱	۰-/۲۶۲	۰-/۳۵۶	-۰/۹۵۷


Y_p = عملکرد در شرایط بدون تنش، Y_s = عملکرد در شرایط تنش، SSI = شاخص حساسیت به تنش، TOL = شاخص تحمل، MP = میانگین عملکرد، GMP = میانگین هندسی بهره‌وری، STI = شاخص تحمل به تنش، HM = میانگین همساز یا هارمونیک، YI = شاخص عملکرد و YSI = شاخص پایداری عملکرد

عملکرد زیادی از آن داشت. لذا با توجه به یافته‌های فوق و این که شاخص‌های تحمل مورد استفاده در این آزمایش هم حساسیت لاین SA13 را به تنش شوری تأیید کرده‌اند، استفاده از آن در شرایط با تنش شوری، خشکی و یا تنش‌های توأم توصیه نمی‌شود.

همان‌گونه که از شکل ۵ برمی‌آید، عملکرد رقم خزر نیز در شوری ۷ دسی‌زیمنس بر متر به صفر می‌رسد درحالی‌که عملکرد ژنوتیپ‌های سپیدرود (شکل ۶) و ۸۳۱ (شکل ۷) در شوری ۸ دسی‌زیمنس بر متر به صفر می‌رسد. رقم خزر علاوه بر شوری، به خشکی نیز حساس است درحالی‌که ژنوتیپ‌های سپیدرود و ۸۳۱ متحمل به خشکی هستند. بررسی داده‌های عملکرد رقم دیلم در شوری‌های مختلف (شکل ۸) نشان داد که اگرچه حداکثر شوری قابل تحمل در این گیاه بالا است ولی عملکرد آن در شرایط بهینه پایین می‌باشد. بررسی توابع برآزش یافته روی داده‌های عملکرد ژنوتیپ بومی سنگ‌جو در شوری‌های مختلف نشان داد که عملکرد این ژنوتیپ در شوری ۱۱/۵ دسی‌زیمنس بر متر به صفر می‌رسد که بیشتر از حداکثر شوری اعمال شده در این آزمایش است (شکل ۹) که بیانگر توان بالای تحمل شوری در این ژنوتیپ است. با این حال، در کنار شیب کند کاهش عملکرد این ژنوتیپ، عملکرد آن در شرایط بدون تنش تفاوت زیادی با رقم دیلم ندارد. در این



شکل ۴. عملکرد لاین SA13 در شوری‌های مختلف




شکل ۵. عملکرد رقم خزر در شوری‌های مختلف

همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته شد، لاین SA13 به خشکی نیز حساس است. بنابراین، با توجه به حساسیت آن به شوری و در صورت بروز هر دو تنش به‌صورت توأم می‌توان انتظار کاهش


آزمایش عملکرد لاین T5 در شوری ۸ دسی‌زیمنس بر متر به صفر نزدیک شد درحالی‌که عملکرد آن در شرایط بهینه بیش از سایر ژنوتیپ‌ها بود (شکل ۱۰). لاین T5 هم که مشابه ژنوتیپ‌های سپیدرود و ۸۳۱ متحمل به خشکی ارزیابی شده بود، بر پایه شاخص‌های مقاومت مورد استفاده در این آزمایش نیز به عنوان ژنوتیپ مقاوم به شوری در نظر گرفته شد. در کل، ژنوتیپ‌های SA13 و خزر با شیب افت عملکرد شدید، حساس‌ترین ژنوتیپ‌ها نسبت به شوری بودند درحالی‌که رقم بومی سنگ‌جو با کمترین شیب افت عملکرد و بدون در نظر گرفتن عملکرد در شرایط بدون تنش، مقاوم‌ترین ژنوتیپ نسبت به شوری در نظر گرفته شد. به بیان دیگر، اگرچه بر پایه عملکرد دانه در دو محیط تنش و بدون تنش، لاین T5 برتری محسوسی نسبت به سنگ‌جو دارد، ولی سنگ‌جو می‌تواند در مقایسه با T5 شوری‌های بالاتری را تحمل نماید.

نتیجه‌گیری


از آنجا که تأمین آب شالیزارهای استان گیلان وابسته به آب رودخانه سفیدرود است و در دهه گذشته دبی این رودخانه در مقایسه با دوره بین سال‌های ۸۰ - ۱۳۵۰ به نصف کاهش یافته و هدایت الکتریکی آن هم دو برابر شده است و روند مشابهی مرکزی هم مشاهده می‌شود (۱) می‌توان انتظار داشت که در آینده، تولید و عملکرد برنج که گیاهی حساس به شوری است، به شدت کاهش یابد. لذا یافتن ژنوتیپ‌های متحمل به شوری و خشکی می‌تواند راه‌حل مناسبی برای مقابله با مشکلات پیش‌رو باشد و در این راستا یافتن شاخص‌های مناسب برای تشخیص ژنوتیپ‌های متحمل از حساس اهمیت کلیدی دارد. در کل، یافته‌های این آزمایش نشان داد که شاخص‌های STI و MP به واسطه دارا بودن همبستگی مثبت و معنی‌دار با عملکرد دانه در هر دو شرایط تنش و بدون تنش، احتمالاً مناسب‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی تحمل به تنش در ژنوتیپ‌های برنج هستند. در میان ژنوتیپ‌های مورد بررسی، لاین T5 دارای بیشترین مقدار عددی شاخص‌های STI، MP، GMP، HM و




شکل ۶. عملکرد رقم سپیدرود در شوری‌های مختلف




شکل ۷. عملکرد لاین ۸۳۱ در شوری‌های مختلف



شکل ۸. عملکرد هیبرید دیلم در شوری‌های مختلف



شکل ۱۰. عملکرد لاین T5 در شوری‌های مختلف



شکل ۹. عملکرد رقم سنگ‌جو در شوری‌های مختلف

آبیاری افزایش می‌یابد، از کاهش زیاد عملکرد جلوگیری کرد. با این حال نتیجه‌گیری و توصیه قطعی و کاربردی نیازمند آزمایش‌های بیشتری است.

YI بود و رقم خزر از نظر همه این شاخص‌ها بیشترین حساسیت را نشان داد. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که با جایگزینی بذر رقم‌های متداول با ژنوتیپ‌های متحمل معرفی شده در این آزمایش، در سال‌های کم بارانی که شوری آب

منابع مورد استفاده

- Ahmadpour, H. 2012. Mapping of groundwater salinity in Guilan province and using a GIS based model to forecast future. MSc. Thesis. Faculty of Agricultural Sciences. University of Guilan. Iran. (In Farsi).
- Ahmadi, A., A. Sio-Se Mardeh. 2003. Relationship between drought tolerance indices and yield in bread wheat cultivars for the different climate of Iran in stress and non-stress condition. *Iranian Journal of Agriculture Science* 34 (3): 667-679. (In Farsi).
- Akbar, M., I. E. Gunawardena and F. N. Ponnampereuma. 1986. Breeding for soil stresses. In: *Progress in rainfed lowland rice*. International Rice Research Institute. Manila, Philippines. pp. 263-272.
- Asch, F., M. Dingkuhn and K. Dorffling. 2000. Salinity increases CO₂ assimilation but reduces growth in field-grown irrigated rice. *Plant and Soil* 218: 1-10.
- Belhassen, E. 1997. Drought Tolerance in Higher Plants: Genetical, Physiological and Molecular Biological Analysis. Springer, Netherlands.
- Bousslama, M. and W. T. Schapaugh. 1984. Stress tolerance in soybean. Part 1: evaluation of three screening techniques for heat and drought tolerance. *Crop Science* 24: 933-937.
- Castillo, E. G., T. O. Toung Phuc, M. A. Abdelbaghi and I. Kazuyuki. 2007. Response to salinity in rice: comparative effects of osmotic and Ionic stress. *Plant Production Science* 10 (2): 159-170.
- Fernandez, G. C. 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In: *Proceedings of the International Symposium on Adaptation of Vegetables and other Food Crop to Temperature and Water Stress*. Taiwan. pp. 257-270.
- Fernandez, R. J. and J. F. Reynolds. 2000. Potential growth and drought tolerance of eight desert grasses. *Oecologia* 123: 90-98.
- Fischer, R. A. and R. Maurer. 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield response. *Australian Journal of Agricultural Research* 29: 897-912.
- Gabriel, K. R. 1992. The biplot graphical display of matrices with applications to principal component analysis. *Biometrika* 58: 453-467.
- Gavuzzi, P., F. Rizza, M. Palumbo, R. G. Campalino, G. L. Ricciardi and B. Borghi. 1997. Evaluation of field and laboratory predictors of drought and heat tolerance in winter cereals. *Canadian Journal of Plant Science* 77: 523-531.
- Ghodsi, M. 2010. Rice (*Oryza sativa* L.) genotypes tolerance to water deficit. Annual Research Report on Research Projects. National Rice Research Institute. Rasht, Iran
- Ghafari, M. 2007. Evaluation and selection of inbred lines of sunflower under normal and drought. *Seed and Plant Production Journal* 23 (4): 633-649.

15. Jabbari, H., G. A. Akbari, J. Daneshian, I. Alahdadi and N. Shahbazian. 2008. Utilization ability of drought resistance indices in sunflower (*Heliantus annus* L.) hybrids. *Electronic Journal of Crop Production* 1 (4): 1-17.
16. Kavousi, M. 1996. Determination of best model for estimation of rice yield under different salinity level in Spidroud, Hasansaraei and Khazar cultivars. MSc. Thesis. College of Agriculture. University of Tabriz. Iran. (In Farsi).
17. Kazemi Arbat, H. A. 1995. Cereal Crops. Second Edition. Tehran University Press. 253 pp. (In Farsi).
18. Lafitte, H. R., A. Ismail and J. Bennett. 2004. Abiotic stress tolerance in rice for Asia: progress and the future. In: Proceeding of 4th International Crop Science Congress, Brisbane, Australia. pp.1137.
19. Mirdar Mansuri, Sh., N. Babaeian Jelodar and N. Bagheri. 2012. Effect of NaCl stress on Iranian rice genotypes in reproductive stage on the base of tolerance indexes and screen by Biplot Method. *Journal of Plant Production* 19 (1): 67-84.
20. Nematollahi, Z., Gh. A. Saeedi. 2011. Evaluation of drought tolerance of some flax (*Linum usitatissimum* L.) genotypes. *Journal of Water Research in Agriculture* 25 (1): 57-65.
21. Parida, A. K. and A. B. Das. 2004. Salt tolerance and salinity effects on plants: a review. *Ecotoxicology and Environmental Safety* 60 (3): 324-349.
22. Pervaiz, Z., M. Afzal, Y. Xiao and L. Ancheng. 2003. Mechanism of salt tolerance in selected wheat cultivars. *International Journal of Agriculture and Biology* 5: 141-144.
23. Ramirez-Vallejo, P. and J. D. Kelly 1998. Traits related to drought resistance in common bean. *Euphytica* 99: 127-136.
24. Ranjbar, G. H. and M. J. Rousta. 2011. Effective Stability Index for Selecting Wheat Genotypes under Saline Conditions. *Water and Soil Science* 24 (3): 283-290. (In Farsi).
25. Rezaei, M., M. K. Motamed, A. Yousefi and E. Amiri. 2010. Evaluation of different irrigation management on rice yield. *Journal of Water and Soil* 24 (3): 565-573. (In Farsi).
26. Rosielle, A. A. and J. Hamblin. 1981. Theoretical aspect of selection for yield in stress and non- stress environment. *Crop Science* 21: 943-946.
27. Sabouri, H., A. M. Rezaei and A. Moumeni 2008. Evaluation of salt tolerance in Iranian landrace and improved rice cultivars. *Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources* 12(45): 47-63. (In Farsi).
28. Sadeghzadeh-Ahari, D. 2006. Evaluation for tolerance to drought stress in dry land-promising durum wheat genotype. *Crop Science* 8 (1): 30-45.
29. Salehi, M. and S. A. Mosavat. 2009. Selection criteria of wheat genotypes under salt stress in Golestan province. *Electronic Journal of Crop Production* 1 (4): 19-33.
30. Shamseddin, M. and H. Farahbakhsh. 2008. Investigation of Quantitative and Qualitative Parameters of Canola under Salty Conditions for Determining the Best Tolerance index. *Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources* 12 (43): 65-78.
31. Shannon, M. C. 1997. Adaptation of plant to salinity. *Advances in Agronomy* 60: 87-120.
32. Sio-Se Mardeh, A., A. Ahmadi, K. Poostini and V. Mohammadi. 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions. *Field Crops Research* 98: 222-229.
33. Soltani Huwyzeh, M., S. A. M. Mirmohammady Maibody, A. Arzani. Evaluation of salt tolerance in commercial and promising sugarcane cultivars at the beginning of growth using different stress tolerance indices. *Seed and Plant* 24 (1): 145-159.
34. Statistics and Information Technology Office of Ministry of Agriculture. 2010. Report on agriculture statistics (Vol. 1: crops in crop season of 2008-2009). Ministry of Agriculture. Department of Planning and Economic. Tehran, Iran. (In Farsi).
35. Zabet, M., A. H. Hosein Zade, A. Ahmadi and F. Khialparast. 2003. Effect of water stress on different traits and determination of the best water stress index in mung bean (*Vigna radiata*). *Iranian Journal of Agriculture Science* 34 (4): 889-898. (In Farsi).
36. Zare, M., H. Zeinali Khaneghah and J. Daneshian. 2004. Evaluation of tolerance of some soybean genotypes to drought stress. *Iranian Journal of Agriculture Science* 35(4): 859-867. (In Farsi).