

بررسی آثار سرباره کنورتور بر خصوصیات شیمیایی خاک‌های اسیدی

علی محمدی ترکشوند، محمود کلباسی و حسین شریعتمداری^۱

چکیده

سرباره کنورتور LD یک فرآورده جنبی صنایع آهن و فولاد است که به مقدار زیاد در اصفهان تولید می‌شود. سرباره به کاررفته به ترتیب حاوی ۵۲/۸ و ۲/۲ درصد CaO و MgO است. برای تعیین اثر سرباره LD بر خصوصیات شیمیایی خاک، یک آزمایش انکوباسیون با استفاده از سه خاک اسیدی از گیلان انجام گرفت. نمونه‌های خاک از عمق ۰-۳۰ سانتی‌متری سطح مزارع برنج و توتون و باغ چای گرفته شدند. تیمارها شامل ۰، ۰/۵، ۱، ۲، ۴، ۸ و ۱۶ درصد سرباره کنورتور در هر کیلوگرم خاک بود که به طور کامل با ۰/۵ کیلوگرم از هر خاک مخلوط شد. رطوبت خاک‌ها در ظرفیت مزرعه‌ای برای مدت دو ماه ثابت نگه‌داشته شد، و در زمان‌های ۱، ۱۰، ۳۰ و ۶۰ روز پس از شروع آزمایش از نمونه‌ها، نمونه‌های فرعی برای بررسی تغییرات pH ، EC ، غلظت Fe ، Mn ، P و K قابل استخراج با $AB-DTPA$ گرفته شد.

نتایج نشان داد pH خاک با افزایش نسبت سرباره به کاررفته افزایش پیدا کرد. سرباره مقدار P و Mn قابل استخراج با $AB-DTPA$ را متناسب با مقدار به کار رفته افزایش داد. ولی تأثیر سرباره بر مقدار Fe بسته به pH اولیه خاک متفاوت بود، به طوری که با افزایش pH خاک به محدوده ۷/۴-۸/۵ از غلظت آهن کاسته شد و بعد از آن با افزایش pH خاک مقدار آهن دوباره افزایش یافت. سرباره، پتاسیم قابل استخراج با $AB-DTPA$ را به ویژه در خاک‌های شدیداً اسیدی کاهش داد. pH خاک در طول زمان کاهش یافت ولی قابل ملاحظه نبود. مقدار آهن قابل جذب غالباً در طول زمان کاهش یافت. اثر زمان انکوباسیون بر فسفر و منگنز متفاوت بود. اثر زمان بر EC قابل ملاحظه نبود. در کل، خصوصیات شیمیایی خاک‌ها بیشتر تحت تأثیر تیمارها بود تا زمان. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می‌رسد سرباره کنورتور برای اصلاح خاک‌های اسیدی مناسب باشد. پیشنهاد می‌شود که اثر سرباره کنورتور LD بر خصوصیات شیمیایی خاک‌های اسیدی طی آزمایش‌های مزرعه‌ای بررسی شود.

واژه‌های کلیدی: خاک‌های اسیدی، اصلاح کننده، سرباره، کنورتور LD

مقدمه

می‌رسد این تیمار برای تولید مؤثر در کشاورزی مناطق مرطوب ضروری بوده و منجر به بهبود عملکرد محصولات می‌شود (۶). استفاده از مواد آهکی در خاک‌های اسیدی نسبتاً گران است.

آهک دهی برای خنثی کردن حالت اسیدی خاک یکی از روش‌های معمول در مدیریت خاک‌های اسیدی است. به نظر

۱. به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، استاد و استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

از مواد گوناگونی از جمله فرآورده‌های جنبی صنایع در اصلاح خاک‌های اسیدی استفاده شده است (۱۲، ۱۶، ۲۰ و ۲۲) که از مهم‌ترین آنها سرباره فولادسازی است. برای هر تن تولید فولاد، در حدود ۱۵۰ کیلوگرم سرباره تولید می‌شود (۱۸). هر ساله ۲۵۰ میلیون کیلوگرم سرباره در اصفهان تولید می‌شود که حاوی مواد و ترکیبات با ارزشی است (۱). این مواد در حال حاضر بدون استفاده مانده که علاوه بر محدودیت‌های فیزیکی، احتمالاً خطرات بالقوه زیست محیطی را نیز در بر دارد.

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در ایران تاکنون پژوهشی در زمینه استفاده از سرباره (Slag) به عنوان اصلاح‌کننده در خاک‌های اسیدی به عمل نیامده ولی طی سال‌های اخیر در دنیا استفاده از سرباره به عنوان یک ماده آهکی به‌ساز در خاک‌های اسیدی اهمیت زیادی پیدا کرده است. تنها در جمهوری فدرال آلمان، ۲۰ درصد کل سرباره‌های فولاد سازی به عنوان کود یا اصلاح‌کننده خاک در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد (۲۴). چون در فرآیند تولید فولاد از آهک استفاده می‌شود، بنابراین سرباره دارای pH قلیایی است (۹). غلظت زیاد کلسیم و منیزیم، سرباره LD (کلمات L و D دو حروف اول نام دو دهکده در اتریش به نام لینتس و دوناویتس است که آزمایش‌های اولیه فولادسازی به روش کنورتور اکسیژن در آنجا صورت گرفته است)، را به یک ماده با خاصیت آهکی تبدیل کرده است (۱۸). بنابراین استفاده از سرباره به عنوان ماده به‌ساز و کود در خاک‌های اسیدی عموماً نتایج رضایت بخشی به همراه دارد. بخش زیادی از سرباره تشکیل شده به روش بسمر بازی را با سرباره فولادسازی به روش LDAC مخلوط کرده و آهک توماس تهیه می‌کنند که در کشاورزی کاربرد دارد. در سوئد (۹) مصرف سرباره در مقایسه با سنگ آهک سبب افزایش بیشتر عملکرد محصولات شده است. اگوتوینو و همکاران (۱۲) در تحقیقی که در خاک‌های اسیدی جنوب نیجریه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که استفاده از سرباره سبب افزایش pH و فسفر قابل جذب و کاهش آلومینیوم می‌شود. هم‌چنین استفاده از سرباره باعث افزایش جذب کلسیم و پتاسیم و مقدار ماده

خشک گیاهی شده و در مجموع موجب بهبود جذب عناصر غذایی به وسیله گیاهان می‌شود. در تحقیقی استفاده از سرباره LD در جنگل‌ها به ویژه جنگل‌های اکالیپتوس سبب بهبود قابل ملاحظه خصوصیات فیزیکی - شیمیایی خاک شده است. هم‌چنین سرباره LD رشد درختان کاج و تبریزی را نیز افزایش داده است (۱۸). کریستن و همکاران (۹) اثر سرباره و سنگ آهک را در خاک‌های آلی اسیدی نروژ بررسی کردند. آنها نتیجه گرفتند که قدرت خنثی‌کنندگی هر دو ماده در خنثی کردن اسیدیته خاک یکسان است. سرباره علاوه بر ویژگی قلیایی، دارای تعدادی از عناصر مورد نیاز برای رشد گیاهان است (جدول ۱). هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی امکان استفاده از سرباره کنورتور به عنوان یک ماده آهکی در اصلاح خصوصیات شیمیایی خاک‌های اسیدی شمال کشور است.

مواد و روش‌ها

نتایج تجزیه شیمیایی سرباره کنورتور (LD) مورد استفاده که توسط آزمایشگاه ذوب آهن اصفهان انجام شده بود (جدول ۱) نشان داد که سرباره حاوی ۵۲/۸ درصد اکسید کلسیم و ۲/۲ درصد اکسید منیزیم است. هم‌چنین سرباره دارای مقادیر زیادی آهن، فسفر، منگنز و سیلیسیم است که می‌تواند باعث افزایش محصولات زراعی شود. محل نمونه‌های خاک در خاک‌های اسیدی با توجه به شدت اسیدیته (pH) و محصولات مهمی که در این خاک‌ها کشت می‌شوند انتخاب شدند. با همکاری مؤسسه تحقیقات برنج و بخش تحقیقات توتون از عمق ۳۰-۰ سانتی‌متری خاک یک باغ چای در لاهیجان (خاک شماره ۱)، یک مزرعه توتون (خاک شماره ۲) و یک مزرعه برنج (خاک شماره ۳) در رشت نمونه‌برداری شد. pH خاک باغ چای، مزرعه توتون و مزرعه برنج به ترتیب ۴/۰، ۵/۵ و ۶/۷ بود. نمونه‌های خاک پس از انتقال به آزمایشگاه و خشک شدن در مجاورت هوا با چکش چوبی کوبیده و از الک دو میلی‌متری استیل عبور داده شدند. حدود یک کیلوگرم از هر خاک برای انجام تجزیه‌های فیزیکی و شیمیایی و بقیه برای آزمایش‌های آنکوباسیون مورد استفاده قرار گرفت. برخی

جدول ۱. نتایج تجزیه شیمیایی سرباره کنورتور LD

نوع آنالیز	مقدار (%)
TFe	۱۶/۸۳
FeO	۷/۸۷
MnO	۴/۴۶
SiO _۲	۸/۹۲
CaO	۵۲/۸۵
MgO	۲/۲۲
V _۲ O _۵	۲/۳۱
P _۲ O _۵	۴/۷۶
Al _۲ O _۳	۰/۷۸
S	۰/۱۸
ZnO	۰/۰۵۷
Na _۲ O	۰/۰۷۵
K _۲ O	۰/۰۳۲

غلظت فسفر به روش فسفومولیدات، پتاسیم به روش شعله‌سنجی و آهن، منگنز و روی به روش جذب اتمی تعیین شدند (۳). داده‌های به دست آمده به وسیله نرم‌افزارهای SAS و MSTATC مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

نتایج و بحث

pH

در جدول ۳ تأثیر سطوح مختلف سرباره و زمان نگهداری بر pH خاک‌های شماره ۱، ۲ و ۳ نشان داده شده است. آنالیز واریانس نشان داد که اثر تیمارها و زمان انکوباسیون بر pH خاک‌های اسیدی در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است (جدول ۴). با افزودن سرباره از ۰/۵ تا ۱۶ درصد، pH هر سه خاک به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. پینتو و همکاران (۱۵) در مراتع ایالت باسک در شمال اسپانیا با استفاده از سرباره LD حاوی ۲۹ درصد کلسیم و ۵ درصد منیزیم به میزان ۷/۵ تن در هکتار نتیجه گرفتند که pH خاک در منطقه دریو (Derio) از ۵/۳ به ۶/۴ و در منطقه آبادیانو (Abadiano) از ۵/۷ به ۶/۵

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌های مورد استفاده در جدول ۲ دیده می‌شود. در این پژوهش سرباره در سطوح ۰، ۵/۵، ۱، ۲، ۴، ۸، و ۱۶ درصد در ۳ تکرار در قالب یک طرح کامل تصادفی با ۵۰۰ گرم خاک مخلوط شد. در این مقاله به این سطوح به ترتیب S0، S0.5، S1، S2، S4، S8 و S16 اشاره می‌شود. نمونه‌های تیمارشده به قوطی‌های پلاستیکی با گنجایش ۷۰۰ گرم منتقل و رطوبت آنها در حد ظرفیت مزرعه‌ای نگهداری شد. سپس درب قوطی‌ها بسته و روی درب هر قوطی ۳ سوراخ به قطر تقریبی یک میلی‌متر برای تبادل هوا ایجاد شد. در طول مدت آزمایش (دو ماه) رطوبت نمونه‌های خاک با توزین مرتب قوطی‌ها ثابت نگه داشته شد. در فاصله‌های زمانی ۲۴ ساعت، ۱۰ روز، یک ماه و دو ماه پس از شروع آزمایش، نمونه‌های فرعی برداشت شدند. در این نمونه‌ها پس از هوا خشک شدن، pH و قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره ۲/۵ : ۱ خاک به آب و غلظت فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز و روی به وسیله AB-DTPA عصاره‌گیری (۱۴ و ۲۱) و سپس

جدول ۲. برخی خصوصیات فیزیکی - شیمیایی خاک‌های مورد مطالعه

شماره ۳	شماره ۲	شماره ۱	خاک
لوم رسی	لوم شنی	لوم	بافت
Aquic Hapludalfs	Typic Homuaquepts	Typic Hapludalfs	رده بندی
۶/۷	۵/۵	۴/۱	pH گل اشباع
۱/۱	۱/۳	۰/۷	ECe (dS/m)
۷۲/۸	۳۱/۶	۶۱/۳	SP
۰/۷۹	۱/۲۴	۲/۷۵	ماده آلی (%)
۰/۰۳	۰/۰۷	۰/۲۷	نیترژن کل (%)
۲/۱	۱۲/۶	۱۰/۲	فسفر
۱۲۷	۱۱۵	۱۹۵	پتاسیم
۴۶۱	۱۰۱	۳۰۷	آهن
۱۴/۴	۱۴/۴	۲۷/۸	منگنز

↑
mg/kg
↓

جدول ۳. اثر تیمارهای سرباره و زمان نگهداری بر pH خاک

S16	S8	S4	S2	S1	S0.5	S0	تیمار	خاک
							زمان	
۱۰/۵۰ ^a	۷/۷۳ ^c	۷/۳۰ ^f	۶/۲۰ ^g	۵/۷۶ ^{hi}	۵/۰۶ ^k	۴/۴۳ ^{*i}	یک روز	شماره ۱
۱۰/۰۰ ^b	۸/۲۳ ^d	۷/۲۰ ^f	۶/۱۸ ^g	۵/۷۶ ^{hi}	۵/۰۳ ^k	۴/۴۸ ⁱ	ده روز	
۹/۰۸ ^c	۸/۱۳ ^d	۷/۰۶ ^f	۶/۲۸ ^g	۵/۴۳ ^{ij}	۵/۱۶ ^{jk}	۴/۲۸ ⁱ	یک ماه	
۹/۳۶ ^c	۸/۰۸ ^d	۷/۲۰ ^f	۶/۲۰ ^g	۵/۲۶ ^{jk}	۵/۰۶ ^{jk}	۴/۲۰ ⁱ	دو ماه	
۹/۳۷ ^a	۸/۰۴ ^b	۷/۱۹ ^c	۶/۱۷ ^d	۵/۵۵ ^e	۵/۱۱ ^f	۴/۳۵ ^g	میانگین	شماره ۲
۱۰/۷۰ ^b	۱۰/۵۳ ^{bc}	۸/۳۶ ^{de}	۷/۶۳ ^g	۷/۷۰ ^g	۶/۳۰ ^{hi}	۶/۰۳ ⁱ	یک روز	
۱۱/۵۵ ^a	۱۰/۴۰ ^{bc}	۷/۳۰ ^d	۷/۸۳ ^{fg}	۷/۱۶ ^h	۶/۳۰ ^{hi}	۵/۸۶ ^{ij}	ده روز	
۱۱/۵۰ ^a	۱۰/۳۳ ^{bc}	۸/۵۰ ^d	۷/۷۶ ^g	۷/۱۳ ^h	۶/۹۰ ^h	۵/۹۳ ^{ij}	یک ماه	
۱۱/۳۳ ^a	۱۰/۱۶ ^c	۸/۲۶ ^{def}	۷/۹۳ ^{efg}	۷/۰۳ ^h	۶/۱۰ ^h	۵/۹۱ ^{ij}	دو ماه	شماره ۳
۱۱/۵۲ ^a	۱۰/۳۵ ^b	۸/۴۰ ^c	۷/۷۹ ^d	۷/۲۵ ^e	۶/۶۵ ^f	۵/۹۳ ^g	میانگین	
۱۱/۱۳ ^a	۹/۰۳ ^c	۹/۰۳ ^c	۸/۵۳ ^{cd}	۷/۶۳ ^{gh}	۷/۵۰ ^h	۷/۲۸ ^{hi}	یک روز	
۱۰/۴۰ ^b	۹/۰۳ ^c	۷/۸۱ ^{efgh}	۸/۳۰ ^{de}	۷/۸۰ ^{efgh}	۷/۵۸ ^{gh}	۷/۳۶ ^{hi}	ده روز	
۱۰/۹۰ ^{ab}	۸/۹۰ ^c	۸/۱۳ ^{defg}	۸/۲۵ ^{def}	۷/۷۰ ^{fgh}	۷/۳۴ ^{hi}	۷/۴۸ ^h	یک ماه	شماره ۳
۱۰/۸۸ ^{ab}	۸/۵۳ ^{cd}	۸/۶۶ ^{cd}	۷/۸۶ ^{efgh}	۶/۸۰ ⁱ	۷/۴۳ ^h	۷/۴۸ ^h	دو ماه	
۱۰/۸۲ ^a	۸/۸۷ ^b	۸/۴۱ ^c	۸/۲۳ ^c	۷/۴۸ ^d	۷/۴۶ ^d	۷/۴۰ ^d	میانگین	

* : برای هر خاک، داده‌هایی که در یک حرف مشترک می‌باشند طبق آزمون دانکن در سطح یک درصد معنی‌دار نیست.

به حساب می‌آید. دیگران نیز نتایج مشابهی را گزارش کرده‌اند (۷، ۸، ۹، ۱۲ و ۱۷).

در خاک شماره ۱ زمان نگهداری بر pH خاک بخصوص در سطوح کمتر از ۱۶ درصد تأثیر زیادی نداشته است. در خاک

افزایش یافت. هم‌چنین اويا و همکاران (۱۳) نتیجه گرفتند که استفاده از ۵/۳ گرم سرباره کوره بلند در هر گلدان، pH خاک را ۴/۷ به ۵/۸ افزایش داد. بنابراین تصحیح pH خاک‌های اسیدی به وسیله سرباره یکی از مزیت‌های عمده این فرآورده جانبی

جدول ۴. تجزیه واریانس مربوط به اثر تیمارها و زمان نگهداری بر pH و مقدار فسفر و آهن (mg/kg) قابل استخراج با AB-DTPA در خاک‌ها

میانگین مربعات									
خاک شماره ۳			خاک شماره ۲			خاک شماره ۱			منابع تغییر
فسفر	آهن	pH	فسفر	آهن	pH	فسفر	آهن	pH	
۱۷۶۵**	۵۸۹۱۱**	۱۷/۷**	۱۵۰۳**	۴۴۳۱۴**	۴۸/۸**	۵۸۰**	۳۵۹۵۷**	۴۱/۶**	تیمار
۱۰۹**	۱۲۰۶**	۰/۴۷**	۳۳/۸**	۷۲۵۴**	۰/۰۵ ^{ns}	۸/۶ ^{ns}	۵۱۶۱**	۰/۳۳**	زمان
۸۵**	۲۲۵۵**	۰/۲۹**	۹۱/۶**	۱۵۹۸**	۰/۱۶**	۶۷/۷**	۴۹۹۹**	۰/۲۲**	برهمکنش تیمار× زمان
۴/۷	۱۱۳	۰/۰۶	۹/۱	۸۰/۶	۰/۰۴۰	۵/۳	۴۸۰	۰/۰۲۲	خطا

** : در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار است.

ns : معنی دار نیست.

شماره ۲ نیز سرباره سبب افزایش معنی‌دار pH خاک در همه تیمارها و در بدو شروع کار شده است. در تیمار ۵/۰ درصد سرباره بین زمان‌های یک و ده روز با زمان‌های یک و دو ماه اختلاف معنی‌دار وجود دارد. در تیمار S1 کاهش معنی‌دار pH خاک در زمان‌های یک و دو ماه نسبت به یک روز مشاهده می‌شود. با این وجود زمان، بر pH خاک در سایر تیمارها تأثیری ندارد. در خاک شماره ۳ نیز همانند دو خاک دیگر pH خاک با مقدار سرباره به کار رفته افزایش یافته است (جدول ۳)، ولی در سطوح ۵/۰ و ۱ درصد سرباره این افزایش بسیار جزئی و با شاهد اختلاف معنی‌دار ندارد که احتمالاً با توجه به درصد بالای رس در این خاک (بافت لوم رسی) به خاطر قدرت بافری این خاک است. در تیمارهای S2 و S4 در طول زمان از میزان pH خاک کاسته شده است. رودریگز و همکاران (۱۸) در یک آزمایش سه ساله با استفاده از سرباره LD نشان دادند که کاهش pH در طول زمان احتمالاً به خاطر هیدرولیز Fe(III) رس‌های خاک بوده است. در تیمارهای S8 و S16 زمان تأثیر معنی‌داری بر pH خاک نداشته است. به نظر می‌رسد در این تیمارها مواد قلیایی اضافه شده بیشتر از قدرت خشی‌کنندگی خاک در طول زمان آزمایش بوده است. در مجموع می‌توان گفت که pH خاک بیشتر تحت تأثیر تیمارها بوده است. با توجه به تأثیر نامطلوب سطوح بالای سرباره یعنی S8 و S16 بر pH خاک، این مقادیر به هیچ وجه توصیه نمی‌شوند.

فسفر

اثر سرباره بر مقدار فسفر در جدول ۵ دیده می‌شود. تأثیر تیمارها و زمان و برهمکنش این دو بر فسفر قابل استخراج با AB-DTPA در سه خاک در سطح یک درصد معنی‌دار است (جدول ۴). با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت که یکی از پتانسیل‌های مهم سرباره در خاک‌های اسیدی، افزایش مقدار فسفر قابل جذب خاک می‌باشد که این امر، با توجه به مقدار زیاد فسفر در سرباره دور از انتظار نبوده است. در خاک شماره ۱ بین تیمارهای S0.5 و S1 با شاهد اختلاف معنی‌دار

وجود ندارد، اما تیمارهای S2، S4، S8 و S16 با شاهد و با یکدیگر اختلاف معنی‌دار دارند. افزایش فسفر قابل عصاره‌گیری در این تیمارها متناسب با مقدار سرباره به کار رفته است. هم‌چنین سرباره حاوی مقدار زیادی سیلیس است که می‌تواند فسفر تثبیت شده را از خاک آزاد کند (۱۹). کریستن و ارستاد (۹) ملاحظه نمودند که بیشترین غلظت فسفر قابل جذب در اثر استفاده از ۱۴/۴ تن در هکتار سرباره به دست آمد. سوبرامانیان و همکاران (۲۳) نیز در تحقیقی با استفاده از مواد آهکی سیلیکاتی (سرباره) دریافتند که کاربرد این مواد در سطحی معادل ۵۰۰ میلی گرم در کیلوگرم سیلیس باعث افزایش فسفر قابل استفاده در خاک شد. زمان بر مقدار فسفر قابل جذب در تیمارهای S0، S0.5، S1 و S2 تأثیر معنی‌دار نداشته است. فسفر قابل استخراج با AB-DTPA در تیمارهای S4 و S8 در طول زمان افزایش یافته است. احتمالاً افزایش فسفر قابل جذب در طول زمان در این تیمارها به علت تأثیر سرباره بر pH خاک‌ها و افزایش آن تا حد قلیایی ضعیف است (۲) که در این صورت با معدنی شدن فسفر آلی توسط میکروب‌ها، غلظت فسفر افزایش یافته است. کاهش مقدار فسفر قابل جذب در تیمار S16 در یک و دو ماه نسبت به یک و ده روز احتمالاً به دلیل رسوب فسفر به صورت ترکیبات نامحلول تری‌فسفات کلسیم می‌باشد.

در خاک شماره ۲ نیز سرباره، سبب افزایش معنی‌دار فسفر قابل استخراج با AB-DTPA در بدو شروع کار شده است. با شروع آزمایش متناسب با سرباره به کار رفته مقدار فسفر قابل جذب افزایش یافته است، ولی در طول زمان تغییرات غلظت فسفر قابل جذب در تیمارها متفاوت بوده است. این تغییرات به گونه‌ای است که در تیمارهای S1، S2 و S4 فسفر قابل جذب در طول زمان افزایش و در تیمارهای S8 و S16 کاهش یافته است. با توجه به افزایش pH خاک در تیمارهای S1، S2 و S4 به حد قلیایی ضعیف، همان‌طور که قبلاً گفته شد فعالیت میکروبی افزایش و با افزایش معدنی شدن فسفر آلی، متعاقب آن فسفر قابل جذب خاک در طول زمان افزایش یافته است. در تیمارهای S8 و S16، نخست در اثر حل شدن سرباره،

جدول ۵. اثر سرباره و زمان نگهداری بر فسفر قابل استخراج (mg/kg) با AB-DTPA

S16	S8	S4	S2	S1	S0.5	S0	تیمار		خاک
							زمان	یک روز	
۲۷/۹۰ ^b	۲۰/۰۴ ^{def}	۱۰/۸۹ ^{hijk}	۱۱/۴۳ ^{hijk}	۹/۳۸ ^{ijkl}	۹/۰۵ ^{ijkl}	۹/۰۷ ^{*ijkl}	یک روز	یک روز	شماره ۱
۲۸/۵۳ ^b	۲۲/۱۲ ^{cd}	۱۳/۲۸ ^{ghij}	۱۱/۳۸ ^{hijk}	۹/۷۱ ^{ijkl}	۹/۴۳ ^{ijkl}	۱۰/۵۴ ^{hijk}	ده روز	ده روز	
۱۶/۲۱ ^{efgh}	۲۵/۷۹ ^{bc}	۲۱/۱۸ ^{cde}	۱۵/۸۱ ^{efgh}	۸/۶۴ ^{ijkl}	۷/۹۹ ^{kl}	۱۲/۸۳ ^{hijk}	یک ماه	یک ماه	
۱۵/۸۰ ^{efgh}	۳۶/۲۱ ^a	۱۸/۷۶ ^{defg}	۱۴/۵۲ ^{efgh}	۸/۸۴ ^{ijkl}	۴/۶۵ ^l	۸/۱۳ ^{ijkl}	دو ماه	دو ماه	
۲۲/۱۰ ^b	۲۶/۰۴ ^a	۱۶/۰۳ ^c	۱۳/۲۸ ^d	۹/۱۴ ^e	۷/۵۳ ^e	۱۰/۱۴ ^e	میانگین	میانگین	شماره ۲
۴۰/۸۱ ^{abc}	۳۹/۴۶ ^{abcde}	۲۷/۲۲ ^{ghij}	۲۵/۸۴ ^{hi}	۱۵/۱۰ ^{jk}	۱۱/۳۷ ^k	۱۱/۳۷ ^k	یک روز	یک روز	
۳۹/۷۰ ^{abcde}	۴۰/۲۲ ^{abcd}	۴۱/۵۱ ^{ab}	۳۳/۹۰ ^{cdefg}	۱۴/۷۶ ^k	۱۱/۳۷ ^k	۱۱/۳۷ ^k	ده روز	ده روز	
۳۱/۴۷ ^{fgh}	۳۶/۹۷ ^{defgh}	۳۴/۹۷ ^{bcddefg}	۳۸/۳۱ ^{abcdef}	۲۳/۸۴ ⁱ	۱۳/۵۵ ^k	۱۱/۳۷ ^k	یک ماه	یک ماه	
۲۲/۲۹ ^{ij}	۳۶/۴۷ ^{efgh}	۴۱/۹۹ ^a	۳۴/۵۵ ^{abdefg}	۲۲/۰۲ ^{ij}	۱۳/۹۹ ^k	۱۱/۳۷ ^k	دو ماه	دو ماه	
۳۳/۵۷ ^a	۳۶/۲۸ ^a	۳۶/۲۴ ^a	۳۳/۱۵ ^a	۱۹/۰۳ ^b	۱۲/۶۱ ^c	۱۱/۳۷ ^c	میانگین	میانگین	شماره ۳
۳۵/۰۴ ^b	۱۳/۹۴ ^f	۸/۷۱ ^g	۳/۴۰ ^{ghij}	۳/۱۶ ^{hij}	۲/۰۳ ^{hij}	۱/۱۷ ^j	یک روز	یک روز	
۳۲/۷۵ ^{bc}	۳۳/۷۳ ^{de}	۱۴/۲۱ ^f	۶/۳۳ ^{ghij}	۴/۰۴ ^{ghij}	۲/۱۷ ^{hij}	۱/۳۱ ^j	ده روز	ده روز	
۲۸/۵۹ ^{cd}	۲۴/۱۰ ^{de}	۲۷/۹۰ ^{cd}	۷/۰۷ ^{ghi}	۷/۳۹ ^{gh}	۳/۲۱ ^{hij}	۱/۵۱ ^{ij}	یک ماه	یک ماه	
۲۷/۹۹ ^{cd}	۴۰/۳۸ ^a	۲۰/۸۵ ^e	۴/۲۹ ^{ghij}	۴/۴۸ ^{ghij}	۲/۳۴ ^{hij}	۱/۳۷ ^j	دو ماه	دو ماه	
۳۱/۰۹ ^a	۲۵/۵۴ ^b	۱۷/۹۲ ^c	۵/۲۷ ^d	۴/۷۷ ^{de}	۲/۴۴ ^{ef}	۱/۳۵ ^f	میانگین	میانگین	

* : برای هر خاک، داده‌هایی که در یک حرف مشترک می‌باشند طبق آزمون دانکن در سطح یک درصد معنی دار نمی‌باشند.

مقدار زیادی فسفر به خاک اضافه شده و غلظت فسفر قابل جذب خاک افزایش یافته است، ولی با توجه به افزایش بیش از حد pH خاک در این تیمارها (قلیایی شدید) به نظر می‌رسد فعالیت میکروبی کند شده و فسفر خاک به صورت فسفات‌های کم محلول‌تر رسوب کرده است.

در خاک شماره ۳ نیز سرباره سبب افزایش فسفر قابل جذب خاک شده است. استفاده از سرباره به ویژه در مقادیر ۴، ۸ و ۱۶ درصد سبب افزایش قابل ملاحظه فسفر قابل جذب خاک شده است. اثر سرباره کنورتور بر غلظت فسفر قابل استخراج با AB-DTPA در خاک را نباید تنها به خاطر وجود فسفر در ترکیب آن دانست، بلکه افزایش pH و آزاد شدن فسفر از فسفات آهن و آلومینیوم و همچنین جایگزینی سیلیس سرباره در سایت‌های تبادلی به جای فسفات سبب افزایش غلظت فسفر محلول می‌شود (۲۳). تغییرات فسفر قابل جذب در طول زمان با توجه به سطح مصرفی سرباره و pH خاک همانند دو خاک دیگر است.

به طور کلی غلظت فسفر قابل جذب تا حدود زیادی به pH خاک وابسته است و pH علاوه بر تأثیر بر فعالیت‌های میکروبی بر حلالیت ترکیبات مختلف فسفره تأثیر می‌گذارد و در pH های قلیایی، فسفر به صورت فسفات‌های کلسیم نامحلول رسوب می‌کند.

آهن

تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر تیمارها و زمان نگهداری بر آهن قابل استخراج با AB-DTPA در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است (جدول ۴). جدول ۶، تأثیر تیمارها و زمان نگهداری بر آهن قابل جذب را در این سه خاک نشان می‌دهد. مقدار آهن قابل با افزایش مقدار سرباره تا سطح ۴ درصد کاهش نشان می‌دهد و در تیمارهای S8 و S16، میزان آهن افزایش می‌یابد. علت کاهش غلظت آهن در تیمارهای S0.5، S1، S2 و S4 نسبت به شاهد، افزایش pH خاک و نزدیک شدن حلالیت آهن به محدوده کمترین حلالیت اکسیدهای آهن

III (pH محدوده ۷/۴-۸/۵) است. با افزایش pH به بالاتر از ۸/۵ در سطوح ۸ و ۱۶ درصد سرباره، غلظت گونه‌های آنیونی آهن III مانند FeOH^- در خاک غالب می‌شود و غلظت آهن مجدداً افزایش می‌یابد (۱۰). روند کاهشی آهن در طول زمان در تیمارهای S1، S2، S4 و S8 به دلیل تشکیل رسوب ترکیبات نامحلول آهن در خاک است. نورول و لندزی (۱۱) مشاهده کردند که نمک‌های معدنی آهن پس از اضافه شدن به خاک با گذشت زمان به فرم‌های غیر محلول‌تر تبدیل می‌شوند.

در خاک شماره ۲ کاهش معنی‌دار آهن قابل جذب در تیمار S0.5 نسبت به شاهد دیده می‌شود (جدول ۶) و تیمار S1 با شاهد اختلاف معنی‌داری ندارد، در حالی که در تیمارهای دیگر سرباره، افزایش معنی‌دار آهن قابل جذب نسبت به شاهد ملاحظه می‌شود. این به علت pH بیشترین خاک نسبت به خاک ۱ است که در مقادیر کمتر سرباره، pH خاک در محدوده‌ای قرار می‌گیرد که کمترین حلالیت آهن از کانی‌های سه ظرفیتی آهن در خاک وجود دارد و از این محدوده به بعد با افزایش مقدار سرباره، افزایش آهن قابل جذب دیده می‌شود (۱۰). کاهش معنی‌دار آهن قابل جذب در زمان ۲ ماه نسبت به ۱ روز در تیمارهای S1، S2، S4، S8 و S16 به دلیل رسوب آهن محلول به صورت ترکیبات نامحلول‌تر است (۱۱). فروهر (۴) نیز طی یک آزمایش انکوباسیون با استفاده از یکی از ضایعات صنایع فولاد به نام پودر اکسید آهن ضایعاتی ملاحظه کرد که با گذشت ۲ ماه از شروع آزمایش از میزان آهن قابل استخراج با AB-DTPA کاسته شده است.

در خاک شماره ۳ نیز وابستگی آهن قابل جذب به تغییرات pH خاک دیده می‌شود. با توجه به pH نزدیک به خشی در این خاک ملاحظه می‌شود که با افزایش سطح سرباره از ۱ تا ۱۶ درصد، به مقدار آهن قابل جذب نیز افزوده شده است. جدول ۶ نشان می‌دهد که با کاربرد ۲ درصد سرباره یا بیشتر، pH خاک از ۸/۵ فراتر رفته است و همان طور که قبلاً اشاره شد با افزایش غلظت گونه‌های آنیونی حاصل از هیدرولیز آهن III غلظت آهن قابل جذب خاک افزایش می‌یابد. در تیمارهای S1،

جدول ۶. اثر سرباره و زمان نگهداری بر آهن قابل استخراج (mg/kg) با AB-DTPA

خاک	تیمار		S0	S0.5	S1	S2	S4	S8	S16
	زمان	یک روز							
شماره ۱	یک روز	۳۰/۸ * bod	۲۸۵۳ ^{def}	۲۷۲/۶ ^{defg}	۲۵۱/۲ ^{efgh}	۲۰۵/۷ ^{hijk}	۲۸۳/۷ ^{def}	۲۲۷/۴ ^{ghijk}	
	ده روز	۳۳/۵ ^{bc}	۲۸۷/۰ ^{cdef}	۲۴۶/۲ ^{efgh}	۲۴۱/۸ ^{fghi}	۲۳۹/۱ ^{ijkl}	۱۸۹/۴ ^{ijkl}	۲۱۷/۵ ^{hijk}	
	یک ماه	۳۰/۷/۱ ^{bcd}	۲۹۸/۴ ^{bode}	۲۳۵/۸ ^{fghijk}	۲۲۰/۴ ^{ghijk}	۱۴۹/۴ ^{lm}	۱۸۴/۲ ^{klmn}	۲۱۵/۷ ^{hijk}	
	دو ماه	۳۳۲/۵ ^a	۳۴۴/۸ ^b	۲۲۴/۳ ^{hijk}	۲۰۵/۷ ^{hijk}	۱۳۵/۸ ^m	۱۸۲/۳ ^{klm}	۲۸۲/۹ ^{def}	
	میانگین	۳۴۶/۷ ^a	۳۰۳/۸ ^b	۲۴۴/۷ ^c	۲۲۹/۲/۸ ^{cd}	۱۹۱/۰ ^e	۲۰۹/۹ ^{de}	۲۳۵/۳ ^c	
شماره ۲	یک روز	۱۰۱/۹ ^{jkl}	۷۱/۸ ^{mn}	۸۵/۸ ^{klm}	۱۲۵/۷ ^{gh}	۱۰۵/۳ ^{ijk}	۲۶۲/۱ ^a	۲۲۲/۳ ^{bc}	
	ده روز	۹۰/۲ ^{ijklm}	۷۷/۳ ^{nop}	۷۶/۱ ^{mn}	۱۰۷/۵ ^{hij}	۱۷۴/۱ ^f	۲۴۱/۱ ^b	۲۳۳/۸ ^b	
	یک ماه	۷۶/۸ ^{mn}	۷۲/۸ ^{no}	۱۰۳/۳ ^{jk}	۹۶/۱ ^{jkl}	۸۱/۸ ^{lm}	۱۸۵/۰ ^{ef}	۱۳۵/۸ ^g	
	دو ماه	۶۲/۸ ^{no}	۴۸/۶ ^o	۶۱/۱ ^{no}	۹۸/۲ ^{jkl}	۱۲۴/۱ ^{ghi}	۲۰۶/۹ ^{cd}	۱۹۳/۵ ^{de}	
	میانگین	۸۲/۹ ^e	۶۲/۶ ^f	۶۱/۶ ^e	۳۳/۸ ^d	۱۲۱/۳ ^c	۲۲۳/۷ ^a	۱۹۶/۳ ^b	
شماره ۳	یک روز	۶۱/۸ ^{hi}	۶۲/۲ ^{hi}	۹۴/۴ ^g	۱۲۴/۷ ^f	۱۵۳/۸ ^e	۱۷۱/۳ ^{de}	۱۷۵/۷ ^{de}	
	ده روز	۵۳/۲ ^{hij}	۵۲/۱ ^{hij}	۶۴/۳ ^h	۶۴/۵ ^{hi}	۱۰۲/۰ ^{fg}	۲۰۲/۶ ^c	۱۸۷/۵ ^{cd}	
	یک ماه	۳۲/۶ ^j	۵۱/۸ ^{hij}	۶۱/۷ ^{hi}	۶۹/۲ ^h	۹۹/۷ ^g	۱۸۷/۳ ^{cd}	۲۴۶/۳ ^{ab}	
	دو ماه	۵۴/۶ ^{hij}	۴۲/۹ ^{hij}	۳۵/۴ ^{ij}	۵۷/۲ ^{hij}	۱۰۹/۲ ^{fg}	۲۳۳/۸ ^b	۲۶۰/۳ ^a	
	میانگین	۵۰/۶ ^f	۵۲/۳ ^f	۶۳/۹ ^e	۷۸/۱ ^d	۱۱۶/۲ ^c	۱۹۸/۷ ^b	۲۱۷/۴ ^a	

*: برای هر خاک، داده‌هایی که در یک حرف مشترک هستند طبق آزمون دانکن در سطح یک درصد معنی دار نمی‌باشند.

جدول ۷. تجزیه واریانس مربوط به اثر تیمارها و زمان نگهداری بر مقدار منگنز و پتاسیم (mg/kg) قابل استخراج با AB-DTPA و هدایت الکتریکی (dS/m) در خاک‌ها

میانگین مربعات									
خاک شماره ۳			خاک شماره ۲			خاک شماره ۱			منابع تغییر
هدایت الکتریکی	پتاسیم	منگنز	هدایت الکتریکی	پتاسیم	منگنز	هدایت الکتریکی	پتاسیم	منگنز	
۱۷۵**	۵۹۱۱**	۱۷/۷**	۱۵۰۳**	۴۳۱۴**	۴۸/۸**	۵۸۰**	۳۵۹۵۷**	۴۱/۶**	تیمار
۱۰۹**	۱۲۰۶**	۰/۴۷**	۳۳/۸**	۷۲۵۴**	۰/۰۵ NS	۸/۶ NS	۵۱۶۱**	۰/۳۳**	زمان
۸۵**	۲۲۵۵**	۰/۲۹**	۹۱/۶**	۱۵۹۸**	۰/۱۶**	۶۷/۷**	۴۹۹۹**	۰/۲۲**	برهمکنش تیمار× زمان
۴/۷	۱۱۳	۰/۰۶	۹/۱	۸۰/۶	۰/۰۴۰	۵/۳	۴۸۰	۰/۰۲۲	خطا

*: در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار است.

NS: معنی دار نیست.

جدول ۸. اثر سرباره و زمان نگهداری بر مگنیز قابل استخراج (mg/kg) با AB-DTPA

S16	S8	S4	S2	S1	S0.5	S0	نیمار		خاک
							زمان	شماره	
۲۲۱/۴ ^a	۱۰۶/۲ ^d	۴۷/۰ ^f	۳۹/۵ ^{ghi}	۳۴/۵ ^{ghijkl}	۲۸/۴ ^{ijklmn}	۲۳/۰ ^{*lmno}	یک روز	۱	شماره
۱۵۷/۶ ^b	۷۸/۱ ^e	۴۴/۲ ^{fg}	۳۲/۴ ^{hijkl}	۳۲/۳ ^{hijkl}	۳۱/۹ ^{hijklm}	۲۴/۳ ^{lmno}	ده روز		
۱۵۴/۷ ^b	۱۰۵/۸ ^d	۳۶/۶ ^{ghijkl}	۲۰/۱ ^{mno}	۲۲/۶ ^{lmno}	۳۸/۴ ^{fghij}	۲۴/۸ ^{klmno}	یک ماه		
۱۱۵/۵ ^d	۱۲۷/۶ ^c	۳۱/۶ ^{ijklm}	۱۵/۴ ^o	۱۷/۵ ^{no}	۴۲/۵ ^{fgh}	۲۷/۵ ^{ijklmn}	دو ماه		
۱۶۳/۳ ^a	۱۰۱/۹ ^b	۳۹/۸ ^c	۲۶/۸ ^d	۲۶/۷ ^d	۳۵/۳ ^c	۲۴/۹ ^d	میانگین		
۱۵۳/۴ ^a	۹۱/۸ ^d	۲۹/۲ ^{ij}	۲۲/۶ ^{ijkl}	۲۰/۰ ^{ijkl}	۲۰/۷ ^{ijkl}	۲۰/۷ ^{ijkl}	یک روز	۲	شماره
۱۱۶/۰ ^c	۸۲/۴ ^e	۵۳/۰ ^f	۳۴/۶ ^{hi}	۱۵/۲ ^l	۹/۳ ^m	۸/۶ ^m	ده روز		
۹۱/۸ ^d	۹۳/۴ ^d	۴۰/۴ ^{gh}	۲۵/۴ ^{jk}	۱۷/۵ ^{kl}	۳/۳ ^m	۱۳/۰ ^{klm}	یک ماه		
۱۳۶/۸ ^b	۷۶/۰ ^e	۴۴/۲ ^g	۳۵/۵ ^{hi}	۷/۸ ^m	۳/۶ ^m	۳/۲ ^m	دو ماه		
۱۲۴/۵ ^a	۸۵/۹ ^b	۴۱/۷ ^c	۲۹/۵ ^d	۱۴/۹ ^{de}	۹/۳ ^f	۱۱/۴ ^e	میانگین		
۱۹۰/۹ ^a	۸۳/۰ ^f	۶۴/۶ ^g	۳۹/۵ ^h	۳۰/۲ ⁱ	۱۶/۹ ^{ijklm}	۲۰/۰ ^{jk}	یک روز	۳	شماره
۱۳۸/۲ ^{bc}	۹۱/۳ ^e	۴۴/۸ ^h	۲۴/۲ ^{ij}	۱۶/۶ ^{ijklm}	۹/۳ ^m	۱۳/۴ ^{klm}	ده روز		
۱۰۷/۴ ^d	۱۳۳/۰ ^c	۴۶/۸ ^h	۴۰/۸ ^h	۱۲/۴ ^{klm}	۱۹/۰ ^{ijkl}	۱۲/۲ ^{klm}	یک ماه		
۱۴۵/۱ ^b	۱۳۵/۷ ^c	۵۸/۱ ^g	۱۷/۶ ^{ijklm}	۸/۱ ^m	۱۰/۳ ^{lm}	۱۰/۲ ^{lm}	دو ماه		
۱۴۵/۴ ^a	۱۱۰/۷ ^b	۵۳/۷ ^c	۳۰/۵ ^d	۱۶/۸ ^e	۱۳/۹ ^e	۱۳/۹ ^e	میانگین		

*: برای هر خاک، داده‌هایی که در یک حرف مشترک هستند طبق آزمون دانکن در سطح یک درصد معنی‌دار نمی‌باشند.

جدول ۹. اثر سرباره و زمان نگهداری بر پتاسیم قابل استخراج (mg/kg) با AB-DTPA

شماره	شماره	شماره	تیمار		شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره
-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*: برای هر خاک، داده هایی که در یک حرف مشترک هستند طبق آزمون دانکن در سطح یک درصد معنی دار نمی باشد.

جدول ۱.۰ اثر سرباره و زمان نگهداری بر قابلیت هدایت الکتریکی (dSm^{-1})

S16	S8	S4	S2	S1	S0.5	S0	نمابر		خاک
							زمان	یک روز	
۰/۹۰ ^{efg}	۱/۱۱ ^{bc}	۰/۸۶ ^{fg}	۰/۶۴ ^{ij}	۰/۵۰ ^{klm}	۰/۵۲ ^{km}	۰/۵۲ ^{* km}	یک روز		
۰/۹۶ ^{def}	۰/۸۰ ^{gh}	۰/۹۷ ^{de}	۰/۳۸ ^{nop}	۰/۳۶ ^{nop}	۰/۳۰ ^p	۰/۳۵ ^{op}	ده روز		شماره ۱
۱/۱۷ ^b	۰/۹۷ ^{de}	۱/۰۴ ^{cd}	۰/۵۵ ^{jkl}	۰/۴۶ ^{lmn}	۰/۳۹ ^{nop}	۰/۴۲ ^{mno}	یک ماه		
۱/۳۶ ^a	۰/۸۶ ^{fg}	۱/۰۸ ^{bc}	۰/۸۲ ^g	۰/۷۱ ^{hi}	۰/۵۹ ^{jk}	۰/۴۳ ^{mno}	دو ماه		
۱/۱۲ ^a	۰/۹۳ ^b	۰/۹۹ ^b	۰/۶۰ ^c	۰/۵۱ ^d	۰/۴۵ ^e	۰/۴۳ ^e	میانگین		
۱/۱۵ ^a	۱/۰۱ ^e	۰/۸۳ ^f	۰/۶۴ ^{ghi}	۰/۷۲ ^f	۰/۶۶ ^{ghijk}	۰/۵۵ ^{ghijk}	یک روز		
۱/۲۵ ^d	۰/۷۲ ^f	۰/۵۹ ^{ghij}	۰/۴۹ ^{ijk}	۰/۴۰ ^k	۰/۷۶ ^{ghijk}	۰/۳۰ ^{ghijk}	ده روز		شماره ۲
۱/۰۷ ^c	۰/۵۵ ^{ghijk}	۰/۵۳ ^{ghijk}	۰/۵۹ ^{fghij}	۰/۵۶ ^{ghijk}	۰/۴۴ ^{jk}	۰/۳۱ ^{ghijk}	یک ماه		
۱/۰۱۸ ^b	۰/۶۹ ^{fg}	۰/۶۷ ^{fgh}	۰/۶۹ ^{fg}	۰/۵۴ ^{ghijk}	۰/۵۲ ^{hijk}	۰/۳۳ ^{ghijk}	دو ماه		
۱/۱۱ ^a	۰/۷۴ ^b	۰/۶۳ ^c	۰/۶۰ ^c	۰/۵۶ ^c	۰/۵۹ ^c	۰/۳۷ ^a	میانگین		
۰/۶۹ ^a	۰/۴۹ ^d	۰/۵۰ ^d	۰/۶۱ ^{bc}	۰/۶۵ ^{abc}	۰/۶۷ ^{ab}	۰/۵۰ ^d	یک روز		
۰/۵۱ ^d	۰/۳۰ ^{fg}	۰/۵۸ ^c	۰/۳۳ ^{efg}	۰/۳۱ ^{fg}	۰/۳۴ ^{efg}	۰/۳۸ ^{ef}	ده روز		شماره ۳
۰/۶۴ ^{abc}	۰/۲۷ ^g	۰/۳۲ ^{bcfgd}	۰/۴۰ ^c	۰/۳۸ ^{ef}	۰/۳۷ ^{ef}	۰/۳۷ ^{ef}	یک ماه		
۰/۶۲ ^{abc}	۰/۳۲ ^{fg}	۰/۴۰ ^c	۰/۴۱ ^c	۰/۳۵ ^{ef}	۰/۳۸ ^{ef}	۰/۳۶ ^{ef}	دو ماه		
۰/۶۲ ^a	۰/۳۵ ^d	۰/۴۵ ^b	۰/۴۴ ^{bc}	۰/۴۳ ^{bc}	۰/۴۴ ^{bc}	۰/۴۰ ^c	میانگین		

* : برای هر خاک، داده‌هایی که در یک حرف مشترک می‌باشند طبق آزمون دانکن در سطح یک درصد معنی دار نمی‌باشند.

S2 و S4 روند کاهشی آهن قابل جذب در طول زمان دیده می‌شود. افزایش معنی دار آهن قابل جذب در طول زمان در تیمارهای S8 و S16 به دلیل بالا بودن pH خاک در طول زمان است.

مנגنز

تجزیه واریانس داده‌ها (جدول ۷) اثر تیمارها و زمان نگهداری بر مנגنز قابل استخراج با AB-DTPA را در خاک‌های اسیدی در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار نشان داد. با افزایش سطح سرباره، غلظت منگنز زیاد شده است (جدول ۸) که این در نتیجه حضور ۴/۴۶ درصد سرباره است. کان (۸) نیز در سال ۱۹۹۲ با استفاده از سرباره بازی به عنوان اصلاح کننده خاک نتیجه گرفت که غلظت منگنز محلول در خاک تیمار شده افزایش یافته است. تأثیر زمان نگهداری بر منگنز قابل جذب غالباً کاهشی بود که احتمالاً به دلیل رسوب منگنز به صورت ترکیبات با حلالیت کم است.

پتاسیم

اثر تیمارها بر پتاسیم قابل عصاره‌گیری با AB-DTPA در خاک‌ها در سطح ۱ درصد معنی دار است (جدول ۱۰). نکته مهم در مورد پتاسیم این است که با افزایش مقدار سرباره در خاک شماره ۱ از میزان پتاسیم قابل عصاره‌گیری کاسته شده است (جدول ۹). علت کاهش در این خاک تثبیت پتاسیم است. افزایش pH خاک (در اثر افزودن سرباره) سبب حذف پلیمرهای هیدروکسی آهن و آلومینیوم در فضای بین لایه‌ای رس‌ها شده

منابع مورد استفاده

۱. افلاکی، ع. ۱۳۷۴. تحقیق روی پارامترهای مؤثر در بازیابی ترکیبات وانادیومی از سرباره. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
۲. پال، ال. آ. و ف. ای. کلارک. ۱۳۷۶. میکروبیولوژی و بیوشیمی خاک (ترجمه: ن. علی اصغرزاده). انتشارات دانشگاه تبریز. ۴۲۱ صفحه.
۳. زرین کفش، م. ۱۳۷۲. خاک‌شناسی کاربردی. انتشارات دانشگاه تهران.
۴. فروهر، م. ۱۳۷۸. بررسی امکان استفاده از پودر اکسید آهن ضایعاتی حاصل از فرآیند اسید شوئی فولاد به عنوان کود آهن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

و در نتیجه تثبیت پتاسیم افزایش می‌یابد. از عوامل مؤثر دیگر در تثبیت پتاسیم تشکیل ترکیبات نامحلول پتاسیم به ویژه آلومینوسیلیکات‌های پتاسیم در pH‌های بالا (با افزودن سطوح بالای سرباره) است (۵). در خاک شماره ۲ برهمکنش تیمار و زمان در سطح ۵ درصد معنی دار نیست (جدول ۷) و تیمارها نیز همان روند ذکر شده در مورد خاک شماره ۱ را طی می‌کنند. به طور کلی در خاک شماره ۱، میانگین پتاسیم عصاره‌گیری شده از خاک تیمار شده با ۱۶ درصد سرباره کاهشی معادل ۵/۵۸ درصد نسبت به شاهد نشان می‌دهد، حال آن که چنین کاهشی در خاک شماره ۲ تا ۲۵/۵ درصد است. برهمکنش تیمار و زمان در خاک شماره ۳ معنی دار نیست و اثر تیمارها نیز قابل ملاحظه نیست.

هدایت الکتریکی

اثر تیمارها و زمان نگهداری بر قابلیت هدایت الکتریکی در خاک‌های اسیدی در سطح احتمال یک درصد معنی دار است (جدول ۷). در تمام نمونه‌ها، کاربرد سرباره سبب افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک شده است (جدول ۱۰). این افزایش در مقادیر بالای سرباره یعنی تیمارهای S8 و S16 بیشتر محسوس است. در هر صورت تأثیر سرباره بر قابلیت هدایت الکتریکی در تمام سطوح مصرفی قابل ملاحظه نبوده و تأثیر سوئی بر EC خاک ندارد. تأثیر زمان نیز در خاک شماره ۱ روند افزایشی و در دو خاک دیگر قابل ملاحظه نیست.

۵. ملکوتی، م. ج. و م. افخمی. ۱۳۷۸. ضرورت جلوگیری از تخلیه پتاسیم خاک‌های اراضی شالیزاری شمال کشور. نشریه فنی شماره ۶، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج.
6. Adams, F. 1984. Crop response to lime in the southern United State. pp: 211-265. In: F. Adams (Ed.), Soil Acidity. 2nd ed., ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI.
7. Cassanova, E., M. J. Perez and M. Flores. 1993. Agronomic evaluation of phosphate rock and slag on an Upata acid soil in Bolivia State. Commu. Soil Sci. Plant Anal. 24(7-8): 573-578.
8. Khan, H. R. 1996. Dynamic in composition of percolating solutions from acid sulfate soil under rice and selected amendments. Curr. Agric. 20(1-2): 51-60.
9. Kristen, M. and K.J. Erstad. 1996. Converter slag as a liming material on organic soils. Norwegian J. Agric. Sci. 10(1): 83-93.
10. Lindsay, W. L. and A.P. Schqab. 1982. The chemistry of iron in soils and its availability to plant. J. Plant Nutr. 5 (4-7): 821-840.
11. Norvell, W. A. and W. L. Lindsay. 1982. Effect of ferric chlorid additions on the solubility of ferric iron of a near – neutral soil. J. Plant Nutr. 5: 1285-1295 .
12. Oguntinbo, F. I., E. A. Aduay and R. A. Sobulo. 1996. Effectiveness of some local liming materials in Nigeria as ameliorants of soil acidity. J. Plant Nutr. 19(7): 999-1016.
13. Oya, K., N. Kinjo and M. Shimo. 1990. The improving effect of several limig materials on the growth and nutrient uptake of rodes grass. Sci. Bull. College Agric., Univ. Ryukyus, Okinawa. 37: 7-17.
14. Paye, A. L., R. H. Miller and D. R. Keeny. 1984. Method of Soil Analysis. Part II. SSSA Inc., Madison, WI.
15. Pinto, M., M. Rodriguez, B. N. Besga and F. A. Lopez. 1995. Effects of Linz-Donawitz (LD) slag on soil properties and pasture production in the Basque County (Northern Spain). New Zealand J. Agric. Res. 38 (1): 143-155.
16. Plaster, J. E. 1997. Soil Science and Management. 3rd ed., Delmar Pub., India.
17. Ponnente, Q., R. Frankart, W. Poma Rojas and C. Petit . 1991. Effects of mineral ammendments on the physico-chemical properties of a brown acid soil in a beech stand in the Belgian Ardennes. Pedologie 41 (1): 89-100.
18. Rodriguez, M., F.A. Lopez, M. Pinto, N. Balcazar and G. Besga. 1994. Basic Linz-Donawitz slag as a liming agent for pastureland. Agron. J. 86:904-909.
19. Shariatmadari, H. and A. R. Mermut. 1999. Magnesium and silicon-induced phosphate desorption in smectite-, palygorskite- and sepiolite- calcite systems. Soil Sci. Soc. Am. J. 63: 1167-1173.
20. Sloan, J. J. and N. T. Basta. 1995. Remediation of acid soils by using alkaline biosolids. J. Environ. Qual. 24:1097-1103.
21. Soltanpour, P. N., F. Adams and A. C. Bennett. 1974. Soil phosphorus availability measured by displaced soil solution, calcium-chloride extracts, dilute-acid extracts, labile phosphorus. Soil Sci. Soc. Am. J. 38:225-228.
22. Stuczynski, T. I., G. W. McCarty and R. J. Wright. 1998. Impact of coal combustion product amendments on soil quality : 1. Mobilization of soil organic nitrogen. Soil Sci. Soc. Am.J. 163:952-959.
23. Subramanian, S. and A. Copalswamy. 1990. Influence of silicate and phosphate materials on availability and uptake of silicon and phosphorus in acid soil. Oryza 27(3): 267-273.
24. United Nation. 1990. The recuperation and economic utilization of by-products of the iron and steel industry. Economic Commission for Europe, Geneva.