

ارزیابی کمی و کیفی میوه دو توده محلی طالبی به صورت پیوندی و غیرپیوندی

رقیه جوانپور^{۱*}، رضا صالحی^۲، میثم نژادصاحبی^۲ و سید ضیاء نصرتی^۱

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۶/۷؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۴/۸)

چکیده

به منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی دو توده محلی پیوندی طالبی (*Cucumis melo* Gr. Cantalupensis) به نام‌های سمسوری و ساوه، پژوهشی در سال ۱۳۸۸ در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با ۱۰ تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج انجام شد. پنج رقم کدوی هیریید تجاری به نام‌های ShintoHongto، Shintozwa، Ace، Zuktozwa و Ferro به عنوان پایه استفاده شدند. رقم‌های ShintoHongto و Shintozwa به عنوان پایه هر دو توده سمسوری و ساوه و رقم‌های Zuktozwa و Ferro فقط به عنوان پایه توده سمسوری به کار گرفته شدند. هر توده سمسوری و ساوه غیرپیوندی نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. تجزیه واریانس اثر پایه روی صفات در طالبی سمسوری نشان داد که تعداد میوه کل، تعداد میوه بازارپستن، عملکرد میوه بازارپستن و مواد جامد محلول میوه تحت تأثیر پایه قرار گرفته است و اختلاف معنی‌داری نشان داد. از طرف دیگر در طالبی ساوه، وزن تک میوه و وزن تک میوه بازارپستن و ضخامت گوشت میوه تحت تأثیر پایه تفاوت معنی‌داری نشان داد. مطابق با نتایج مقایسه میانگین، توده سمسوری پیوند شده روی پایه Shintozwa با ۵/۶۸ عدد از تعداد میوه بازارپستن بیشتری برخوردار بود. هم‌چنین توده سمسوری پیوند شده روی پایه Shintozwa با ۸۵/۱۰ کیلوگرم بالاترین عملکرد بازارپستن تک بوته را داشت. در مورد مواد جامد محلول میوه، توده سمسوری پیوند شده در مقایسه با سمسوری‌های غیرپیوندی، با اختلاف معنی‌داری شیرین‌ترین میوه‌ها با بریکس بالا را تولید نمودند. پایه Ace در مقایسه با دیگر پایه‌ها، توانست سنگین‌ترین میوه بازارپستن (۳/۲۳ کیلوگرم) را با پیوند تک توده ساوه از آن خود کند. در توده ساوه، ضخامت گوشت میوه روی پایه Ace به همراه گیاهان غیرپیوندی با اختلاف معنی‌داری بیشتر از سایر پایه‌ها بود.

واژه‌های کلیدی: پایه، پیوندک، عملکرد، توده سمسوری، توده ساوه

۱ و ۲. بهتریب دانشجوی دکترا و استادیار، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

۳. مریبی، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی محصولات باغبانی، جهاد دانشگاهی واحد تهران

*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: javanpoor@ut.ac.ir

مقدمه

حال حاضر تحقیقات گسترشده و هدفمندی روی اثرات مثبت و منفی پیوند روی رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه طالبی و خربزه روی پایه‌های مختلف در حال انجام است. گزینش پایه مناسب با ویژگی‌های شناخته شده از اولویت‌های مهم در بحث پیوند سبزی‌های میوه‌ای همچون طالبی می‌باشد. اکثر پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تغییرات ناشی از پیوند، توسط پایه از طریق جذب، ستتر، و انتقال آب، مواد معدنی و هورمون‌های گیاهی کنترل می‌شوند (۱۱). صالحی و همکاران (۱۷) گزارش نمودند که از سه پایه مورد آزمایش روی خربزه خاتونی، تمام گیاهان پیوندی بیوماس بیشتری نسبت به گیاهان غیرپیوندی تولید کردند. مطالعه‌ای توسط ادلستین و همکاران (۴) نشان داد که تعداد برگ، طول ساقه و وزن تر خربزه با پیوند روی ۲۲ پایه مختلف از جنس *Cucurbita* spp. افزایش می‌یابد. همچنین صالحی و همکاران (۱۷) یک افزایش عملکرد ۲/۵ برابری را در گیاهان پیوندی خربزه خاتونی گزارش نمودند که دلیل آن را اندازه بزرگ میوه و افزایش تعداد میوه در گیاهان پیوندی ذکر کردند. همچنین در تحقیقی مشخص شد که در اکثر ترکیبات پایه و پیوندک با پیوندک‌های خربزه، پایه اثری روی عملکرد ندارد (۹).

بنا به نظر پژوهشگران، تغییرات در کیفیت میوه کدوئیان پیوندی با توجه به گزارش‌های متناقض در منابع علمی به هر دو شریک پیوند (پایه و پیوندک) مربوط می‌شود (۲۲). طبق گزارش‌ها، پیوند منجر به کاهش یک واحد بریکس در محتوای قند هندوانه و خربزه می‌شود (۶، ۱۴، ۲۱، ۲۲). با این حال، در شرایط مطلوب رشد، خربزه‌ها و خیارهای پیوندی اسپانیایی از بازار پسندی خوبی برخوردار بوده و کاهشی در کیفیت میوه مشاهده نمی‌شود (۶). صالحی و همکاران (۱۷) نیز کاهش یک واحدی بریکس در محتوای مواد جامد محلول میوه‌های پیوندی خربزه خاتونی نسبت به میوه‌های غیرپیوندی گزارش نمودند.

مقوله پیوند سبزی‌ها در ایران، موضوع به نسبت جدیدی است و تحقیقات محدودی در مورد آن به ویژه طالبی انجام

کاشت سبزی‌های پیوندی در سال‌های اخیر گسترش زیادی در برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیدا کرده است که علت عدمه آن را می‌توان آگاهی کشاورزان از ویژگی‌های مطلوب پایه‌های مورد استفاده ذکر نمود. سبزی‌های میوه‌ای همچون هندوانه، خربزه، طالبی، خیار، گوجه‌فرنگی و بادنجان قبل از نشاء‌کاری در مزرعه یا گلخانه بر روی پایه‌های مختلف پیوند می‌شوند. برای پیوند سبزی‌ها، طیف وسیعی از اهداف را ذکر می‌کنند که مهم‌ترین آنها استفاده از پتانسیل بالای نشاء‌های پیوندی در کنترل عوامل بیماری‌زای خاکزاد می‌باشد. گزارش‌های زیادی نشان می‌دهند که علاوه بر این هدف مهم، نشاء‌های پیوندی در مقابل تنش‌های محیطی همچون دمای پایین و شوری بالای خاک مقاوم بوده و با جذب بهتر آب و عناصر غذایی منجر به بهبود عملکرد در این شرایط نامطلوب برای رشد و نمو گیاه می‌شوند (۱، ۱۰، ۱۲، ۱۵).

طالبی و خربزه از مهم‌ترین گیاهان جالیزی می‌باشند که با دارا بودن ارقام و توده‌های بسیار متنوع، دامنه گسترش زیادی داشته و هر ساله در بسیاری از مناطق جالیزکاری ایران پرورش داده می‌شوند (۷). این دو سبزی میوه‌ای در بین ایرانیان از مقبولیت بالایی برخوردار بوده و با حدود ۱/۲ میلیون تن تولید سالیانه، بعد از کشورهای چین و ترکیه، ایران را در جایگاه سوم تولید جهانی قرار داده‌اند (۵). با این وجود در کنار مقبولیت عمومی، کشت و کار طالبی تحت تأثیر عوامل بیماری‌زای خطرناکی همچون بوته میری است که هر ساله تلفات قابل توجهی را به جالیزکاران تحمیل می‌کند. البته این مشکل در اکثر کشورهای تولید کننده این محصول وجود دارد. مطابق با آمار جهانی حدود ۷۲٪ تلفات سبزی‌ها به عوامل بیماری‌زای خاکزاد اختصاص دارد (۱۰). در این کشورها هم اکنون تنها راه حل سالم و تأثیرگذار در کنار القای مقاومت ژنتیکی، پیوند طالبی روی پایه‌های مقاوم به این بیماری‌ها است که در اکثر موارد نتایج خوبی را به معرض نمایش گذاشته است (۳).

در کنار مقاومت نشاء‌های پیوندی به بیماری‌های خاکزاد، در

ذکر شده، گیاهچه‌های پایه و پیوندک، دو هفته بعد از کاشت بذور، آماده برای عملیات پیوند بودند.

عملیات پیوند

عملیات پیوند در تاریخ ۸۹/۲/۷ و ۸۹/۲/۸ انجام گرفت. روشی که برای پیوند گیاهچه‌های طالبی بر روی پایه‌های کدو استفاده شد، روش نیمانیم تغییر یافته بود (۳). ابتدا گیاهچه پیوندک یک سانتی متر پایین‌تر از برگ‌های لپه‌ای به صورت مورب قطع شد. سپس مریستم انتهایی (نقطه رشدی) پایه به همراه یک برگ لپه‌ای به صورت مورب با یک تیغ تیز حذف گردید. دو محل بریده شده سپس روی هم قرار گرفته و از یک گیره پیوند برای ثابت نگهداشتن محل پیوند استفاده شد. گیاهچه‌های پیوند شده بعد از پیوند به اتفاق کمی پیوند که در آن دما (۳۰ درجه سانتی‌گراد)، رطوبت نسبی (سه روز اول بعد از پیوند در حدود ۹۵٪ و بعد حدود ۷۰٪ و نور (سه روز اول تاریکی مطلق و بعد نور طبیعی) به طور دقیق کنترل می‌شد، منتقل شدند. پس از گذشت ۱۰ روز از زمان پیوند، گیاهچه‌های پیوندی از اتفاق پیوند خارج شده و به یک گلخانه شیشه‌ای با نور کافی و طبیعی (۱۰-۱۵ هزار لوکس)، دمای ۲۵-۲۷ درجه سانتی‌گراد (روز) و ۱۸-۲۰ درجه سانتی‌گراد (شب) منتقل شده و روزی یک نوبت آبیاری شدند (۱۸). درصد زنده‌مانی پیوندها ۸۵٪ بود.

حدود سه هفته پس از عملیات پیوند و در تاریخ ۸۹/۳/۴ نشاء‌های پیوندی و غیرپیوندی طالبی به مزرعه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی انتقال یافته و روی ردیف‌های با عرض ۱/۵ متر با فاصله ۶۰ سانتی متر از یکدیگر نشاء کاری شدند. ابعاد هر کرت آزمایشی $3 \times 4/5$ متر بود. لازم به ذکر است که خاک مزرعه قبل از کشت با علفکش ترفلان سم پاشی شده بود. نتایج آزمایش تجزیه خاک مزرعه مورد نظر در جدول (۱) ارایه شده است. در طول دوره رشد بوته‌های پیوندی و غیرپیوندی، کلیه عملیات داشت از جمله آبیاری منظم هفتگی، مبارزه با علف‌های هرز از طریق و جین دستی، مبارزه با شته با سم متاسیستوکس، مبارزه با

گرفته است. با توجه به اهمیت طالبی در داخل و گسترش روزافرون تکنیک پیوند در خارج از کشور، تلقیق طالبی ایرانی با پیوند می‌تواند زمینه‌ساز رفع بخشی از مشکلات موجود بر سر راه تولید طالبی در کشور باشد. با این بینش، هدف ما در این تحقیق، بررسی واکنش عملکرد و کیفیت میوه طالبی‌های ایرانی به پیوند روی پایه‌های مختلف کدو می‌باشد.

مواد و روش‌ها

محل اجرای آزمایش

عملیات اجرایی تحقیق حاضر در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی گیاهان با غبانی وابسته به جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج انجام شده است.

مواد گیاهی

برای انجام آزمایش دو توده طالبی (*Cucumis melo* Gr. *Cantalupensis*) به نام‌های سمسوری و ساوه روی پنج رقم کدوی هیرید تجاری به نام‌های Ace، Shintozwa و Zuktozwa، ShintoHongto پیوند شدند. همه پایه‌ها هیریدهای بین گونه‌ای *Cucurbita maxima* × *C. moschata* می‌باشند. این پایه‌ها مقاومت خوبی به فوزاریوم، دمای بالا و پایین خاک، رطوبت زیاد خاک و قدرت رشد عالی دارند (۱۰).

کاشت بذور پایه و پیوندک

بذرهای پایه و پیوندک در تاریخ ۸۹/۱/۲۸ برای جذب آب خیسانده و در تاریخ ۸۹/۱/۳۰ به طور همزمان به ترتیب در گلدان‌ها و سینی‌های نشاء کاشته شدند. برای کاشت بذور پیوندک از سینی‌های نشاء ۷۲ حجره‌ای استفاده شد. بستر کاشت مورد استفاده برای کاشت بذور، مخلوطی از خاک، خاک برگ و ماسه به نسبت حجمی مساوی بود. هیچ گونه کودی در این مرحله به گیاهان اضافه نشد. در شرایط محیطی و مکانی

جدول ۱. نتایج تجزیه خاک مزرعه تحقیقاتی محل اجرای آزمایش

بافت خاک	منگنز (ppm)	روی (ppm)	مس (ppm)	آهن (ppm)	پتاس (ppm)	فسفر (ppm)	درصد مواد آلی	درصد نیتروژن کل	EC (dSm ⁻¹)	pH
رسی لومی	۲۷/۳	۱/۸۱	۱/۱۲	۷/۵۳	۱۴۶	۱۳/۶۶	۰/۷۷	۰/۰۸۱	۲/۷۱	۸/۱

و وزن تک میوه پس از برداشت یادداشت گردید. برای وزن کردن میوه‌ها از ترازوی دیجیتالی استفاده شد. وزن کل میوه‌های برداشت شده از هر بوته به تعداد میوه‌ها، تقسیم و وزن تک میوه محاسبه می‌گردید. در نهایت براساس میوه‌های برداشت شده، عملکرد کل براساس کیلوگرم بوته محاسبه گردید.

تجزیه تحلیل آماری

برای اجرای آزمایش حاضر از طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی برای توده ساوه با چهار تیمار و توده سمسوری با شش تیمار در سه تکرار به صورت جداگانه استفاده شد. برای توده ساوه پایه‌های Ace، Shintozwa و ShintoHongto و برای توده ShintoHongto، Shintozwa، Ace پایه‌های Zuktozwa و Ferro به کار رفتند. هر توده سمسوری و ساوه غیرپیوندی نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. داده‌های جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار آماری SAS (۲۳) تجزیه گردیدند. مقایسه میانگین بین صفات با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن انجام گرفت (۲۴).

نتایج

صفات کمی

تجزیه واریانس اثر پایه روی صفات کمی مرتبط با میوه گیاهان پیوندی و غیرپیوندی طالبی سمسوری (جدول ۲) و طالبی ساوه (جدول ۳) نشان داد که در طالبی سمسوری تعداد میوه کل، تعداد میوه بازارپسند و عملکرد میوه بازارپسند تحت تأثیر پایه قرار گرفته است و اختلاف معنی‌داری نشان داد (جدول ۲). از طرف دیگر در طالبی سمسوری سایر صفات کمی مانند وزن تک میوه و وزن تک میوه بازارپسند در بوته تحت تأثیر پایه

سفیدک سطحی با سم توپاس و دیگر مراقبت‌ها به‌طور منظم انجام گرفت. برای آبیاری نشاء‌ها از سیستم جوی و پشت‌های استفاده شد.

صفات مورد ارزیابی

پس از رسیدن کامل میوه‌ها روی بوته، اولین برداشت در تاریخ ۱۰/۵/۸۹ انجام گرفت. فاصله زمانی بین برداشت‌های متوالی هر چین به فاصله تقریبی ۱۰ روز بود. میوه‌های بوته‌های پیوندی و غیرپیوندی جهت ارزیابی صفات مرتبط با عملکرد و اجزای آن و هم‌چنین صفات کیفی برداشت شدند. صفات کمی و کیفی مرتبط با میوه‌های برداشت شده شامل عملکرد تک بوته، تعداد میوه (کل و بازارپسند)، وزن تک میوه (کل و بازارپسند)، ضخامت گوشت، قطر حفره بذر، درصد مواد جامد محلول، درصد ماده خشک گوشت و سفتی بافت بودند. برای اندازه‌گیری درصد ماده خشک گوشت، نمونه‌ها به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۷۵ درجه سانتی‌گراد در آون نگهداری شدند. برای اندازه‌گیری مواد جامد محلول میوه از رفراکتومتر (Refractometer, Model: ATAGOBrix0-62%) استفاده شد. برای سنجش سفتی بافت، به‌طور تصادفی ۵ میوه از هر تیمار در مرحله رسیدن انتخاب شدند و با استفاده از دستگاه فشارسنج (Penetrometer) و با بلانچر (Blancher) که در گوشت میوه فرو برده می‌شود) با سطح مقطع ۰/۸ سانتی‌متر، استحکام میوه اندازه‌گیری شد. میانگین اعداد به دست آمده بر حسب کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع میزان استحکام میوه رسیده را نشان می‌دهند. میوه‌های زیر یک کیلوگرم و میوه‌های بدلشکل به عنوان غیر بازارپسند و بالای یک کیلوگرم با شکل نرمال به عنوان بازارپسند در نظر گرفته شدند. تعداد میوه در هر بوته شمارش

جدول ۲. تجزیه واریانس صفات کمی میوه گیاهان پیوندی و غیرپیوندی طالبی سمسوری

میانگین مربعات							
عملکرد بازارپستن تک بوته	تعداد میوه بازارپستن در بوته	تعداد میوه کل در بوته	وزن تک میوه بازارپستن میوه	وزن تک بازارپستن میوه	درجه آزادی	منابع تغییرات	
۱۴/۵*	۷/۲۳**	۹/۸۷*	۰/۰۲۸ ns	۰/۰۲ ns	۵	تیمار	
۰/۵۸ ns	۰/۳۴ ns	۱/۳۳ ns	۰/۰۲ ns	۰/۰۰۶ ns	۲	بلوک	
۲/۷۹	۰/۴۹	۱/۸۵	۰/۰۷	۰/۱۷	۱۰	خطا	
۲۲/۷۵	۲۰/۷۱	۲۶/۷۵	۱۶/۹۸	۲۵/۳۵	ضریب تغییرات (درصد)		

* و ** و ns: به ترتیب معنی داری در سطح احتمال پنج و یک درصد و عدم وجود معنی داری

جدول ۳. تجزیه واریانس صفات کمی میوه گیاهان پیوندی و غیرپیوندی طالبی ساوه

میانگین مربعات							
عملکرد بازارپستن تک بوته	تعداد میوه بازارپستن در بوته	تعداد میوه کل در بوته	وزن تک میوه بازارپستن میوه کل	وزن تک بازارپستن میوه کل	درجه آزادی	منابع تغییرات	
۴/۳۷ ns	۰/۶۲ ns	۱/۴ ns	۱/۱۷*	۱/۶۸*	۳	تیمار	
۸/۰۲ ns	۰/۲۸ ns	۰/۱۷ ns	۰/۲۵ ns	۰/۲۸ ns	۲	بلوک	
۵/۰۱	۰/۴۶	۰/۷۵	۰/۱۵	۰/۲۵	۶	خطا	
۲۷/۹۹	۲۱/۱۵	۲۱/۹۵	۱۶/۵۷	۲۳/۱۶	ضریب تغییرات (درصد)		

* و ** و ns: به ترتیب معنی داری در سطح احتمال پنج و یک درصد و عدم وجود معنی داری

اختصاص داشت. توده سمسوری پیوند شده روی پایه Shintozwa با ۵/۶۸ عدد از تعداد میوه بازارپستن بیشتری نسبت به سایر پایه ها برخوردار بود. در مورد عملکرد بازارپستن تک بوته، توده سمسوری پیوند شده روی پایه Shintozwa با ۱۰/۸۵ کیلوگرم بالاترین عملکرد را داشت. در توده سمسوری غیرپیوندی با ۴/۶۴ کیلوگرم، عملکرد بازارپستن کمتری مشاهد شد (جدول ۴). براساس نتایج مقایسه میانگین، در طالبی توده ساوه بیشترین وزن تک میوه کل (۳/۲۵ کیلوگرم) مربوط به پایه های Ace بود. دیگر پایه ها در این صفت با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند. پایه Ace در مقایسه با دیگر پایه ها، توانست

قرار نگرفته و تفاوت معنی داری نشان ندادند (جدول ۲). بر عکس در طالبی ساوه وزن تک میوه و وزن تک میوه بازارپستن در بوته تحت تأثیر پایه قرار گرفته و تفاوت معنی داری در سطح یک درصد نشان دادند. اما تعداد میوه کل، تعداد میوه بازارپستن و عملکرد میوه بازارپستن تحت تأثیر پایه قرار نگرفته و اختلاف معنی داری نشان ندادند (جدول ۲).

مطابق با نتایج مقایسه میانگین صفات، در مورد توده سمسوری بیشترین تعداد میوه کل در بوته، مربوط به پایه های Shintozwa و Zuktozwa به ترتیب با ۷/۱۵ و ۶/۸۳ عدد میوه بود. کمترین آن به سمسوری غیرپیوندی با ۲/۶ عدد میوه کل در بوته

جدول ۴. مقایسه میانگین صفات کمی اندازه‌گیری شده میوه گیاهان پیوندی و غیرپیوندی طالبی سمسوری

پایه	میوه کل (کیلوگرم)	وزن تک میوه	تعداد میوه کل در بوته	تعداد میوه بازارپسند	تعداد میوه بازارپسند	عملکرد بازارپسند
Ace	۱/۲۹ ^a	۱/۶۶ ^a	۵/۹ ^{ab}	۳/۹۳ ^{bc}	۷/۷۷ ^{abc}	تک بوته (کیلوگرم)
Shintozwa	۱/۰۳ ^a	۱/۷ ^a	۷/۱۵ ^a	۵/۶۸ ^a	۱۰/۸۵ ^a	با بوته
Zuktozwa	۱/۳ ^a	۱/۵۹ ^a	۶/۸۳ ^a	۴/۴۱ ^{ab}	۸/۲۹ ^{ab}	بازارپسند
ShintoHongto	۱/۲۹ ^a	۱/۶۱ ^a	۳/۹۱ ^{bc}	۲/۱۶ ^d	۶/۹۹ ^{bc}	با بوته
Ferro-RZ	۱/۳ ^a	۱/۶۳ ^a	۴/۱۱ ^{bc}	۲/۶۸ ^{cd}	۵/۵۱ ^{bc}	بازارپسند
غیرپیوندی	۱/۲۹ ^a	۱/۴۲ ^a	۲/۶۰ ^c	۱/۵۳ ^d	۴/۶۴ ^c	با بوته

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون، تفاوت معنی‌داری براساس آزمون دانکن در سطح پنج درصد ندارند.

جدول ۵. مقایسه میانگین صفات کمی اندازه‌گیری شده میوه گیاهان پیوندی و غیرپیوندی طالبی ساوه

پایه	میوه کل (کیلوگرم)	وزن تک	تعداد میوه کل در بوته	تعداد میوه بازارپسند	تعداد میوه بازارپسند	عملکرد بازارپسند
Ace	۳/۲۵ ^a	۳/۲۳ ^a	۳/۱۶ ^a	۳/۰۰ ^a	۹/۱۳ ^a	تک بوته (کیلوگرم)
Shintozwa	۲/۰۶ ^b	۲/۱۸ ^b	۴/۳۴ ^a	۳/۸۸ ^a	۸/۹۵ ^a	با بوته
Zuktozwa	۱/۵۱ ^b	۱/۷ ^b	۴/۶۶ ^a	۳/۱۶ ^a	۶/۹۲ ^a	بازارپسند
غیرپیوندی	۱/۹۰ ^b	۲/۲۵ ^b	۲/۶۰ ^a	۲/۸۶ ^a	۶/۹۹ ^a	با بوته

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون، تفاوت معنی‌داری براساس آزمون دانکن در سطح پنج درصد ندارند.

پایه اختلاف معنی‌داری نشان ندادند. اما ضخامت گوشت میوه تحت تأثیر پایه در سطح پنج درصد اختلاف معنی‌داری نشان داد (جدول ۷).

طبق نتایج مقایسه میانگین، در مورد مواد جامد محلول میوه، توده سمسوری پیوند شده در مقایسه با سمسوری‌های غیرپیوندی، با اختلاف معنی‌داری شیرین‌ترین میوه‌ها با بریکس بالا را تولید نمودند. در این بین شیرین‌ترین میوه‌ها توده طالبی سمسوری پیوند روی پایه Ace با ۸/۳۳ واحد بریکس اختصاص داشت. بعد از آن سمسوری پیوند شده روی پایه Ferro-RZ و Shintozwa، ShintoHongto از میزان مواد جامد محلول بیشتری برخوردار بودند. با وجود عدم اختلاف

سنگین‌ترین میوه بازارپسند (۳/۲۳ کیلوگرم) را با پیوند کردن توده ساوه از آن خود کند (جدول ۵).

صفات کیفی

مطابق با نتایج به دست آمده، در توده سمسوری، صفات سفتی پوست، ضخامت گوشت، قطر حفره بذر و درصد ماده خشک میوه تحت تأثیر پایه قرار نگرفتند و از نظر آماری اختلاف معنی‌داری نشان ندادند. در این بین تنها مواد جامد محلول میوه تحت تأثیر پایه در سطح پنج درصد اختلاف معنی‌داری نشان داد (جدول ۶). در توده ساوه، صفات سفتی پوست، مواد جامد محلول، قطر حفره بذر و درصد ماده خشک میوه تحت تأثیر

جدول ۶. تجزیه واریانس صفات کیفی میوه گیاهان پیوندی و غیرپیوندی طالبی سمسوری

میانگین مربعات							منابع تغییرات
مواد جامد محلول	قطر حفره بذری	سفتی بافت	ماده خشک میوه	ضخامت گوشت	درجه آزادی		
۱۱/۳۱*	۰/۹۵ ns	۰/۹۷ ns	۲/۰۹ ns	۰/۲۹ ns	۹		تیمار
۱/۴۴ ns	۰/۰۸ ns	۰/۷۷ ns	۰/۳۶ ns	۰/۲۰ ns	۲		بلوک
۲/۳۰	۱/۰۳	۱/۳۰	۱/۱۹	۰/۵۲	۱۸		خطا
۲۲/۳۰	۱۳/۶۵	۹/۵۷	۲۰/۲۶	۲۱/۳۱			ضریب تغییرات (درصد)

** و ns: به ترتیب معنی داری در سطح احتمال یک درصد و عدم وجود معنی داری

جدول ۷. تجزیه واریانس صفات کیفی میوه گیاهان پیوندی و غیرپیوندی طالبی ساوه

میانگین مربعات							منابع تغییرات
مواد جامد محلول	قطر حفره بذری	سفتی بافت	ماده خشک میوه	ضخامت گوشت	درجه آزادی		
۳/۱۰ ns	۱/۶۵ ns	۱۷/۳۳ ns	۰/۷۰ ns	۰/۴۲ *	۹		تیمار
۱/۳۰ ns	۴/۱۳ ns	۴/۱۵ ns	۰/۳۷ ns	۰/۰۷ ns	۲		بلوک
۱/۱۷	۱/۲۱	۷/۸۸	۰/۹۴	۰/۰۸	۱۸		خطا
۲۲/۹۸	۱۰/۶۸	۲۰/۷۲	۲۰/۶۶	۷/۸۵			ضریب تغییرات (درصد)

* و ns: به ترتیب معنی داری در سطح احتمال یک درصد و عدم وجود معنی داری

واحد از بریکس بیشتر و روی پایه Zuktozwa با ۳/۶۶ واحد از بریکس کمتری برخوردار بود (جدول ۹). همچنین با وجود عدم تفاوت معنی دار، قطر حفره بذری در میوه های توده ساوه پیوند شده روی پایه Ace با ۱۱/۱۳ میلی متر بیشتر از سایر پایه ها بود. مطابق با نتایج به دست آمده، بافت میوه توده ساوه پیوند شده روی پایه Ace در مقایسه با توode طالبی ساوه پیوند نشده سفت تر بود. به طوری که براساس واحد کیلوگرم بر سانتی متر مربع، این عدد برای طالبی ساوه پیوند شده روی پایه Ace ۱۶/۲۶ و برای طالبی ساوه پیوند نشده ۱۰/۴۶ کیلوگرم بر سانتی متر مربع به دست آمد (جدول ۹).

معنی دار، میوه گیاهان توده سمسوری پیوند شده روی پایه Ace از درصد ماده خشک میوه بیشتری (۶/۳ درصد) برخوردار بودند. همچنین با وجود عدم تفاوت معنی دار، قطر حفره بذری کمتری به توده سمسوری پیوند شده روی پایه Ferro-RZ (۸/۶۶ میلی متر) و ShintoHongto (۸/۲۶ میلی متر) اختصاص داشت (جدول ۸). براساس نتایج مقایسه میانگین، در توده ساوه، ضخامت گوشت میوه روی پایه Ace به همراه گیاهان غیرپیوندی با اختلاف معنی داری بیشتر از سایر پایه ها بود. در واقع پیوند روی پایه های Zuktozwa و ShintoHongto باعث کاهش ضخامت گوشت میوه طالبی ساوه شده است. با وجود عدم اختلاف معنی دار، توده ساوه روی پایه Shintozwa با ۶/۱۳

جدول ۸. مقایسه میانگین صفات کیفی اندازه‌گیری شده میوه گیاهان پیوندی و غیرپیوندی طالبی سمسوری

پایه (بریکس)	مواد جامد محلول (میلی‌متر)	قطر حفره بذر (میلی‌متر)	سفتی بافت (کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع)	ماده خشک میوه (درصد)	ضخامت گوشت (سانتی‌متر)	
۸/۳۳ ^a	۹/۶۶ ^a	۱۱/۳۰ ^a	۶/۳۰ ^a	۳/۴۳ ^a	Ace	
۷/۵۰ ^a	۸/۸۳ ^a	۱۲/۶۳ ^a	۶/۰۶ ^{ab}	۳/۶۳ ^a	Shintozwa	
۶/۶۶ ^a	۹/۵۰ ^a	۱۱/۳۳ ^a	۵/۰۰ ^{ab}	۲/۹۶ ^a	Zuktozwa	
۷/۸۳ ^a	۸/۲۶ ^a	۱۲/۴۶ ^a	۴/۱۰ ^b	۳/۱۶ ^a	ShintoHongto	
۷/۵۰ ^a	۸/۶۶ ^a	۱۲/۱۰ ^a	۶/۲۰ ^{ab}	۳/۸۳ ^a	Ferro-RZ	
۰۰۳ ^b	۹/۵۰ ^a	۱۱/۶۶ ^a	۴/۶۳ ^{ab}	۳/۳۳ ^a	غیرپیوندی	

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون، تفاوت معنی‌داری براساس آزمون دانکن در سطح پنج درصد ندارند.

جدول ۹. مقایسه میانگین صفات کیفی اندازه‌گیری شده میوه گیاهان پیوندی و غیرپیوندی طالبی ساوه

پایه (بریکس)	مواد جامد محلول (میلی‌متر)	قطر حفره بذر (میلی‌متر)	سفتی میوه بر سانتی‌مترمربع	ماده خشک میوه (درصد)	ضخامت گوشت (سانتی‌متر)	
۵/۰۰ ^{ab}	۱۱/۱۳ ^a	۱۶/۲۶ ^a	۴/۸۰ ^a	۴/۵۶ ^a	Ace	
۶/۱۳ ^a	۱۰/۴۶ ^a	۱۳/۳۰ ^a	۴/۲۳ ^a	۳/۷۰ ^{ab}	Shintozwa	
۳/۶۶ ^b	۱۰/۳۳ ^a	۱۴/۱۶ ^a	۴/۴۳ ^a	۳/۱۶ ^b	Zuktozwa	
۴/۶۶ ^{ab}	۹/۳۳ ^a	۱۰/۴۶ ^a	۵/۳۳ ^a	۳/۸۰ ^a	غیرپیوندی	

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون، تفاوت معنی‌داری براساس آزمون دانکن در سطح پنج درصد ندارند.

بادنجان متشر کرده‌اند (۱۰). در مطالعه حاضر بیشترین عملکرد بازارپستند تک بوته (۱۰/۸۵ کیلوگرم) به گیاهان توده سمسوری پیوند شده روی پایه Shintozwa اختصاص داشت. به عبارت دیگر گیاهان طالبی سمسوری پیوند شده روی پایه Shintozwa بیش از دو برابر افزایش عملکرد نسبت به گیاهان غیرپیوندی به ثبت رسانندند. این افزایش عملکرد مرتبط با افزایش در تعداد میوه و تعداد میوه بازار پسند بود. در پژوهشی گزارش شده که عملکرد و وزن میوه هندوانه پیوندی روی پایه Shintozwa بالاتر از پایه‌های دیگر بود (۲۵). صالحی و همکاران (۱۷) یک افزایش عملکرد ۲/۵ برابری را در گیاهان پیوندی خربزه خاتونی گزارش نمودند که دلیل آن را اندازه بزرگ میوه و افزایش تعداد میوه در گیاهان پیوندی ذکر کردند. اکثر پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تغییرات ناشی از پیوند توسط پایه

بحث

استفاده از تکنیک پیوند در برخی از سبزی‌های میوه‌ای، افزایش عملکرد چشمگیری را نسبت به گیاهان غیرپیوندی باعث می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهند گیاهان پیوندی خربزه‌های شرقی در مقایسه با گیاهان غیرپیوندی، ۵۵ تا ۵۵ درصد عملکرد میوه را افزایش می‌دهند. بقای خوب رشد گیاه تا پایان فصل رشد همراه با تحمل بیماری‌ها در گیاهان پیوندی، علت اصلی این افزایش عملکرد ذکر شده است (۱۲). نتایج مشابهی با پیوند گوجه‌فرنگی روی پایه‌های Kagemusia و Helper با افزایش عملکردی افزون بر ۵۴ و ۵۱ درصد، گزارش شده است (۲). هم‌چنین تعداد میوه‌های بدشکل در گیاهان پیوندی به‌طور معنی‌داری کمتر از گیاهان غیرپیوندی بود. پژوهشگران مختلف گزارش‌های مشابهی روی هندوانه، خیار، خربزه، فلفل و

نسبت به مواد جامد محلول میوه از مقدار کمتری برخوردار بود، که در مورد گیاه غیرپیوندی توده سمسوری این نسبت بر عکس بود. در مورد توده طالبی ساوه نیز درصد ماده خشک میوه در پایه Ace و Shintozwa نسبت به مواد جامد محلول کمتر بود که این مسئله در مورد پایه Zuktozwa و گیاهان غیرپیوندی صادق نبود. طبق گزارش صالحی و همکاران نیز همبستگی مستقیم بین درصد ماده خشک میوه و مواد جامد محلول در خربزه وجود ندارد و چه بسا در اکثر موارد میزان مواد جامد محلول میوه خربزه از درصد ماده خشک میوه بالاتر بودند (۲۸). در مورد مواد جامد محلول برخلاف اکثر گزارش‌ها، میوه گیاهان پیوندی به خصوص توده سمسوری شیرین‌تر از میوه‌های غیرپیوندی بود. بنا به نظر پژوهشگران، تغییرات در کیفیت میوه کدویان پیوندی با توجه به گزارش‌های متناقض در منابع علمی به هر دو عامل پایه و پیوندک مربوط می‌شود (۲۲). طبق گزارش‌ها، پیوند منجر به کاهش یک واحد بریکس در محتوای قند هندوانه و خربزه می‌شود (۱۴، ۲۰، ۲۲). با این حال، در شرایط مطلوب رشد، خربزه خاتونی را نسبت به میوه‌های بازارپسندی خوبی برخوردار بوده و کاهشی در کیفیت میوه مشاهده نمی‌شود (۶، ۱۳). در گزارشی صالحی و همکاران (۱۷) نیز کاهش یک واحد بریکس در محتوای مواد جامد محلول میوه‌های پیوندی خربزه خاتونی را نسبت به میوه‌های غیرپیوندی اعلام نمودند. هم‌چنین نشان داده شده است که پایه Shintozwa تأثیری روی غلظت مواد جامد محلول میوه ندارد (۲۷). در صورتی که در مطالعه حاضر افزایش مواد جامد محلول در طالبی‌های پیوندی نسبت به طالبی‌های غیرپیوندی مشاهده شد.

نتیجه‌گیری

طبق یافته‌های تحقیق حاضر، واکنش طالبی سمسوری و ساوه به پیوند روی کدو مثبت ارزیابی شده و استفاده از آن توسط کشاورزان در شرایط مزرعه‌ای پیشنهاد می‌گردد. در این آزمایش میوه توده ساوه پیوند شده روی پایه Ace دارای ضخامت

از طریق جذب، ستز و انتقال آب، مواد معدنی و هورمون‌های گیاهی کترول می‌شوند (۱۱). سیتوکینین‌ها، گروهی از هورمون‌های گیاهی که در ریشه‌ها ستز می‌شوند، به طور قابل توجهی رشد گیاه را در کدوئیان تحت تأثیر قرار می‌دهند. گیاهان دارای سیستم ریشه‌ای قوی، سیتوکینین بیشتری را وارد شیره خام آوند چوبی کرده و منجر به افزایش عملکرد می‌شوند (۸). جذب و انتقال دیگر ریزمندلی‌ها همچون آهن و بر نیز تحت تأثیر پایه قرار می‌گیرند (۱۶). غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، کلسیم و منیزیم در شیره خام آوند چوبی گیاهان پیوندی بیشتر از گیاهان غیرپیوندی می‌باشد. ورود یون‌ها باعث افزایش کارایی تغییر انرژی نور، هدایت CO_2 ، فعالیت واکنش تاریکی و مقدار فتوستز در پیوندک می‌شود (۱۴).

شكل میوه‌ها و رنگ پوست، ضخامت پوست، و غلظت مواد جامد محلول به وسیله پایه مادری تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در خیار، به ویژه خیارهای صادراتی، رنگ خارجی و توسعه شکوفه عوامل مهم کیفیت هستند. حتی اگر این ویژگی‌ها به عنوان خصوصیات ارشی خاص رقم در نظر گرفته شوند، آنها تا حد زیادی توسط پایه تحت تأثیر قرار می‌گیرند (۲۶). هم‌چنین گزارش شده است که pH، قند، اسید و آب می‌تواند از طریق پیوند خوردن و نوع پایه استفاده شده (۳) تحت تأثیر قرار گیرد. به نظر می‌رسد تغییرات در کیفیت میوه گیاهان پیوندی به ویژه ترکیبات عطر و طعم تنها با پایه مرتبط نباشد. با این حال، این امر منجر به گزارش‌های ضد و نقیض در گزارش‌ها شده است. در تحقیق حاضر بافت میوه طالبی توده ساوه پیوند شده روی پایه Ace در مقایسه با گیاهان پیوند نشده، سفت‌تر بود. گزارش شده است که ضخامت پوست هندوانه تا حد زیادی از طریق پیوند زدن تأثیر می‌پذیرد که در گیاهان پیوندی به طور معنی‌داری بالاتر از گیاهان پیوندی ابزارداری آن را بود. افزایش ضخامت پوست گیاهان پیوندی ابزارداری آن را تضمین می‌کند و برای پس از برداشت و جلوگیری از آسیب در طول مدیریت بهتر می‌باشد (۲۶). براساس نتایج تحقیق حاضر، درصد ماده خشک میوه گیاهان توده سمسوری پیوند شده

است. بر این اساس بسیاری از گزارش‌های ضد و نقیضی روی تغییرات در کیفیت میوه به واسطه پیوند زدن وجود دارد. تحقیقات زیادی به خصوص برای خربزه، خیار و هندوانه و طالبی صورت پذیرفته، اما فرآیندهای بیوشیمیایی و مولکولی دخیل همچنان نسبتاً ناشناخته است. علاوه بر این، مطالعات بسیاری روی اثر پیوند در شکل ظاهری، بافت و طعم ترکیباتی مانند قندها و اسیدهای گیاهی محصولات انجام شده است، با این حال دانش ما روی پیوند کدوییان کم است و نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر می‌باشد.

گوشت میوه بالاتر و بافت سفت‌تر و هم‌چنین توده سمسوری روی این پایه دارای ماده خشک بیشتری بودند. در مورد مواد جامد محلول میوه، توده سمسوری پیوند شده در مقایسه با سمسوری‌های غیرپیوندی، شیرین‌ترین میوه‌ها با بریکس بالا را تولید نمودند. در پایه Ace سنگین‌ترین میوه بازارپسند را با پیوندک توده ساوه به دست آمد. بیشترین تعداد میوه کل و تعداد میوه بازارپسند مربوط به توده سمسوری پیوند شده روی پایه Shintozwa میوه بود. درک کامل اثرات پیوند طالبی روی کدو بر کمیت و کیفیت محصول، نیازمند مطالعه عمیق و مستمر

منابع مورد استفاده

1. Ahn, S. J., Y. J. Im, G. C. Chung, B. H. Cho and S. R. Suh. 1999. Physiological response of grafted-cucumber leaves and rootstock roots by low root temperature. *Scientia Horticulturae* 81:397-408.
2. Chung, H. D. and J. M. Lee. 2007. Rootstocks for grafting. pp. 162–167 In: *Horticulture in Korea*. Korean Society for Horticultural Science, Suwon.
3. Davis, A. R., P. Perkins-Veazie, Y. Sakata, S. Lopez-Galarza, J. V. Maroto, S. G. Lee, Y. C. Huh, Z. Sun, A. Miguel, S. R. King, R. Cohen and J. M. Lee. 2008. Cucurbit grafting. *Critical Reviews in Plant Sciences* 27: 50–74
4. Edelstein, M., Y. Burger, C. Horev, A. Porat, A. Meir and R. Cohen. 2004. Assessing the effect of genetic and anatomic variation of *Cucurbita* rootstocks on vigour, survival and yield of grafted melons. *Journal of Horticultural Sciences & Biotechnology* 79: 370-374.
5. FAOSTAT. 2010. <<http://faostat.fao.org/site/340/default.aspx>>.
6. Hoyos, P. 2001. Influence of different rootstocks on the yield and quality of greenhouses grown cucumbers. *Acta Horticulturae* 559: 139-143
7. Kashi, A., R. Salehi and R. Javanpour. 2008. Grafting Technology in Vegetable Crop Production (1th Ed.). Agriculture Education Pub, Karaj (In Farsi)
8. Kato, T. and H. Lou. 1989. Effect of rootstock on the yield, mineral nutrition and hormone level in xylem sap in eggplant. *Journal of Japanese Society of Horticultural Sciences* 58: 345–352.
9. Koutsika-Sotiriou, M. and E. Traka-Mavrona. 2002. The cultivation of grafted melons in Greece, current status and prospects. *Acta Horticulturae* 579: 325-330.
10. Lee, J. M. 1994. Cultivation of grafted vegetables I. Current status, grafting methods and benefits. *HortScience* 29: 235-239.
11. Lee, J. M. and M. Oda. 2003. Grafting of herbaceous vegetable and ornamental crops. *Horticultural Reviews* 28: 127-134.
12. Lee, J. M., C. Kubota, S. J. Tsao, Z. Bie, P. Hoyos Echevarria, L. Morra and M. Oda. 2010. Current status of vegetable grafting: diffusion, grafting techniques, automation. *Scientia Horticulturae* 127: 93–105
13. Miguel, A. 1997. Injerto de hortalizas. Serie Divulgacion Tecnica. Conselleria de Agricultura, Pesca Alimentaci n, Generalitat Valenciana, Valencia 50-52.
14. Miguel, A., J. V. Maroto, San A. Bautista, C. Baixauli, V. Cebolla, B. Pascual, S. Lopez- Galarza and J. L. Guardiola. 2004. The grafting of triploid watermelon is an advantageous alternative to soil fumigation by methyl bromide for control of Fusarium wilt. *Scientia Horticulturae*, 103: 9-17.
15. Proietti, S., Y. Rouphael, G. Colla, M. Cardarelli, M. De Agazio, M. Zacchini, S. Moscatello and A. Battistelli. 2008. Fruit quality of mini-watermelon as affected by grafting and irrigation regimes. *Journal Science Food Agriculture* 88: 1107-1114.
16. Qi, H. Y., T. L. Li, Y. F. Liu and D. Li. 2006. Effects of grafting on photosynthesis characteristics, yield, and sugar content in melon. *Journal of Shenyang Agriculture University* 37: 155-158.
17. Rivero, R. M., J. M. Ruiz and L. Romero. 2003. Role of grafting in horticultural plants under stress conditions. *Food, Agriculture and Environment* 1:70-74.

18. Rivero, R. M., J. M. Ruiz and L. Romero. 2004. Iron metabolism in tomato and watermelon plants: influence of grafting. *Journal of Plant Nutrition* 27: 2221–2234.
19. Sakata, Y., O. Takayoshi and S. Mitsuhiro. 2007. The history and present state of the grafting of cucurbitaceous vegetables in Japan. *Acta Horticulturae* 731: 159-170.
20. Salehi, R. 2009. Physiological Responces of "Khatooni" Melon with Grafting on Different Cucurbit Rootstocks. Ph.D. Thesis, Tehran,Iran University.
21. Salehi, R., A. Kashi, J. M. Lee, M. Babalar, M. Delshad, S. G. Lee and Y. C. Huh. 2010. Leaf gas exchanges and mineral ion concentration in xylem sap of Iranian melon affected by rootstocks and training methods. *HortScience* 45: 766–770.
22. Salehi, R., A. Kashi, S. G. Lee, Y. C. Huh, J. M. Lee, M. Babalar and M. Delshad. 2009. Assessing the survival and growth performance of Iranian melon to grafting onto *Cucurbita* rootstocks. *Korean Journal of Horticultural Science and Technology* 27 (1): 1-6
23. SAS Institute. 2001. SAS/STAT user's guide. Version 9. SAS Institute, Cary, N.C.
24. Soltani, A. 2007. Application SAS in Statistical Analysis. Mashhad University Press. (In Farsi)
25. Wu, Y. F., Y. Chen and Y. J. Zhao. 2006. Effect of pumpkin stocks on growth, development, yield, and quality of grafted muskmelon. *Fujian Journal of Agricultural Sciences* 21: 354-359.
26. Xu, C. Q., T. L. Li, H. Y. Qi and H. Wang. 2005. Effects of grafting on growth and development, yield, and quality of muskmelon. *China Vegetables* 6: 12-14.
27. Xu, C. Q., T. L. Li, H. Y. Qi and M. F. Qi. 2006. Effects of grafting on development and sugar content of muskmelon fruit. *Journal of Shenyang Agriculture University* 37: 378-381.
28. Xu, S. L., Q. Y. Chen, S. H. Li, L. L. Zhang, J. S. Gao and H. L. Wang. 2005. Roles of sugar-metabolizing enzymes and GA₃, ABA in sugars accumulation in grafted muskmelon fruit. *Journal of Fruit Science* 22: 514-518.