

اثر خاک پوش های پلی اتیلنی و تاریخ کاشت بر زودرسی، عملکرد و رشد بامیه

مهرزاد طاوسی^{۱*}، سید محمدهادی موسوی فضل^۲ و علی دهقانی^۳

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۹/۱۹؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۲۸)

چکیده

در این تحقیق تأثیر خاک پوش پلی اتیلنی کف بستر و تاریخ کاشت، به منظور پیش‌رس کردن محصول در زمان اوج قیمت توده بامیه اهوازی (در فروردین ماه) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بررسی شد. آزمایش به صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام و چهار تاریخ کاشت ۲۵ بهمن، ۵، ۱۵ و ۲۵ اسفند ماه به‌عنوان فاکتور اصلی و سه نوع خاک پوش مشکلی، شفاف و شاهد (بدون خاک پوش) به‌عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و خاک پوش در عملکرد و خصوصیات زراعی تفاوت معنی‌دار داشتند. برهم‌کنش تاریخ کاشت و خاک پوش بر عملکرد کل و نوبرانه، تعداد روز از کاشت تا جوانه‌زنی، زودرسی و تعداد چین معنی‌دار بود. خاک پوش طول دوره مراحل مختلف رشد را کاهش داد و موجب افزایش دما در خاک شد به طوری که خاک پوش مشکلی ۲/۶۴، ۱/۵۳، و ۰/۹ درجه سانتی‌گراد به ترتیب دمای عمق ده سانتی‌متری خاک، سطح خاک و کانوپی را نسبت به شاهد افزایش داد. تاریخ کاشت اثر معنی‌داری بر جمعیت علف‌های هرز نداشت، خاک پوش مشکلی به‌طور کامل رشد علف‌های هرز را کنترل نمود. تاریخ کاشت ۲۵ بهمن ماه به‌همراه خاک پوش پلاستیکی شفاف گسترده شده در کف بستر، به‌عنوان تیمار برتر، بالاترین عملکرد کل (۶/۴ تن در هکتار) و نوبرانه (۱/۹ تن در هکتار) میوه بامیه را تولید کرد و دارای طولانی‌ترین دوره رشد (۱۳۵ روز) و میوه‌دهی (۷۰ روز)، و بیشترین تعداد چین (۲۲ نوبت) بود.

واژه‌های کلیدی: بامیه، تاریخ کاشت، خاک پوش پلاستیکی، عملکرد، علف هرز

۱، ۲ و ۳. به ترتیب مربیان پژوهش بخش‌های «تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر»، «تحقیقات خاک و آب» و «تحقیقات گیاه‌پزشکی»، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: tavoosimehr@yahoo.com

مقدمه

بامیه (Okra) با نام علمی *Hibiscus esculentus* گیاهی گرمسیری از خانواده *Malvaceae* است که در نقاط سرد، رشد کندی داشته و محصول کمی تولید می‌کند. این گیاه به رطوبت، هوای خنک و یخبندان مقاومت ندارد. دمای مناسب برای رشد بامیه بین ۲۷ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد (۳۵). موطن اصلی بامیه آفریقای مرکزی، غرب آفریقا و آسیا است. استان خوزستان یکی از مناطق مهم تولید بامیه می‌باشد که در سطح ۱۰۰۰ هکتار کشت می‌شود. میانگین تولید بامیه در خوزستان ۵ تن در هکتار است (۲۳) که از اواسط اسفند تا فروردین کاشته می‌شود و محصول نوبرانه آن از اواخر فروردین در بازار عرضه می‌شود.

آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از آلودگی آب‌های سطحی و زیرسطحی توسط علف‌کش‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه بشر است. از مهم‌ترین روش‌های جایگزین به جای علف‌کش و شخم رایج، کاربرد خاک‌پوش و گیاهان پوششی است (۲۸).

در تاریخ کاشت‌های زودتر، دوره میوه‌دهی طولانی‌تر و عملکرد و اجزاء عملکرد (تعداد میوه در بوته، وزن یک میوه، طول و قطر میوه، طول دوره برداشت) بیشتری تولید می‌شود (۱۷).

بررسی‌های متعددی در زمینه اثرات انواع مختلف خاک‌پوش بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد، زودرسی، تغذیه، سیستم‌های آبیاری، کنترل علف‌های هرز، کاهش مصرف شن، حفظ رطوبت و حاصلخیزی خاک، نوسانات دما، کاهش تعداد ساعت کار در مرحله داشت در محصولات: طالبی (۱، ۹، ۱۸ و ۱۹)، گرمک (۸)، خیار (۷، ۲۱، ۲۹ و ۳۴)، هندوانه (۱۵ و ۲۰)، گوجه‌فرنگی (۳۷) و سایر محصولات انجام شده است که همگی بر مزایای بسیار زیاد خاک‌پوش‌ها تأکید داشته‌اند، خاک‌پوش پلی‌اتیلنی موجب پیش‌رسی و افزایش قابل توجه عملکرد (۷)، امکان کاشت زود هنگام، تسریع در جوانه‌زنی و گل‌دهی (۴)، کاهش تعداد دفعات آبیاری، جلوگیری از تبخیر

سطحی رطوبت، افزایش راندمان مصرف آب، کاهش مصرف آب آبیاری (۸)، کنترل علف‌های هرز و پاتوژن‌های خاک (۱۴)، جلوگیری از سله بستن، افزایش دمای خاک و کنترل جمعیت حشرات (۱۲)، کاهش تنش‌های رطوبتی و تجمع نمک در سطح خاک، تماس نداشتن میوه‌ها با خاک مرطوب (۵)، کاهش آب‌شویی کودها (۲۴)، آفتاب‌دهی خاک (Solarization) (۱۳) گردید. پیتر و جانسون (۲۷) کاهش ۵۰٪ تبخیر آب از سطح خاک با پوشش خاک‌پوش پلاستیکی در بادام زمینی را گزارش کردند.

مزایای استفاده از خاک‌پوش‌های پلی‌اتیلنی در زراعت بامیه نیز مانند سایر محصولات قابل ملاحظه بود (۱۱). در زراعت بامیه خاک‌پوش پلاستیکی شفاف در بالا بردن دمای خاک بسیار مؤثر بود (نه به اندازه خاک‌پوش مشکی) اما علف‌های هرز را کنترل نکرد (۲۶). ساندرز (۳۲) افزایش درآمد حاصل از قیمت بالای محصول زودرس را گزارش کرد. عملکرد کل و تعداد میوه بامیه با استفاده از خاک‌پوش مشکی دو برابر (۲۲) و به همراه آبیاری قطره‌ای ۷۲ درصد افزایش داشت (۳۶).

هر نوع خاک‌پوشی دارای معایب و مزایایی است که باید با در نظر گرفتن شرایط هر منطقه و نیز نیازهای زراعی و اکولوژیک هر محصول انتخاب گردد. هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر خاک‌پوش‌های متفاوت و تاریخ کاشت بر روی صفات زودرسی، عملکرد و اجزاء عملکرد و مدیریت علف‌های هرز در کشت بامیه بود.

مواد و روش‌ها

آزمایش به صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار، شامل چهار تاریخ کاشت ۲۵ بهمن، ۵، ۱۵ و ۲۵ اسفند ماه به‌عنوان عامل اصلی و خاک‌پوش مشکی، شفاف و شاهد به‌عنوان عامل فرعی طی دو سال زراعی ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (طول و عرض جغرافیایی ۴۸ درجه و ۴۱ دقیقه شرقی و ۳۱ درجه و ۱۸ دقیقه شمالی) اجرا شد. ۲۵

جدول ۱. نتایج آزمون خاک مزرعه قبل از کاشت

EC (dS/m)	PH	OC (%)	P (ppm)	K (ppm)	Fe (ppm)	Zn (ppm)	Cu (ppm)	Mn (ppm)
۳/۷	۷/۴	۰/۷۵	۲۰/۱	۲۶۶	۸/۹	۱/۱۰	۱/۲۳	۶/۲۸

تعداد روز از کاشت تا جوانه‌زنی، زمان شروع برداشت، تعداد چین، طول دوره رشد و میوه‌دهی تبدیل لگاریتمی شدند، درصد استقرار بوته‌ها تبدیل آرک‌سینوس شد) اعمال شد. در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MSTATC تجزیه واریانس و با استفاده از آزمون دانکن مقایسه میانگین و کلاس‌بندی شدند.

نتایج و بحث

اثر خاک‌پوش و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان می‌دهد که اثر تاریخ کاشت، خاک‌پوش و برهمکنش آنها بر «عملکرد کل و نوبرانه، تعداد روز از کاشت تا جوانه‌زنی، زودرسی، و تعداد چین» معنی‌دار بود (جدول ۲). در تاریخ کاشت ۲۵ بهمن ماه، عملکرد کل ۸۶٪ نسبت به تاریخ کاشت ۲۵ اسفند و عملکرد نوبرانه به ترتیب ۸۶ و ۱۶۲٪ نسبت به تاریخ کاشت‌های ۵، ۱۵ و ۲۵ اسفند افزایش یافت (جدول ۴). عملکرد و صفات مرتبط با آن در خاک‌پوش پلاستیکی شفاف به وضوح برتری داشت (جدول ۴ و ۵). عملکرد کل خاک‌پوش شفاف به ترتیب ۶۷ و ۵۲۹ درصد نسبت به خاک‌پوش مشکی و بدون خاک‌پوش افزایش نشان داد. عملکرد محصول پیش‌رس (نوبرانه) خاک‌پوش شفاف به ترتیب ۸۴ و ۴۷۶ درصد نسبت به خاک‌پوش مشکی و بدون خاک‌پوش افزایش نشان داد (جدول ۴) که با گزارشات سلیمانی‌پور و همکاران (۳۴) مبنی بر افزایش عملکرد، پیش‌رس کردن محصول، افزایش سطح سبز مزرعه، و نیز نتایج جوردن و همکاران (۱۱)، ساندرز (۳۲)، رضانی و همکاران (۲۹)، لاریوتیس و همکاران (۲۱)، گابریل و همکاران (۹) مطابقت دارد ولی با نتایج تیواری و همکاران (۳۶) مبنی بر برتری خاک‌پوش مشکی مغایرت دارد. مقایسه

بهمن و ۵ اسفند به‌عنوان تاریخ کاشت زود هنگام، ۱۵ و ۲۵ اسفند ماه به‌عنوان کشت معمول در نظر گرفته شد. براساس آزمون خاک (جدول ۱)، مقدار ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم به ترتیب ازت و پتاس خالص استفاده شد. کود ازت در سه نوبت قبل از کاشت، ۱۵ سانتی متری ارتفاع گیاه و اواسط برداشت به‌طور مساوی تقسیم شد. هر کرت آزمایشی شامل چهار ردیف کاشت پنج متری بر روی دو پشته به عرض یک متر بود. قبل از کاشت در تاریخ‌های مشخص، بر روی بستر کاشت (کف جوی و تا نصفه‌های پشته) خاک‌پوش‌ها گسترده شدند و کشت بذور توده بومی بامیه اهوازی با برش پلاستیک‌ها در محل کاشت انجام گردید. از پلاستیک‌های با ضخامت ۹ میکرونی و عرض ۱۵۰ سانتی متر به‌عنوان خاک‌پوش استفاده شد. کشت مستقیم بذر و آبیاری به‌صورت جوی و پشته و فاصله بوته‌ها در روی ردیف ۴۰ سانتی متر بود. در تیمار شاهد کشت معمول و بدون خاک‌پوش بود. یادداشت برداری صفاتی هم‌چون جوانه‌زنی (روز پس از کاشت)، درصد استقرار بوته‌ها (نسبت بوته‌های استقرار یافته به تعداد کشت شده در هر کرت آزمایشی)، عملکرد کل (مجموع محصول برداشت شده در چین‌های مختلف بر حسب کیلوگرم در هکتار)، عملکرد نوبرانه (مجموع محصول برداشت شده تا آخر اردیبهشت ماه)، دوره رشد (روز)، تعداد چین، طول دوره محصول‌دهی، ارتفاع گیاه (اندازه‌گیری در دو مقطع زمانی اولین و آخرین برداشت بر حسب سانتی متر)، انجام گردید. آفت مینوز *Liriomyza trifolii* مشاهده شده در فروردین ماه با دیازینون دو در هزار کنترل گردید. سایر آفات از قبیل *Oxycarenus hyalipennis*، *Earias insulana* با جمعیت کم مشاهده شد که نیاز به مبارزه نداشت.

برخی از داده‌ها برای آنالیزهای آماری به‌لحاظ ماهیت نیاز به تبدیل داده داشتند، که بر اساس توصیه‌های گومز و گومز (۱۰)

جدول ۲. خلاصه نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی

دما در عمق خاک	دما سطح خاک	دمای کانوپی	عملکرد نوبرانه	عملکرد میوه	عملکرد استقرار بونه	تعداد چین	ارتفاع در آخرین برداشت	ارتفاع در برداشت اولیه	طول دوره میوه‌دهی	زمان برداشت	تعداد روز از کاشت تا ۵۰٪ جوانه‌زنی	درجه آزادی	منابع تغییرات
۹/۳۲۵	۵۰/۴۷۵	۷۲۰/۵۱۰	۲۱۵۱۰/۴۶۵۱	۱۹۶۶۵۱۶۷/۳۳۷	۳۳۶/۰۵۶	۰/۱۵۴	۱۲۵۴۲/۳۳۸	۳۶۱/۳۶۷	۰/۰۰۱	۰/۰۴۸	۰/۰۷۳	۱	سال
۱/۳۳۹	۴۲/۸۴۹	۳۵۳/۸۷	۱۶۵۹۰/۶۸۸۷	۲۹۸۱۱۷۸/۰۱۱	۱۲۶/۰۷۴	۰/۰۱۳	۲۹۲/۸۶۰	۶۰/۶۴۱	۰/۰۳۰	۰/۰۰۱	۰/۰۰۹	۶	خطا
۰/۶۱۷ ^{n.s}	۱/۸۳۳ ^{n.s}	۱/۳۵۸ ^{n.s}	۳۶۳۳۲۲۳/۱۹۴**	۱۲۴۲۶۶۱۰/۶۴**	۳۵۳۳۹ ^{n.s}	۰/۱۰۴**	۲۶۰/۵۷۱ ^{n.s}	۱۴۷/۵۴ ^{n.s}	۰/۱۷۳**	۰/۰۶۲**	۰/۱۳۹**	۳	تاریخ کاشت
۰/۰۷۷	۲/۶۳۸	۱/۰۹۲	۴۹۰۹۲۷/۲۳۳	۱۹۵۰۱۵۲/۸۰۶	۲۵۷/۵۲۵	۰/۰۴۷	۵۱/۵۲۹	۳۱/۸۲۲	۰/۰۵۹	۰/۰۰۷	۰/۱۴۶	۳	اثر متقابل سال × تاریخ کاشت
۰/۵۸۱	۲/۹۰۵	۳/۹۸۲	۹۸۸۰۸۹۲۱	۱۳۶۱۴۹۶/۲۳۶	۸۱/۵۰۲	۰/۰۰۸	۱۸۴/۷۶۰	۳۳۷/۴۰	۰/۰۲۴	۰/۰۰۱	۰/۰۰۷	۱۸	خطا
۰/۵۹۷۰۳**	۱/۰۰۳**	۷/۶۷۶**	۵۸۷۲۳۰/۸۰۱**	۱۴۵۵۷۳۵۴۹/۶۰۴**	۳۳۴/۵۰۸**	۰/۳۸۴**	۹۳۵۱/۲۳۳**	۱۳۳۵/۲۱۳**	۰/۲۲۰**	۰/۰۶۴**	۱/۵۰۳**	۲	شاک‌پوش
۰/۳۹۶	۳/۴۶۵	۰/۲۰۴	۱۴۶۵۳۷/۴۳۳	۷۴۹۳۷۳۵/۳۲۴	۸۲۰/۳۳۷	۰/۰۰۰	۹۶۱/۵۲۵	۹۹/۳۵۹	۰/۰۱۲	۰/۰۰۰	۰/۱۳۲	۲	اثر متقابل سال × شاک‌پوش
۰/۵۳۳ ^{n.s}	۱/۲۰۹ ^{n.s}	۰/۷۹۰ ^{n.s}	۶۶۰۹۸۷/۱۴۶**	۵۵۳۳۵۳۳/۸۲۴**	۱۸۰/۲۷۵ ^{n.s}	۰/۰۱۶*	۱۰۱/۷۶۱ ^{n.s}	۲۲/۸۷۸ ^{n.s}	۰/۰۴۳ ^{n.s}	۰/۰۰۳**	۰/۰۲۳**	۶	اثر متقابل تاریخ کاشت × شاک‌پوش
۰/۶۱۲	۱/۸۲۸	۲/۴۹۱	۲۱۷۳۳۷/۸۹۳	۱۳۴۹۸۸/۸۵۲	۲۷۸/۹۵۳	۰/۰۱۷	۱۳۸/۴۹۰	۶۳/۵۱۹	۰/۰۴۵	۰/۰۰۲	۰/۰۱۵	۶	اثر متقابل سال × تاریخ کاشت
۰/۴۰۵	۲/۸۹۴	۱/۳۰۴	۷۶۱۱۰/۳۳۵	۸۸۱۱۱۰/۶۴۷	۱۳۶/۲۴۱	۰/۰۰۷	۹۶۳/۰۲	۲۲/۳۳۴	۰/۰۲۷	۰/۰۰۱	۰/۰۰۴	۴۸	خطا
۲/۱۹	۴/۷۶	۳/۶۱۵	۴۶۷/۵۳	۳۱/۶۰	۱۸۷/۸	۶/۹۸	۱۴/۶۹	۱۴/۹۲	۹/۴۶	۱/۴۷	۷/۰		ضریب تغییرات (%)

n.s: نبود اختلاف معنی‌دار * و **: وجود اختلاف معنی‌دار در سطح ۵ و یک درصد

جدول ۳. مقایسات میانگین ارتفاع بوته در اولین و آخرین برداشت و تعداد روز از کاشت تا ۵۰٪ جوانه‌زنی بوته‌ها در اثر متقابل تاریخ کاشت و خاک‌پوش

تاریخ کاشت	ارتفاع در اولین برداشت			ارتفاع در آخرین برداشت			۵۰٪ جوانه‌زنی (روز پس از کاشت)		
	ب.ب.	ب.ب.ب.	ب.ب.ب.ب.	ب.ب.	ب.ب.ب.	ب.ب.ب.ب.	ب.ب.	ب.ب.ب.	ب.ب.ب.ب.
۲۵ بهمن	۲۳/۲۰ ^c	۳۷/۰۳ ^{ab}	۳۳/۱۷ ^b	۵۰/۸۷ ^d	۷۸/۸۰ ^a	۷۶/۸۵ ^{bc}	۱۷/۰۶ ^a	۶/۲۹ ^{fg}	۷/۱۶ ^{ef}
۵ اسفند	۲۳/۸۱ ^c	۳۵/۳۸ ^{ab}	۳۳/۳۵ ^b	۴۸/۸۱ ^d	۸۵/۶۱ ^{ab}	۷۸/۶۵ ^{abc}	۱۴/۴۸ ^b	۷/۴۱ ^e	۹/۲۴ ^d
۱۵ اسفند	۲۳/۸۵ ^c	۳۵/۴۱ ^{ab}	۳۶/۱۳ ^{ab}	۴۸/۶۰ ^d	۷۲/۲۲ ^c	۷۴/۳۸ ^c	۱۱/۸۸ ^c	۴/۴۹ ^h	۵/۸۲ ^g
۲۵ اسفند	۲۶/۸۶ ^c	۳۸/۸۵ ^a	۳۲/۵۲ ^b	۴۸/۱۱ ^d	۷۷/۴ ^{abc}	۷۴/۴۰ ^c	۱۵/۴۱ ^{ab}	۴/۸۸ ^h	۵/۹۲ ^g

حروف غیر مشابه در هر ستون نشان‌دهنده اختلاف در سطح احتمال پنج درصد به روش دانکن است.

و در اسفند ماه ۲۴ و ۱۲ درجه سانتی‌گراد است. مقایسه میانگین برهمکنش تاریخ کاشت و خاک‌پوش (جدول ۳) نشان می‌دهد که تعداد روز از کاشت تا جوانه‌زنی بذور در تیمار خاک‌پوش شفاف در تاریخ کاشت ۱۵ اسفند ماه با مدت زمان ۴/۴۹ روز زودتر از سایر تیمارها اتفاق افتاد. آیری‌میرن و اکی (۱۷) نیز نتایج مشابهی را گزارش کرده‌اند.

دوره رشد رویشی در تاریخ کاشت زود هنگام ۲۵ بهمن، یازده روز بیشتر بود (جدول ۴) بنابراین گیاه برای شروع رشد زایشی نسبت به گیاهی که دوره رشد رویشی کمتر داشت، از بنیه بهتری برخوردار بود، هم‌چنین یک ماه کشت زودتر سبب ۲۰ روز زودرس شدن محصول شد (جدول ۴). این در حالی است که همواره در اوایل اردیبهشت ماه قیمت بامیه نوبرانه در بازار به‌طور متوسط چهاربرابر میزان آن در پایان اردیبهشت بود. مقایسه میانگین برهمکنش تاریخ کاشت و خاک‌پوش (جدول ۴ و ۵) نشان می‌دهد که بیشترین و کمترین طول دوره رشد (رویشی + زایشی) به ترتیب در تیمار خاک‌پوش شفاف در تاریخ کاشت ۲۵ بهمن ماه با ۱۳۵ روز و تیمار بدون خاک‌پوش در تاریخ کاشت ۲۵ اسفند ماه با ۹۴ روز بود. طول دوره میوه‌دهی و تعداد چین در سه تاریخ کاشت اول به ترتیب از ۱۴ تا ۲۳ روز و ۴ تا ۶ نوبت بیشتر بود که با توجه به کشت و

میانگین برهمکنش تاریخ کاشت و خاک‌پوش (جدول ۳) نشان می‌دهد که خاک‌پوش شفاف در تاریخ کاشت ۲۵ بهمن ماه با ۶/۴۷۳ تن در هکتار، بیشترین عملکرد را دارا بود و کمترین عملکرد (۰/۶۵۳ تن در هکتار) در تیمار بدون خاک‌پوش در آخرین تاریخ کاشت (۲۵ اسفند) به‌دست آمد. این روند در مورد عملکرد نوبرانه (جدول ۴) نیز مشاهده شد. برهمکنش اثر تاریخ کاشت و خاک‌پوش بر اجزاء عملکرد معنی‌دار بود. تیمارهای بدون خاک‌پوش در کلیه تاریخ کشت‌ها عملکرد کمتری داشتند اما در خاک‌پوش شفاف افزایش عملکرد در دو تاریخ کاشت اول اثر افزایش بیشتری نشان داد. آیری‌میرن و اکی (۱۷) و دانشگاه ایالتی اورگون (۲۶) نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند.

کاشت تا ۵۰٪ جوانه‌زنی (تعداد روز از کاشت) در تاریخ کاشت زود هنگام ۲۵ بهمن، ۲ روز بیشتر از تاریخ کاشت‌های معمول بود اما یک ماه کشت زودتر، جبران این تفاوت را نمود به‌صورتی که در زمان استقرار گیاهان در تاریخ کاشت مذکور، هنوز کشت‌های بعدی انجام نشده بود. دلیل طولانی‌تر شدن استقرار و رشد اولیه در ۲۵ بهمن ماه، پایین بودن دمای محیط و میکروکلیمای ریشه در زمان مذکور بود، در شرایط آب و هوایی اهواز، حداکثر و حداقل دمای هوا در بهمن ماه به ترتیب ۱۹ و ۸

جدول ۴. مقایسات میانگین عملکرد کل و نوبرانه میوه بامیه و زودرسی در اثر متقابل تاریخ کاشت و خاک پوش

تاریخ کاشت	عملکرد (kg/ha)			عملکرد نوبرانه			زمان شروع برداشت (دوره رشد رویشی)		
	بدون	تفاله	کامپوست	بدون	تفاله	کامپوست	بدون	تفاله	کامپوست
۲۵ بهمن	۷۹۸/۰۴ ^e	۶۴۷۳/۵۹۵ ^a	۳۸۳۰/۳۰۳ ^{bc}	۳۹۱/۱۷۳ ^{cd}	۱۹۵۹/۸۵۵ ^a	۱۰۲۰/۴۵۷ ^b	۶۶/۰۶ ^{cd}	۶۵/۱۶ ^d	۷۶/۵۵ ^a
۵ اسفند	۶۸۶/۷۲۸ ^e	۶۱۶۹/۸۹۱ ^a	۲۸۱۸/۹۳۹ ^{cd}	۱۴۳/۵۶۹ ^{de}	۱۱۵۹/۲۸۷ ^b	۵۱۴/۶۴۹ ^c	۶۵/۶۱ ^{cd}	۶۱/۸۰ ^e	۷۴/۱۳ ^{ab}
۱۵ اسفند	۱۰۸۸/۷۳۵ ^e	۴۴۰۰/۸۳۲ ^b	۳۴۰۳/۵۷۴ ^c	۱۶۷/۰۲ ^{de}	۵۸۹/۶۲۳ ^c	۵۲۹/۰۱۶ ^c	۵۹/۸۴ ^e	۵۷/۸۰ ^f	۶۶/۲۱ ^{cd}
۲۵ اسفند	۶۵۳/۱۴۷ ^e	۳۲۳۹/۶۰۸ ^c	۲۰۸۶/۵۴۹ ^d	۱۷/۲۱۲ ^e	۴۳۵/۳۶۴ ^{cd}	۱۸۸/۳۳۲ ^{de}	۵۴/۵۷ ^{de}	۵۲/۶۰ ^g	۷۰/۷۹ ^{bc}

در هر صفت حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف بین تیمارها در سطح احتمال پنج درصد به روش دانکن است.

جدول ۵. مقایسات میانگین استقرار موفقیت آمیز گیاه و تعداد برداشت و طول دوره میوه دهی در اثر متقابل تاریخ کاشت و خاک پوش

تاریخ کاشت	استقرار موفقیت آمیز گیاه			تعداد برداشت			طول دوره میوه دهی		
	بدون	تفاله	کامپوست	بدون	تفاله	کامپوست	بدون	تفاله	کامپوست
۲۵ بهمن	۴۶/۶۷ ^f	۷۴/۶ ^a	۶۳/۵ ^{a,d}	۲۲/۳ ^a	۲۲/۰ ^a	۱۲/۹ ^e	۶۹/۱۸ ^a	۷۰/۷۹ ^a	۵۴/۸۲ ^a
۵ اسفند	۵۶/۰ ^{ef}	۸۷/۲ ^{abc}	۷۸/۶۴ ^{a,d}	۱۹/۱ ^{abc}	۲۰/۳ ^{ab}	۱۳/۸ ^{de}	۶۰/۳۹ ^a	۶۴/۱۲ ^a	۵۲/۷۳ ^a
۱۵ اسفند	۷۰/۳ ^{cde}	۸۴/۸ ^{abc}	۷۵/۱ ^{b,e}	۱۷/۸ ^{abc}	۱۸/۸ ^{abc}	۱۴/۱ ^{de}	۵۶/۸۸ ^a	۵۶/۸۸ ^a	۵۰/۶۹ ^a
۲۵ اسفند	۶۲/۳ ^{def}	۸۹/۲ ^{ab}	۸۲/۴ ^{abc}	۱۵/۵ ^{cde}	۱۶/۸ ^{bcd}	۸/۰ ^f	۵۱/۸۸ ^a	۵۴/۲۰ ^a	۲۴/۷۱ ^b

در هر صفت حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف بین تیمارها در سطح احتمال پنج درصد به روش دانکن است.

در اولین و آخرین برداشت نشان می دهد که خاک پوش شفاف به ترتیب ۱۲ و ۳۱ سانتی متر بیشتر از بدون خاک پوش بود (جدول ۳).

یافته های مربوط به برتری خاک پوش با نتایج پژوهش های فرهادی (۷) و گابریل و دیگران (۹) و اینکالکاترا و وترانو (۱۶) و ترابی و دیگران (۳۷) هم خوانی دارد.

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر خاک پوش بر دماهای اندازه گیری شده کانوپی، سطح خاک و عمق ده سانتی متری خاک در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود (جدول ۲). مقایسه میانگین نشان دهنده افزایش دما در خاک پوش مشکلی بود، به طوری که خاک پوش مشکلی ۲/۶۴، ۱/۵۳ و ۰/۹ درجه سانتی گراد به ترتیب دمای عمق ده سانتی متری خاک، سطح خاک و کانوپی را نسبت به شاهد

شروع برداشت زودتر و طولانی تر شدن طول دوره رشد، کاملاً منطقی به نظر می رسد (جدول ۵). مقایسه میانگین برهمکنش تاریخ کاشت و خاک پوش نشان می دهد که خاک پوش شفاف در تاریخ کاشت ۲۵ بهمن ماه با ۷۰ روز میوه دهی و ۲۲ چین به ترتیب بیشترین طول دوره میوه دهی (دوره رشد زایشی) و تعداد چین را دارا بوده و کمترین طول دوره میوه دهی (۲۴ روز) و تعداد چین (۸ نوبت) مربوط به تیمار بدون خاک پوش در آخرین تاریخ کاشت (۲۵ اسفند) بود (جدول ۵). نتایج آیری میرن و اکی (۱۷) نیز مؤید این موضوع می باشد.

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان می دهد که فقط اثر خاک پوش بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود (جدول ۲). مقایسه میانگین خاک پوش ها بر ارتفاع

جدول ۶. مقایسات میانگین دمای کانوپی و سطح و عمق خاک در اثر متقابل تاریخ کاشت و خاک پوش

تاریخ کاشت	دمای کانوپی			دمای سطح خاک			دمای عمق ۱۰ سانتی متری خاک		
	بدون خاک پوش	خاک پوش شفاف	خاک پوش مشکی	بدون خاک پوش	خاک پوش شفاف	خاک پوش مشکی	بدون خاک پوش	خاک پوش شفاف	خاک پوش مشکی
۲۵ بهمن	۳۱/۹۹ ^a	۳۱/۱۲ ^{ab}	۳۱/۵۹ ^{ab}	۳۲/۱۵ ^a	۳۱/۳۱ ^{abc}	۳۰/۹۲ ^{abc}	۳۰/۰۱ ^{ab}	۲۹/۷۸ ^{bcd}	۲۷/۲۶ ^e
۵ اسفند	۳۱/۸۲ ^a	۳۱/۳۴ ^{ab}	۳۰/۹۲ ^{ab}	۳۱/۸۲ ^{ab}	۳۱/۰۵ ^{abc}	۳۰/۷۴ ^{abc}	۳۰/۱۴ ^{ab}	۲۹/۱۳ ^d	۲۷/۷۵ ^e
۱۵ اسفند	۳۲/۰۰ ^a	۳۰/۸۲ ^{ab}	۳۰/۷۵ ^{ab}	۳۲/۲۹ ^a	۲۹/۹۰ ^c	۳۰/۲۸ ^{bc}	۲۹/۹۱ ^{abc}	۲۹/۲۲ ^{cd}	۲۷/۴۲ ^e
۲۵ اسفند	۳۱/۵۴ ^{ab}	۳۱/۰۹ ^{ab}	۳۰/۴۰ ^b	۳۲/۱۹ ^a	۳۰/۵۷ ^{abc}	۳۰/۴۰ ^{bc}	۳۰/۵۲ ^a	۲۹/۶۱ ^{bcd}	۲۷/۵۹ ^e

در هر صفت حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف در سطح احتمال پنج درصد به روش دانکن است.

جدول ۷. خلاصه نتایج تجزیه واریانس جمعیت علف های هرز

منابع تغییرات	درجه آزادی	میانگین مربعات
تکرار	۳	۴۸/۵۶۸ ^{**}
تاریخ کاشت	۳	۱۲/۳۹۴ ^{ns}
خطا	۹	۳/۶۶۰
خاک پوش	۲	۷۱۱/۷۰۹ ^{**}
تاریخ کاشت × خاک پوش	۶	۵/۴۶۴ ^{ns}
خطا	۲۴	۱۲/۴۸۳

n.s: نبود اختلاف معنی دار، * و **: وجود اختلاف معنی دار در سطح ۵ و یک درصد

افزایش داد (جدول ۶) که با گزارشات دانشگاه ایالتی اورگون (۲۶) مطابقت دارد. گرچه دمای کانوپی و سطح خاک در خاک پوش شفاف نسبت به بدون خاک پوش از نظر آماری اختلاف معنی دار نداشت اما دمای عمق ده سانتی متری خاک در خاک پوش شفاف نمایانگر اثر افزایشی این پوشش در دمای عمق خاک بود. اثر افزایش دمای در تیمارهای خاک پوش دار با نتایج اُ اس یو (۲۶)، نف (۲۵) و سلیمانی پور و دیگران (۳۴) هم خوانی دارد. به طور کلی در شرایط آب و هوایی خوزستان تاریخ کاشت ۲۵ بهمن به همراه خاک پوش پلاستیکی شفاف بهترین گزینه برای تولید بامیه بود، عملکرد کل و نوبرانه بیشتری تولید نمود، که این مطلب با نتایج نف (۲۵) کاملاً تطابق دارد.

سرعت رشد و بالطبع زودرسی را افزایش داد و مراحل جوانه زنی، رشد، استقرار و میوه دهی در مدت زمان کوتاه تری طی شد. عملکرد بالاتر و پیش رسی محصول در زراعت بامیه با استفاده از خاک پوش شفاف به علت نوبرانه بودن با قیمت بالاتر به فروش می رسد و درآمد بیشتری را عاید کشاورزان می کند. این موضوع با نتایج ساندرز (۳۲) و لاریوسیس و دیگران (۲۱) مطابقت دارد. فصل زراعی بامیه در خوزستان، به گرمای شدید تابستان برخورد می کند، لذا علی رغم تأیید برتری خاک پوش مشکی و رنگی در مقالات جوردن و دیگران (۱۱) و مام کاق (۲۲)، خاک پوش شفاف برای این منطقه مناسب تر است که این مطلب با نتایج نف (۲۵) کاملاً تطابق دارد.

جدول ۸. مقایسات میانگین جمعیت علف‌های هرز

جمعیت علف‌های هرز				تاریخ کاشت
میانگین	بدون خاک‌پوش	خاک‌پوش شفاف	خاک‌پوش مشکی	
۸/۰۰۲ ^a	۱۵/۲۸ ^a	۵/۴۵ ^{cd}	۱/۶۲۵ ^d	۲۵ بهمن
۸/۸۴۵ ^a	۱۵/۱۰ ^a	۸/۵۲۵ ^{bc}	۱/۸۵۰ ^d	۵ اسفند
۷/۰۳۸ ^a	۱۵/۴۰ ^a	۴/۵۵۰ ^{cd}	۱/۲۲۵ ^d	۱۵ اسفند
۵/۶۱۲ ^a	۱۲/۵۲ ^{ab}	۴/۲۰۰ ^{cd}	۱/۳۷۵ ^d	۲۵ اسفند
	۱۴/۵۷ ^a	۵/۶۸۱ ^b	۱/۵۱۹ ^c	میانگین

حروف غیر مشابه در هر ستون نشان‌دهنده اختلاف بین تیمارها در سطح پنج درصد است

آن در جدول ۷ و ۸ آمده است.

بررسی علف‌های هرز

فاکتور تاریخ کاشت اثر معنی‌داری روی جمعیت علف هرز نداشت (جدول ۷)، اما فاکتور خاک‌پوش بسیار معنی‌دار بود. خاک‌پوش یا پوشش پلاستیکی پلی‌اتیلنی تیره بیشترین تأثیر را در کنترل علف هرز داشت (جدول ۸) و این نوع خاک‌پوش در همه تاریخ کاشت‌ها در یک گروه آماری قرار دارد که کمترین جمعیت علف هرز را داشت. کاهش تعداد وجین در تیمارهای خاک‌پوش‌دار با نتایج فرهادی و اکبری (۸)، اُاس یو (۲۶) و سلیمانی‌پور و دیگران (۳۴) مطابقت دارد. لذا می‌توان خاک‌پوش را از مهم‌ترین روش‌های جایگزین برای علف‌کش در نظر گرفت.

انواع علف هرز مشاهده شده در مزرعه تحقیقاتی بامیه شامل: اویارسلام (*Cyperus difformis*)، پیچک (*Convolvulus arvensis*)، پنیرک (*Malva rotundifolia*)، چغندر وحشی (*Beta maritima*)، سلمه (*Chenopodium album*)، کنگر وحشی (*Silbum marianum*)، یونجه زرد صحرایی (*Medicago officinalis*) و خردل وحشی (*Sinapis arvensis*) بود. برای کنترل علف هرز در تیمارهای بدون خاک‌پوش سه نوبت وجین و یک نوبت علف‌کش استفاده شد. شمارش علف هرز پس از برداشتن پوشش خاک‌پوش از روی زمین در آخر فصل زراعی (فقط در سال دوم) یادداشت گردید که نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین‌های

منابع مورد استفاده

- Arab Salmany, K. and R. Rafezi. 2005. Integrated management of organic fertilization, deep furrow and plastic mulching in melon cultivation. *In: Proceedings of the Fourth Congress of Horticultural Science*. Mashhad, Iran. Page 312. (In Farsi).
- Burgess, L. W., B. A. Summerell and S. Bullock. 1994. *Laboratory Manual for Fusarium Research*. University of Sydney. Australia.
- Campos-de-Araujo, J. A. and S. M. Campos-de-Araujo. 1992. Analysis of cucumber (*Cucumis sativus* L.) production, vista Alegre, variety, using different coloured plastic soil mulch. XII Congreso Internacional de Plasticos Enagricultura. Granada. Spain. 108-113.
- Cavero, J., R. G. Ortega and C. Zavagoza. 1996. Clear Plastic mulch improved emergence of direct-seeded pepper. *Horticultural Science* 31(1): 70-73.
- Dhingra, O. D. and J. B. Sinclair. 1995. *Basic Plant Pathology Methods*. CRC Press. England.
- Ehyaie, A., A. A. Behbahanizadeh and M. Behbahanizadeh. 1993. *Description Methods of Soil Chemical Analysis*. Soil and Water Research Institute Publications. Karaj. No. 892. 127 p. (In Farsi).
- Farhadi, A. 2003. Best method of spreading plastic mulches on cucumber farm. *In: Proceedings of the Third Congress of Horticultural Science*. Karaj. Iran. Page 266. (In Farsi).

8. Farhadi, A. and M. Akbari. 2003. Efficiency of plastic mulches and irrigation systems to reduce water consumption and stress in Cantaloupe. *In: Proceedings of the Third Congress of Horticultural Science*. Karaj. Iran. Page 72. (In Farsi).
9. Gabriel, E. L., M. A. Canadas and R. M. Benito. 1994. Effects of plastic mulch on early yield of melon. *Horitucultura-Argentina* 15: 7-12.
10. Gomez, A. and A. Gomez. 2000. Statistical Designs for Agricultural Research. Translated by: E. Farshadfar. Publishing Center of Islamic Azad University. Iran. (In Farsi).
11. Gordan, G. G., W. G. Foshee, S. T. Reed, J. E. Brown and E. L. Vinson. 2010. The effect of colored plastic mulches and row covers on the growth and yield of Okra. *Hort Technology* 20:224-233.
12. Ham, J. M., G. J. Kluitenberg and W. J. Lamont. 1993. Optical properties of plastic mulches affect field temperature regime. *American Society for Horticultural Science* 118(2): 188-193.
13. Harz, T. K. and C. R. Bogle. 1989. Response of Tomato and Watermelon to Row Solarization. *Applied Agricultural Research* 4(1): 15-18.
14. Hochmuth, G. J., R. C. Hochmuth, and S. M. Olson. 2008. Polyethylene Mulching for Early Vegetable Production in North Florida. University of Florida IFAS Extension. Florida.
15. Heydari, N. and S. Fard. 2004. Experience of using plastic mulch to prevent drought on Isfahan farms. Available online at: <http://www.maj.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=a5fa6577-274a-4e4b-ae56-2eea6cabf7fe>. Accessed 20 Feb. 2004. (In Farsi).
16. Incalcaterra, G. and F. Vetrano. 2000. Effect of two sowing date and plastic mulch on Okra production. *In: Proceeding of 8th International Symposium on Timing of Field Production in Vegetable Crops*. Bari. Italy. 15-18 Oct. Available online at: http://www.actahort.org/books/533/533_40.htm
17. Iremiren, G. O. and D. A. Okiy. 1986. Effect of sowing date on the growth, yield and quality of okra (*Abelmoschus esculentus* L. Moench) in southern Nigeria. *The Journal of Agricultural Science* 106:21-26.
18. Jafari, P. 2004. The study involved the use of plastic mulch to increase water use efficiency in the production of cantaloupes. *In: Proceeding of 1st Conference on Irrigation and Drainage Networks Problems and Optimum Water Usage*. Tehran. Iran. 29-30 May. (In Farsi).
19. Jahani, Y. and A. K. Kashi. 2003. Black plastic mulch and leaf nutritional effects on the quantity and quality of cantaloupe. *In: Proceedings of the Third Congress of Horticultural Science*. Karaj. Iran. Page 70. (In Farsi).
20. Kashi, K., S. Hosseinzadeh, M. Babalar and H. Lesani. 2003. Effect of Black Polyethylene Mulch and Calcium Nitrate on Growth, Yield and Blossom end rot Charleston Gray watermelon. *Journal of Agricultural and Natural Resources* 7(4): 1-10. (In Farsi).
21. Lariosis, F., S. Guzman and A. C. Michel. 1994. Effect of Plastic mulches on the growth and yield of Cucumber in tropical region. *Biological Agriculture and Horticulture* 10. 303-306.
22. Mamkagh, A. M. A. 2009. Effect of tillage time and plastic mulch on growth and yield of okra (*Abelmoschus esculentus*) grown under rainfed conditions. *International Journal of Agriculture and Biology* 11:453-457.
23. Ministry of Jihad-E-Agriculture. 2008. Office of Statistics and Information Technology. Agricultural Inventory in 2006-2007. Volume 1: Agricultural and Horticultural crops. Available online at: <http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=117564e0-507c-4565-9659-fbabfb4acb9b>. Accessed 12 Sep. 2009.
24. MSU (Mississippi State University). 2009. Mulching in the vegetable garden. Available online at: <http://MSUcares.com/lawn/garden/vegetables/mulching/index.html>. Accessed 2 Nov. 2009.
25. Neff, M. W. 2010. Black or blue? Mulch color affects okra growth and yield. *Science Newsline "Nature & Earth"*. Available online at: <http://www.sciencenewsline.com/articles/2010041912000009.html>. Accessed 19 Apr. 2010.
26. OSU (Oregon State University). 2002. Okra. Commercial vegetable production Guides. Available online at: <http://nwrec.hort.oregonstate.edu/okra.html>. Accessed 23 April 2002.
27. Peters, D.B. and L.C. Johnson. 1962. Soil moisture use by soybeans. *Agronomy Journal* 52: 687-689
28. Pourazar, R. 2010. Using Herbal Mulch to Control Weeds. Publication of Agricultural Jihad Organization of Khuzestan. Iran. Register No.:317/1389 (In Farsi).
29. Ramezani, F., J. Mohammadi and B. Esmaeelpur. 2009. Effect of mulch on yield and yield components of cucumber. *In: Proceedings of the 6th Congress of Horticultural Science*. Gilan University. Iran. Page 24. (In Farsi).
30. Relf, D. and A. McDaniel. 2009. Mulches for the home vegetable garden. Virginia Cooperative Extension. VSU. Available online at: <http://pubs.ext.vt.edu/426/426-326/426-326.html>. Accessed 12 April 2009.
31. Ruppel, S. and E. Makswitat. 1996. Effect of black plastic mulch on nitrogen balance in cultivation of pickle (*Cucumis sativus* L.). *Gartenbauwissenschaft* 61(5): 230-237.
32. Sanders, D. C. 2001. Okra production. North Carolina state university. *Horticultural Information Leaflets*. Available online at: www.ces.ncsu.edu/hil/hil-19.html. Accessed 1 Jan.2001.
33. Singleton, L. L., J. D. Mihail and C. M. Rush. 1992. Methods for Research on Soil Born Phytopathogenic Fungi.

American Phytopathological Society. USA.

34. Soleimanipour, A., A. Farhadi, A. Nikuie and A. Bagheri. 2003. Economic analysis of using polyethylene Mulches in cucumber cultivation. *Research and Development in Agriculture and Horticulture* 17(4) 58-66. (In Farsi).
35. Tavoosi, M. 2009. Okra, "Planting & Harvesting". Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Scientific Information and Documentation Center. Register No. 1387/88. (In Farsi).
36. Tiwari, K. N., P. K. Mal, R. M. Singh and A. Chattopadhyay. 1998. Response of Okra to drip irrigation under mulch and nonmulch conditions. *Agricultural Water Management* 38(2). 91-102.
37. Torabi Giglu, M., M. Keramty Toroghy, R. Didar Taleshmikaeel and M. Davari. 2005. Effect of planting methods and plastic mulch in tomato breeding. *In: Proceedings of the 4th Congress of Horticultural Science*. Mashhad. Iran. 289. (In Farsi).
38. Zargarian, S. M., A. Tehranifar and M. Kahrobaiyan. 2005. Covered mulch with bottom plastic layer to save water and maintenance costs in management of green space. *In: Proceedings of the 4th Congress of Horticultural Science*. Mashhad. Iran. 392-391. (In Farsi).