

بررسی روابط بین صفات سنبله‌ای با صفات فنولوژیکی و رشدی ژنتیکی مختلط گندم نان تحت شرایط تنفس خشکی مرحله گلدهی در مزرعه

بهنام طهماسب پور^۱، سدابه جهانبخش^{*۲}، علیرضا تاری نژاد^۳، حمید محمدی^۴ و علی عبادی^۲

(تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۴/۲۷)

چکیده

گندم مهم‌ترین گیاه زراعی است که حدود ۲۰ درصد از اراضی جهان به کشت آن اختصاص یافته است. بر اساس گزارش فائو حدود ۹۰ درصد از کشور ایران در نواحی خشک و نیمه‌خشک قرار دارد. تنفس خشکی هرساله خسارت فراوانی را در محصولات زراعی ایجاد می‌کند و موجب کاهش ۱۷ درصدی عملکرد می‌شود؛ ازین‌رو انجام تحقیقات در زمینه بهبود مقاومت گیاهان در برابر تنفس خشکی و یافتن راه‌کارهای مناسب به منظور کمینه ساختن تلفات آب در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور شناسایی روابط بین صفات مختلف در گندم نان، ۳۰ ژنوتیپ تحت آزمایش اسپلیت‌پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط آبیاری عدم تنفس و تنفس خشکی شروع گلدهی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید مدنی در سال ۱۳۹۵-۹۶ مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها از نظر صفات مورد بررسی اختلاف معنی‌دار وجود دارد. اختلاف بین شرایط عدم تنفس و تنفس خشکی برای کلیه صفات به جز عملکرد کاه سنبله معنی‌دار شد. اثر متقابل ژنوتیپ×تنفس خشکی برای کلیه صفات به جز طول سنبله، وزن هزار دانه، سرعت پر شدن دانه و سرعت رشد رویشی معنی‌دار شد که بیانگر پاسخ متقاومت ژنوتیپ‌ها به شرایط خشکی مختلف است. نتایج حاصل از تجزیه همبستگی کانونیک نشان داد، در هر دو سطح عدم تنفس و تنفس خشکی بین جفت متغیرهای کانونیکی حاصل از صفات فنولوژیکی و رشدی با صفات سنبله‌ای همبستگی معنی‌داری وجود دارد. با توجه به نتایج تجزیه همبستگی کانونیک می‌توان عنوان کرد که تحت شرایط عدم تنفس جهت افزایش خصوصیات مطلوب سنبله (شاخص برداشت سنبله و تعداد دانه در سنبله)، صفات سرعت رشد رویشی و سرعت پر شدن دانه به عنوان متغیرهای گزینشی مهم می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. در شرایط تنفس گلدهی جهت افزایش تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت سنبله، تعداد سنبله و طول سنبله و کاهش عملکرد کاه سنبله، صفات سرعت رشد رویشی، طول دوره پر شدن دانه، تعداد روز تا رسیدگی و سرعت رشد رویشی می‌توانند به عنوان معیارهای گزینشی مناسب در نظر گرفته شوند.

واژه‌های کلیدی: تجزیه همبستگی کانونیک، عملکرد، کم آبی

۱ و ۲. بهتریب دانشجوی دکتری تخصصی اصلاح نباتات و استاد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

۳. دانشیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

۴. دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

*: مسئول مکاتبات: پست الکترونیکی: jahanbakhsh@uma.ac.ir

مقدمه

غیرزیستنی قرار می‌گیرند. همزمان با تغییرات صفات فیزیولوژیکی در گیاهان، صفات مورفولوژیکی نیز در اثر تنش خشکی تغییر می‌کنند، درنتیجه برای گزینش ارقام متحمل به تنش خشکی می‌توان از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی به عنوان معیارهای گزینشی مناسب بهره جست. بر اساس تحقیقات صبا و همکاران (۲۱) لاینهای مطلوب گندم، آنهایی هستند که زیستتوده نسبتاً زیاد، ارتفاع بوته و طول سنبله متوسط و دمای کانونی پایین دارند و انتظار می‌رود که این لاینهای به طور همزمان تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه بیشتر و درنتیجه عملکرد دانه در بوته بیشتری داشته باشند. صبا و همکاران (۲۱) با ارزیابی متغیرهای کانونیکی برای عملکرد و صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و فیزیولوژیکی تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل گزارش کردند که افزایش زیستتوده و کاهش دمای کانونی منجر به افزایش تعداد سنبله در بوته و وزن هزار دانه و کاهش تعداد دانه در سنبله و در نهایت سبب افزایش عملکرد بوته می‌شود.

با تجزیه‌های تک متغیره همانند تجزیه واریانس، هر صفت به‌طور جداگانه تجزیه می‌شود. اما این روش‌ها میزان تفاوت ارقام را زمانی که صفات اندازه‌گیری شده با یکدیگر ارتباط دارند، تشریح نمی‌کند (۲۲). تجزیه همبستگی کانونیک و تجزیه تشخیص متعارف از روش‌های تجزیه آماری چند متغیره در بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه بین صفات زراعی ارقام هستند. تجزیه همبستگی متعارف توسط هتلینگ در سال‌های ۱۹۳۵ و ۱۹۳۶ پیشنهاد شده است و همانند سایر روش‌های آماری چندگانه روشی برای تخمین یا کاهش تعداد داده است. این روش یک حالت تعیین‌یافته رگرسیون چندگانه است که جهت تعیین ارتباط بین دو مجموعه از متغیرها به کار می‌رود (۲۲). در تجزیه همبستگی کانونیکی صفات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و فنولوژیکی با صفات اجزایی عملکرد دانه، صبا و همکاران (۲۱) گزارش کردند که اولین متغیر کانونیکی برای صفات مستقل (U₁) بیشتر تحت تأثیر زیستتوده گیاه (۰/۶۷) قرار گرفت و صفات دمای کانونی، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد روز از زمان کاشت تا سنبله‌دهی دارای ضریب همبستگی

گندم مهم‌ترین گیاه زراعی است که حدود ۲۰ درصد از اراضی جهان به کشت آن اختصاص یافته است. گندم گیاه ارزشمندی است که بیشترین استفاده آن برای تأمین غذا بوده، به‌طوری‌که نزدیک به ۶۸ درصد کل آن، تا به امروز برای تأمین غذا به کار رفته است. گندم مورد نیاز برای تأمین غذا در سال ۲۰۲۰ به ۱۴۵ مگا تن رسید که شبیه افزایش آن نسبت به دهه گذشته، آهسته‌تر است. بر اساس گزارش فائو حدود ۹۰ درصد از کشور ایران در نواحی خشک و نیمه‌خشک قرار دارد (۹). در آینده نزدیک گسترش فعالیت‌های کشاورزی به مناطقی با حاصلخیزی کمتر برای تأمین نیازهای روبه افزایش غذایی، موجب خواهد شد کمبود آب اهمیت بیشتری پیدا کند (۹).

تنش خشکی هر ساله خسارت فراوانی را به محصولات زراعی وارد می‌کند و موجب کاهش ۱۷ درصدی عملکرد دانه می‌شود (۱۴ و ۱۹). خشکی به عنوان یکی از عمومی‌ترین و چالش برانگیزترین تنش‌های محیطی در کشاورزی تمام دنیا *Triticum* شناخته می‌شود (۱۲ و ۱۵) و تولید گندم نان (L. aestivum) را ۲۱ درصد کاهش می‌دهد (۶). سطح کشت گندم در ایران در سال‌های اخیر عمدتاً به دلیل وقوع تنش شدید خشکی با کاهش مواجه شده است. تنش خشکی از طریق کاهش رشد و نمو دانه، عملکرد گیاه را کاهش می‌دهد (۸). شدت تنش و طول دوره تنش خشکی از طریق کاهش طول دوره رشد (۱۷)، پر شدن دانه و کاهش اجزای عملکرد، تعیین کننده میزان کاهش عملکرد دانه است (۴).

جهت حصول عملکرد مناسب باید تمامی اجزای عملکرد نسبت به یکدیگر از موازن و تعادل مطلوبی برخوردار باشند. اگرچه تمامی مراحل رشد گیاه تحت تأثیر تنش خشکی قرار می‌گیرد، ولی مرحله پر شدن دانه حساس‌ترین مرحله به تنش خشکی مبوده که وزن هزار دانه با اعمال تنش در این مرحله بیشتر از سایر اجزای عملکرد تحت تأثیر قرار می‌گیرد (۲۰). در بسیاری از مناطقی که گندم در آنها کشت می‌شود، پُر شدن دانه‌ها با مواد فتوسنتزی، تحت تأثیر تنش‌های زیستی و

تکرار، تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی انجام گرفت. ژنوتیپ‌های مورد استفاده در این آزمایش مطابق جدول ۱ به عنوان تیمارهای کرت‌های فرعی در نظر گرفته شدند. کدهای cd-1 تا cd-11 مربوط به ژنوتیپ‌های آزمایش آتست یا ARWYT سال ۹۴ و کدهای C-93 تا C-94 به ترتیب مربوط به ژنوتیپ‌های آزمایش یکنواخت سراسری URWYT سال ۹۳ و ۹۴ مناطق سرد هستند که از بخش غلات موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر شجره ارقام (جدول ۱) قابل دستیابی است (۲۴ و ۲۵). در این بررسی ارقام میهن، اروم و حیدری به عنوان ژنوتیپ‌هایی که تا حدودی به تنش خشکی آخر فصل در مناطق سرد متحمل هستند به عنوان شاهد در آزمایشات گنجانده شدند (۱۰).

میانگین دمای سالیانه 10°C ، میانگین حداقل دمای سالیانه 16°C و میانگین حداقل دمای سالیانه 2°C و میانگین بارندگی این ناحیه، ۲۲۶ میلی متر در سال است. اقلیم منطقه طبق تقسیم‌بندی دومارتون از نوع نیمه‌خشک و سرد با بارندگی ۲۲۶ میلی متر در طول سال زراعی اجرای آزمایش بود. بافت خاک مزرعه، لومی شنی با مشخصات $\text{pH} = 7/86$ و $\text{Sand} = 72\%$ و $\text{Organic matter} = 22\%$ و $\text{EC} = 1/83 \text{ ds/m}$ و $\text{Clay} = 17\%$ و $\text{Silt} = 11\%$ و $\text{P} = 48 \text{ mg/kg}$ و از نوع نیمه‌خشک و سرد با بارندگی ۲۲۶ میلی متر در عملیات آماده‌سازی زمین، مشتمل بر عملیات مربوط به شخم، دیسک، تسطیح و ایجاد فارو در قطعه موردنظر اواسط مهرماه سال ۱۳۹۵ انجام شد. عمق کاشت بذور ۲-۳ سانتی متر در نظر گرفته شد. هر تکرار شامل دو کرت اصلی و هر کرت اصلی شامل ۳۰ کرت فرعی بود. در هر کرت فرعی ۴ ردیف از هر ژنوتیپ کاشته شد. طول خطوط کاشت ۲ متر و فاصله بین بذور ۲ سانتی متر منظور شد. فاصله بین خطوط کاشت ۱۷ سانتی متر در نظر گرفته (۱۷).

در شرایط آبیاری مطلوب در مزرعه، ژنوتیپ‌ها بسته به نیاز و شرایط محیطی معمولاً هر ۱۲ روز یکبار آبیاری شدند و در زمان اجرای تنش، آبیاری از مرحله گل‌دهی در کرت‌هایی که

پایین‌تر بودند. همچنین این محققان بیان کردند که اولین متغیر کانونیکی برای اجزای عملکرد (V1) بیشتر تحت تأثیر صفات تعداد سنبله در بوته و وزن هزار دانه قرار گرفت و تعداد دانه در سنبله دارای ضریب همبستگی پایین‌تر بود. در پژوهش علوی سینی و صبا (۲) متغیر کانونی دوم با توجیه ۱۱ درصد از تنوع متغیرهای زراعی با صفات درصد ماده خشک برگ و سنبله، ارتفاع، طول ریشه، طول پدانکل، وزن مخصوص پدانکل و زیست توده، همبستگی مثبت و متغیر کانونی سوم با توجیه ۵/۵ درصد از تنوع با همه صفات به جز درصد ماده خشک برگ، ارتفاع، وزن هزار دانه، زیست توده و عملکرد، همبستگی منفی داشت. در این رابطه ایشا و همکاران (۷) در بررسی ۲۵۵۹ ژنوتیپ گندم با انجام تجزیه تشخیص متعارف برای صفات مختلفی همانند رنگ ریشه، رنگ دانه و رنگ گلوم و بخصوص تراکم سنبله دریافتند که دو تابع متعارف در مجموع ۹۵/۶ درصد از تنوع بین ارقام را توجیه نموده و ضریب صفتی همانند تراکم سنبله در تابع اول متعارف ۰/۰۴ و در تابع دوم ۰/۰۴ بود. همچنین آنها جهت صحت گروه‌بندی ارقام گندم از تابع تشخیص استفاده نمودند.

بررسی اهمیت نسبی صفات ریخت‌شناسی و فنلولژیکی مؤثر بر عملکرد ژنوتیپ‌های موردمطالعه به منظور دستیابی به معیارهایی برای انتخاب ژنوتیپ‌های پرمحصول و استفاده از آن‌ها در برنامه‌های بهزیادی لازم و ضروری است؛ بنابراین، در این تحقیق روابط بین صفات سنبله‌ای با صفات فنلولژیکی و رشدی و تعیین معیارهای گزینشی مهم در ارقام پرمحصول تحت شرایط عدم تنش و تنش خشکی در شرایط مزرعه مورد مطالعه قرار گرفت تا علل تحمل یا حساسیت به تنش از جنبه‌های صفات سنبله‌ای، فنلولژیکی و رشدی در این ارقام بررسی شود.

مواد و روش‌ها

آزمایش در سال زراعی ۹۵-۹۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با ۳۰ ژنوتیپ گندم به صورت آزمایش اسپلیت‌پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه

جدول ۱. شجره ارقام مورد مطالعه

شجره	ژنوتیپ ها	شجره	ژنوتیپ ها
Bow/Crow/3Rsh//Kal/Bb/3/Gun91	c-93-7	Zareh	cd-1
Ji5418/Maras//Shark/F4105W2.1	c-93-8	Ald"s"/Snb"s"//Zrn*2/3/Yaco/Parus//Parus	cd-2
Bluegil-2/BucuR//Sirena	c-93-9	Bow/Crow/3Rsh//Kal/Bb/3/Gun91	cd-3
Ajvina	c-93-10	Nwau15/Attila//Shark/F4105W2.1	cd-4
Gul96/Shark-1	c-93-11	Ji5418/Maras//Shark/F4105W2.1	cd-5
WON-IR-ξ			
257/5/Ymh/Hys//Hys/Tur3055/3/Dga/4/Vpm/Mos	c-94-3	Ji5418/Maras//Shark/F4105W2.1	cd-6
Ga961565-27-6/La95283Ca-78-1-2	c-94-4	WON-IR-ξ	
Charger/OWL 85224*-3H-*O-*HOH//Alvd	c-94-6	257/5/Ymh/Hys//Hys/Tur3055/3/Dga/4/Vpm/Mos	cd-7
Shark-1/3/Agri/Bjy//Vee/4/Shark/F4105W2.1	c-94-7	WON-IR-ξ	
Bluegil-2/Bucur//Sirena	c-94-8	Eryt 1554.90/MV17	cd-9
Or2071681	c-94-9	Gul96/Shark-1	cd-10
Mv-17	MV 17	Spn/Mcd//Cama/3/Nzr/4/Ald"s"/Snb"s"**2/5/O pata*2/Wulp	cd-11
Ghk"s"/Bow"s"//90Zhong87// Shiroodi cultivar	Heydari	Shark-1/3/Agri/Bjy//Vee/4/Shark/F4105W2.1	c-93-3
87Zhong-90/Bkt	Mihan	Nwau15/Attila//Shark/F4105W2.1	c-93-4
Her/Alvand//NS732	Eroum	Eryt 1554.90/MV17	c-93-5
		Spn/Mcd//Cama/3/Nzr/4/Ald"s"/Snb"s"**2/5/O pata*2/Wulp	c-93-6

از قاعده سنبله تا نوک آن بدون در نظر گرفتن ریشکها بر حسب سانتی متر اندازه گیری شد. تعداد سنبلچه های حاوی دانه در ۱۰ سنبله اصلی در مزرعه که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند شمارش شده و بعد از میانگین گیری تعداد سنبلچه در سنبله به دست آمد. تعداد دانه در ۱۰ سنبله اصلی در مزرعه که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، شمارش شد و میانگین تعداد دانه در یک سنبله ثبت شد. طول دوره پر شدن دانه (روز) از طریق تفاضل تعداد روز تا ۵۰٪ گلدهی از تعداد روز تا رسیدگی محاسبه شد. سرعت پر شدن دانه (گرم در روز) از نسبت وزن عملکرد دانه تک بوته (بر حسب گرم) به طول دوره پر شدن دانه (بر حسب روز) به دست آمد. سرعت رشد رویشی (گرم در روز) از نسبت وزن خشک بوته (بر حسب گرم) به تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک (بر حسب روز) به دست آمد. عملکرد کاه سنبله (گرم) از طریق تفاضل وزن دانه در سنبله اصلی از وزن سنبله اصلی به دست آمد. شاخص برداشت سنبله از نسبت وزن دانه در سنبله اصلی به وزن سنبله

قرار بود تنش اعمال شود، قطع شد و با استفاده از دستگاه صفحه فشاری (۱۸) میزان ظرفیت زراعی مزرعه تعیین و بر اساس آن تنش اعمال شد و در صورت پیش بینی احتمال بارندگی از پوشش نایلونی برای جلوگیری از نفوذ آب به تیمارهای تنش استفاده شد.

در طول فصل رشد، صفات تعداد روز تا ۵۰٪ گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، طول دوره پر شدن دانه، سرعت رشد رویشی و سرعت پر شدن دانه برای هر کرت فرعی ثبت شد و در زمان رسیدگی گیاه از متوسط ۱۰ بوته صفات طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، عملکرد کاه سنبله، و شاخص برداشت سنبله اندازه گیری شدند. وزن هزار دانه و عملکرد دانه در یک مترمربع از هر کرت فرعی تعیین شد. تعداد روز از زمان کاشت تا مرحله ای که ۵۰٪ سنبله ها وارد مرحله گلدهی شدند، به عنوان تعداد روز تا ۵۰٪ گلدهی لحاظ شد. تعداد روز از زمان کاشت تا مرحله ای که ۷۵٪ بوته های هر کرت زرد شدند، به عنوان تعداد روز تا رسیدگی لحاظ شد. طول سنبله

اختلاف معنی دار داشتند که نشان دهنده تنوع ژنتیکی بالا برای این صفات در بین ژنوتیپ‌ها بوده و می‌توان از این تنوع در برنامه گزینش برای تحمل به تنش خشکی بهره‌برداری کرد. اثر متقابل ژنوتیپ‌ها در سطوح مختلف تنش خشکی برای کلیه صفات به جز صفات وزن هزار دانه، سرعت پر شدن دانه، سرعت رشد رویشی و طول سنبله معنی دار بود که بیانگر پاسخ متفاوت ژنوتیپ‌ها به شرایط محیطی مختلف است.

برای صفاتی که اثر متقابل ژنوتیپ × محیط معنی دار نبود، مقایسه میانگین اثرات اصلی ژنوتیپ و تنش خشکی انجام شد (جدول ۳ و ۴). برای صفاتی که اثر متقابل ژنوتیپ × محیط معنی دار بودند، مقایسه میانگین ژنوتیپ‌ها با روش برش دهی فیزیکی و به تفکیک شرایط عدم تنش و تنش خشکی انجام شد (جدول ۵). میانگین، دامنه تغییرات و ضریب تغییرات ابزار مفیدی در گزینش فنوتیپی برای اهداف اصلاحی هستند (۳ و ۵).

ژنوتیپ ۹-۹۴-۰ با میانگین ۹/۴۷ سانتی متر بیشترین و ژنوتیپ ۲-۰ با میانگین ۶/۸۱ سانتی متر کمترین طول سنبله را داشتند (جدول ۴). طول سنبله تحت شرایط عدم تنش (۶/۴۶ سانتی متر) بیشتر از شرایط تنش گلدهی (۶/۹۶ سانتی متر) بود (جدول ۳). در پژوهشی در استرالیا واکنش طول سنبله ارقام مختلف گندم به تنش خشکی بررسی و عنوان شد که تغییرات طول سنبله بستگی کامل به نوع رقم داشته و ممکن است افزایش یا کاهش داشته باشند (۱۳).

ژنوتیپ حیدری با ۰/۱۲ گرم در روز و ژنوتیپ ۴-۹۳-۰ با ۰/۰۵ گرم در روز بهتر ترتیب بیشترین و کمترین سرعت رشد رویشی را به خود اختصاص دادند (جدول ۳). ژنوتیپ‌های cd-۹۳-۱۱ و ۰/۰۴۷-۹۴-۰ به ترتیب با میزان ۰/۴۱، ۰/۰۴۷ و ۰/۰۲۰ گرم در روز بیشترین سرعت پر شدن دانه را به خود اختصاص دادند. کمترین مقدار سرعت پر شدن دانه به ژنوتیپ cd-۰/۱۸ گرم در روز) مربوط بود (جدول ۴). از سوی دیگر سرعت پر شدن دانه تحت شرایط عدم تنش (۰/۰۳۱ گرم در روز) بیشتر از سرعت پر شدن دانه، تحت شرایط تنش گلدهی (۰/۰۲۰ گرم در روز) بود (جدول ۳). احمدی و باکر (۱) گزارش

اصلی بدست آمد.

به منظور مقایسه ژنوتیپ‌های مورد آزمایش تجزیه واریانس به صورت اسپلیت‌پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی برای کلیه صفات انجام گرفت. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال ۵٪ صورت گرفت. در این پژوهش تجزیه همبستگی کانونیک بین دو گروه صفات فنولوژیکی و رشدی، و صفات سنبله‌ای از طریق نرم افزار SAS ۹ انجام گرفت. صفات فنولوژیکی و رشدی با نماد X در نظر گرفته شد و صفات سنبله‌ای با نماد Y نشان داده شد. برای آزمون فرضیه برابری حداقل یکی از ضرایب همبستگی کانونیک با صفر از آماره لامبای ولکاکس (Lambda Wilcox) استفاده شد. این روابط برای دو سطح آبیاری (عدم تنش، خشکی) به طور جداگانه محاسبه شدند. در این پژوهش از نرم‌افزارهای آماری MSTAT-C SAS 9.1، SPSS 23 استفاده شد.

نتایج و بحث

تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی در جدول ۲ درج شده است. مطابق با نتایج جدول ۲، اثر تنش خشکی در مرحله شروع گلدهی بر کلیه صفات به جزء عملکرد کاه سنبله معنی دار بود. در بین صفات مورد بررسی تعداد روز تا ۵۰٪ گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی کمترین ضریب تغییرات (۱/۴۲ درصد) و سرعت پر شدن دانه بیشترین ضریب تغییرات (۲۸/۶۳ درصد) را دارا بودند (جدول ۲). به نظر می‌رسد که در این پژوهش صفات فنولوژیکی کمتر تحت تأثیر محیط بوده و ژنوتیپ‌ها هم از نظر این صفات، مستقل از محیط عمل نموده‌اند ولی صفت سرعت پر شدن دانه بیشتر تحت تأثیر محیط قرار گرفته‌اند. ضریب تغییرات یک معیار استاندارد شده بوده و میزان قابل قبول ضریب تغییرات بسته به درجه کنترل آزمایش و میزان وراحت‌پذیری صفت مورد بررسی و عوامل دیگر فرق می‌کند. ژنوتیپ‌های مورد بررسی از لحاظ کلیه صفات مورد مطالعه

تجزیه و اریانس صفات مختلف در زنوبیه‌های مورد ارزیابی در مژده جدول ۲ نشان داده شد.

جدول ۳ مقایسه میانگین صفات مربوط به سطوح مختلف نیش خشکی

جدول ۴. مقایسه میانگین صفات مربوط به ژنتیپ‌های مورد مطالعه گندم نان

سرعت رشد رویشی (گرم در روز)	سرعت پر شدن دانه (گرم در روز)	وزن هزار دانه (گرم)	طول سنبله (سانتی متر)	صفات ژنتیپ
۰/۰۸ b-e	۰/۲۷ b-d	۳۲/۳ f-h	۷/۹۷ b-e	cd-1
۰/۰۹ d-e	۰/۲۳ b-d	۳۵/۸ d-g	۹/۸۱ g	cd-2
۰/۰۸ b-e	۰/۲۶ b-d	۳۲/۲ f-h	۸/۳۹ b-c	cd-3
۰/۰۹ d-e	۰/۱۹ c-d	۳۴/۷ d-h	۸/۱۷ b-e	cd-4
۰/۰۸ b-e	۰/۲۳ b-d	۳۵/۶ d-g	۸/۳۴ b-c	cd-5
۰/۰۹ d-e	۰/۱۸ d	۳۶/۳ d-g	۸/۴۷ b	cd-6
۰/۰۸ b-e	۰/۲۸ b-d	۳۴/۳ d-h	۷/۴۶ b-g	cd-7
۰/۰۹ c-e	۰/۲۰ b-d	۳۲/۳ f-h	۸/۰۶ b-e	cd-8
۰/۰۸ b-e	۰/۲۷ b-d	۳۷/۸ a-e	۷/۳۹ c-g	cd-9
۰/۰۷ d-e	۰/۴۱ a	۳۷/۲ b-f	۷/۵۶ b-g	cd-10
۰/۰۹ c-e	۰/۲۵ b-d	۳۷/۳ b-f	۷/۷۲ b-g	cd-11
۰/۰۷ d-e	۰/۲۲ b-d	۳۶/۷ c-g	۷/۹۴ f-g	c-93-3
۰/۰۵ e	۰/۱۸ c-d	۳۴/۵ d-h	۷/۲۲ e-g	c-93-4
۰/۰۷ de	۰/۲۶ b-d	۴۱/۴ a-c	۷/۸۹ f-g	c-93-5
۰/۰۷ de	۰/۲۲ b-d	۳۴/۶ d-h	۷/۷۲ b-g	c-93-6
۰/۰۷ cde	۰/۱۸ c-d	۲۹/۷ h	۷/۸۹ f-g	c-93-7
۰/۰۷ d-e	۰/۱۸ c-d	۳۵/۵ d-g	۷/۹۷ b-e	c-93-8
۰/۰۷ d-e	۰/۲۵ b-d	۳۲/۷ e-h	۷/۷۱ b-g	c-93-9
۰/۰۸ b-e	۰/۲۵ b-d	۳۱/۹ g-h	۷/۷۲ b-g	c-93-10
۰/۰۷ d-e	۰/۴۶ a	۳۷/۱ b-g	۷/۸۹ f-g	c-93-11
۰/۰۹ b-d	۰/۲۷ b-d	۴۲/۴ a	۷/۴۷ b-g	c-94-3
۰/۰۸ b-e	۰/۲۹ b	۳۳/۶ d-h	۷/۵۶ b-g	c-94-4
۰/۰۹ c-e	۰/۲۴ b-d	۳۴/۴ d-h	۸/۳۱ b-d	c-94-6
۰/۰۹ d-e	۰/۲۳ b-d	۳۴/۱ d-h	۷/۳۱ d-g	c-94-7
۰/۰۹ a-d	۰/۲۸ b-d	۳۲/۵ f-h	۸/۴۳ b	c-94-8
۰/۱۱ a-b	۰/۴۰ a	۳۸/۱ a-d	۹/۴۷ a	c-94-9
۰/۱۰ a-c	۰/۲۴ b-d	۳۲/۶ e-h	۷/۶۳ b-g	MV 17
۰/۱۲ a	۰/۲۸ b-d	۳۵/۹ d-g	۸/۴۳ b	حیدری
۰/۰۹ a-d	۰/۲۹ b-c	۴۱/۸ a-b	۸/۰۷ b-e	مهمن
۰/۰۸ b-e	۰/۲۶ b-d	۳۶/۷ c-g	۷/۸۳ b-f	اروم

حرروف متفاوت در هر ستون بیانگر اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ می‌باشد.

مشکل که در اینجا مطرح شده است این است که میتواند مسأله را برای داشتن یک مجموعه محدود از این اعداد حل کند.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

برای حل این مسأله باید از مجموعه ای از اعداد محدود از ۱ تا ۹ استفاده کرد.

مختلف در تحمل خشکی بود که بخش زیادی از آن به توانایی گیاه در استفاده مجدد از مواد پرورده ذخیره شده در ساقه است. به عبارت دیگر ارقام با ارتفاع بیشتر به دلیل دارا بودن ذخایر بیشتر در ساقه و توانایی استفاده از آن برای پرشدن دانه در شرایط کمبود رطوبت و کاهش فتوستز جاری کمتر تحت تأثیر شرایط نامساعد خشکی پس از گلدهی قرار گرفته‌اند.

تحت شرایط عدم تنش ژنتیپ‌های میهن و حیدری بیشترین شاخص برداشت سنبله (۰/۷۶) را به خود اختصاص دادند (جدول ۵). مطابق با یافته‌های جدول ۵، تحت شرایط تنش خشکی، ژنتیپ‌های c-93-4، c-93-7 و حیدری کمترین شاخص برداشت سنبله (۰/۳۸، ۰/۳۹ و ۰/۳۷) را داشتند. با توجه به اینکه ژنتیپ میهن از ژنتیپ‌های متتحمل به خشکی با عملکرد بالا می‌باشد، بنابراین طبیعی است که نسبت وزن دانه به وزن سنبله بالا داشته باشد (۷۶/۱ درصد).

بر اساس نتایج جدول ۵، تحت شرایط عدم تنش ژنتیپ c-93-5 بیشترین عملکرد کاه سنبله (۲/۹۴ گرم) را به خود اختصاص داد، درحالی که ژنتیپ حیدری تحت این شرایط، کمترین عملکرد کاه سنبله (۱/۱۴ گرم) را داشت.

تحت شرایط عدم تنش، ژنتیپ c-94-3 بیشترین تعداد سنبله در سنبله (۱۸/۶) را به خود اختصاص داد (جدول ۵). تحت شرایط تنش، ژنتیپ c-93-11 کمترین تعداد سنبله در سنبله (۹/۶) را داشت. به نظر می‌رسد که با کاهش مقدار رطوبت قابل دسترس گیاه، مقدار سبزیه و شاخص سطح برگ گیاه نیز کاهش می‌یابد و در پی آن مقدار کل کربوهیدرات تولید شده در گیاه نیز کاهش خواهد یافت و در مرحله تشکیل تعداد سنبله‌ها باعث کاهش تعداد سنبله در سنبله خواهد شد. تحت شرایط عدم تنش ژنتیپ‌های c-94-6، cd-4، c-94-9، MV17، cd-3 و حیدری بیشترین تعداد روز تارسیدگی (۳۰ روز) را داشتند (جدول ۵). از سوی دیگر، تحت شرایط تنش، ژنتیپ‌های cd-8، c-93-9، c-94-3، حیدری، c-94-8، c-94-9 و c-94-6 نیز بیشترین تعداد روز تارسیدگی (۳۰ روز) را دارا بودند (جدول ۵). کمترین تعداد روز تارسیدگی تحت شرایط تغییرات این صفت در ارقام مختلف بین ۲۱۵/۳-۳۳۰ روز متغیر بود.

تحت شرایط عدم تنش و تنش، ژنتیپ c-94-9 بیشترین

کردند که سرعت پرشدن دانه تا ۲۵ روز بعد از پرشدن دانه تحت تأثیر کاهش رطوبت قرار نگرفت. تغییرات کاهش عملکرد دانه و کاهش دوره مؤثر پرشدن دانه با یکدیگر موازی بوده و سرعت رشد دانه دارای روند مخالف روند صفات فوق الذکر بوده و با توجه به وابستگی صفات فوق الذکر با سرعت و مدت پرشدن دانه‌ها و پیروی تغییرات صفات وزن دانه و عملکرد دانه از تغییرات مدت پرشدن دانه، اهمیت این صفت بر عملکرد دانه کاملاً مشهود می‌باشد و نتایج نشان می‌دهد که سرعت و مدت پرشدن دانه بستگی شدیدی به عوامل محیطی از جمله تنش خشکی دارد. ژنتیپ حیدری با ۰/۱۳ گرم در روز و ژنتیپ c-93-4 با ۰/۰۵ گرم در روز به ترتیب بیشترین و کمترین سرعت رشد رویشی را به خود اختصاص دادند (جدول ۴).

تحت شرایط عدم تنش ژنتیپ MV17 بیشترین تعداد دانه در سنبله (۹۰/۳) و تحت شرایط تنش خشکی در مرحله شروع گلدهی، ژنتیپ c-93-4 کمترین تعداد دانه در سنبله (۲۹/۳) را به خود اختصاص دادند (جدول ۵). دامنه تغییرات این صفت بین ۹۰/۳-۲۹/۳ متغیر بود که نشانگر تنوع ژنتیکی بالا برای این صفت در بین ژنتیپ‌ها است. تعداد دانه در سنبله در ارقام مختلف اختلاف زیادی دارد و این صفت معمولاً در ارقام پرمحصول بیشتر از ارقام با عملکرد پایین است (۲۳).

تحت شرایط عدم تنش ژنتیپ‌های c-94-3 و حیدری بیشترین عملکرد دانه (به ترتیب ۴۳۷ و ۴۲۷ گرم در مترمربع) را به خود اختصاص دادند (جدول ۵). مطابق با یافته‌های جدول ۵، تحت شرایط تنش خشکی در مرحله شروع گلدهی، ژنتیپ‌های cd-4 و cd-6 کمترین عملکرد دانه (به ترتیب ۱۰۴ و ۱۰۸ گرم در مترمربع) را به خود اختصاص دادند. ژنتیپ‌های c-94-9 و cd-3 نیز تحت شرایط عدم تنش عملکرد دانه بیشتری داشتند (به ترتیب ۴۰۶ و ۴۰۳ گرم در مترمربع)، که با ژنتیپ‌های c-94-3 و حیدری اختلاف معنی‌داری نداشتند. نتایج بررسی اثر متقابل ژنتیپ × محیط برای عملکرد دانه نشان داد که ژنتیپ‌های مختلف واکنش متفاوتی نسبت به تیمار آبیاری نشان دادند. این امر نشان‌دهنده واکنش متفاوت ارقام

جدول ۶. مقادیر همبستگی بین جفت متغیرهای کانونیک در ۳۰ ژنوتیپ گندم تحت شرایط عدم تنفس و تنفس

همبستگی کانونیک	مقادیر F	سطح احتمال معنی داری F	نسبت تجمعی	توان دوم همبستگی کانونیک	مقادیر ژنوتیپ گندم تحت شرایط عدم تنفس
شرایط عدم تنفس					
۰/۹۹	۷/۹۲	۰/۰۰۰۱	۰/۹۸	۰/۹۸	۰/۹۸
۰/۷۴	۱/۲۶	۰/۲۷	۰/۹۹	۰/۵۶	۰/۵۶
۰/۴۵	۰/۵۲	۰/۸۳	۰/۹۹	۰/۲۱	۰/۲۱
۰/۱۲	۰/۰۸	۰/۹۶	۱/۰۰	۰/۰۱	۰/۰۱
شرایط تنفس					
۰/۸۷	۲/۲۶	۰/۰۱	۰/۸۲	۰/۷۷	۰/۷۷
۰/۵۲	۰/۹۸	۰/۴۸	۰/۹۱	۰/۲۷	۰/۲۷
۰/۴۳	۰/۹۹	۰/۴۴	۰/۹۷	۰/۱۸	۰/۱۸
۰/۳۳	۱/۱۵	۰/۳۳	۱/۰۰	۰/۱۱	۰/۱۱

جدول ۷. ضریب کانونیک استاندارد شده برای توابع کانونیک مربوط به متغیرهای سنبله‌ای ۳۰ ژنوتیپ گندم تحت شرایط عدم تنفس و تنفس

صفات	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅
شرایط عدم تنفس					
تعداد دانه در سنبله	۰/۰۷	-۱/۳۰	۰/۵۱	-۰/۳۹	-۰/۳۰
عملکرد کاه سنبله	۰/۰۵	-۰/۳۱	۰/۰۵	-۰/۱۸	-۰/۹۸
شاخص برداشت سنبله	۰/۹۸	۰/۲۲	-۰/۲۹	-۰/۱۶	-۰/۲۰
تعداد سنبلچه در سنبله	-۰/۰۵	۱/۰۸	-۷/۴۵	-۳/۷۴	-۴/۲۹
طول سنبله	۰/۰۲	-۰/۷۱	۶/۹۳	۴/۹۹	۴/۸۸
شرایط تنفس					
طول سنبله	-۰/۰۴	-۱/۰۲	-۰/۷۸	۰/۰۲	۰/۸۱
تعداد سنبلچه در سنبله	-۰/۱۰	-۰/۶۱	۰/۴۴	۱/۰۴	-۰/۹۳
تعداد دانه در سنبله	۱/۰۳	۲/۰۷	-۱/۲۸	-۱/۵۱	-۱/۸۳
عملکرد کاه سنبله	-۰/۰۱	۰/۸۰	۰/۱۶	۲/۱۹	۰/۹۶
شاخص برداشت سنبله	-۰/۰۹	-۰/۳۶	۱/۷۹	۲/۷۰	۳/۰۴

شدن دانه (۳۸/۳ روز) را به خود اختصاص داد (جدول ۵). تحت شرایط تنفس، ژنوتیپ cd-10 کمترین طول دوره پر شدن دانه (۱۲/۳ روز) را داشت. دامنه تغییرات این صفت بین ۳۸/۳-۱۲/۳ روز متغیر بود.

صبا و همکاران (۲۱) با ارزیابی ۳۶ لاین پیشرفته گندم در طول سه سال متوالی تحت شرایط دیم گزارش کردند که برای

تعداد روز تا ۵۰٪ گلدهی (۲۰۷ روز) را داشت (جدول ۵). در شرایط عدم تنفس ژنوتیپ اروم و تحت شرایط تنفس، ژنوتیپ cd-5 کمترین تعداد روز تا ۵۰٪ گلدهی (۱۸۷ روز) را به خود اختصاص دادند (جدول ۵). دامنه تغییرات این صفت بین ۱۸۷-۲۰۷ روز متغیر بود.

در شرایط عدم تنفس ژنوتیپ cd-4 بیشترین طول دوره پر

جدول ۸ ضریب کانونیک استاندارد شده برای توابع کانونیک مربوط به صفات فنولوژیکی و رشدی در ۳۰ ژنتیپ گندم پاییزه تحت شرایط عدم تنفس و تنفس

V ₅	V ₄	V ₃	V ₂	V ₁	صفات
شرایط عدم تنفس					
۰	-۱/۱۳	-۰/۹۱	۰/۷۸	۰/۰۸	تعداد روز تا رسیدگی
۰	۱/۶۵	۰/۱۷	-۰/۱۶	-۰/۲۱	تعداد روز تا ۵۰٪ گلدهی
۰	۰	۰	۰	۰	طول دوره پر شدن دانه
۰	۲/۷۶	-۲/۰۷	-۳/۷۹	۰/۱۷	سرعت رشد رویشی
۰	-۲/۴۱	۲/۲۳	۳/۶۵	۰/۸۱	سرعت پر شدن دانه
شرایط تنفس					
۰	۳/۱۰	۰/۷۶	-۴/۰۲	-۰/۶۲	سرعت پر شدن دانه
۰	۱/۱۹	۱/۴۲	-۲/۵۵	-۰/۱۷	تعداد روز تا رسیدگی
۰	-۱/۵۹	-۰/۲۳	۳/۶۲	۰/۲۴	تعداد روز تا ۵۰٪ گلدهی
۰	۰	۰	۰	۰	طول دوره پر شدن دانه
۰	-۲/۱۱	-۱/۱۷	۳/۵۷	۱/۴۰	سرعت رشد رویشی

رشد رویشی (۰/۹۸) و سرعت پر شدن دانه (۰/۹۸) همبستگی مثبت و بالایی با تابع کانونیک (V₁) نشان داد ولی طول دوره پر شدن دانه (۰/۲۹) دارای همبستگی پایین بود. در بین متغیرهای سمات سنبله‌ای همبستگی مثبت و بالای شاخص برداشت سنبله (۰/۹۹) با تابع کانونیک (W₁) مشاهده شد، اما بقیه صفات دارای همبستگی پایین بودند. همبستگی بین متغیرهای اندازه‌گیری شده یک گروه با توابع کانونیک گروه دیگر در جداول ۱۱ و ۱۲ درج شده است. در بین متغیرهای فنولوژیکی و رشدی، سرعت رشد رویشی (۰/۹۷) و سرعت پر شدن دانه (۰/۹۷) همبستگی مثبت و بالایی با تابع کانونیک مربوط به صفات سنبله‌ای (W₁) داشت ولی طول دوره پر شدن دانه (۰/۲۸) دارای همبستگی پایین بود. در بین متغیرهای صفات سنبله‌ای، همبستگی مثبت و بالای شاخص برداشت سنبله (۰/۹۹) با تابع کانونیک مربوط به صفات فنولوژیکی (V₁) وجود داشت، اما بقیه صفات سنبله‌ای دارای همبستگی پایین بودند.

با توجه به نتایج بدست آمده تحت شرایط عدم تنفس در مزرعه می‌توان گفت تابع V₁ بیشتر مؤثر از شاخص برداشت سنبله است، اما تابع W₁ بیشتر تحت تأثیر سرعت رشد رویشی

اصلاح عملکرد دانه در بوته گندم تحت شرایط دیم، گرینش برای دوره رویشی کوتاه‌تر و دوره پر شدن دانه طولانی تر پیشنهاد می‌شود.

تجزیه همبستگی کانونیک صفات فنولوژیکی و رشدی، با صفات سنبله‌ای تحت شرایط عدم تنفس در مزرعه با مراجعه به جدول ۶ ملاحظه می‌شود آماره لامبای ویلکاکس در سطح احتمال ۱٪ برای تابع اول معنی دار شد؛ یعنی همبستگی معنی‌داری بین متغیرهای فنولوژیکی و رشدی از یک طرف و صفات سنبله‌ای از سوی دیگر در تابع اول وجود دارد. ترکیب خطی برای تابع اول از متغیرهای فنولوژیکی و رشدی (V_i) و صفات سنبله‌ای (W_i) مورد مطالعه همراه با ضرایب مربوطه (b_{ik}, a_{ij}) به صورت زیر به دست آمد (جداول ۷ و ۸):

$$\begin{aligned} V_1 &= 0.078Y_1 - 0.21Y_2 + 0.177Y_4 + 0.807Y_5 \\ W_1 &= 0.074X_1 + 0.057X_2 + 0.98X_3 - 0.555X_4 + 0.519X_5 \end{aligned}$$

همبستگی ساختاری بین متغیرهای اندازه‌گیری شده یک گروه با توابع کانونیک مربوط به همان گروه در جداول ۹ و ۱۰ درج شده است. در بین متغیرهای فنولوژیکی و رشدی، سرعت

جدول ۹. همبستگی ساختاری بین متغیرهای سنبله‌ای و توابع کانونیک مربوطه تحت شرایط عدم تنفس و تنفس

W ₅	W ₄	W ₃	W ₂	W ₁	صفات
شرایط عدم تنفس					
۰/۱۰	۰/۳۳	-۰/۰۸	-۰/۸۷	۰/۱۹۶	تعداد دانه در سنبله
-۰/۸۸	۰/۱۵	۰/۰۱	۰/۰۸	-۰/۰۹	عملکرد کاه سنبله
۰/۰۴	-۰/۰۲	-۰/۰۷	۰/۰۳	۰/۹۹	شاخص برداشت سنبله
-۰/۰۶	۰/۷۶	-۰/۴۹	-۰/۴۰	۰/۰۵	تعداد سنبله‌چه در سنبله
۰/۱۹	۰/۳۷	-۰/۷۰	-۰/۴۸	۰/۰۶	طول سنبله
شرایط تنفس					
۰/۲۳	۰/۲۴	-۰/۰۲	-۰/۴۲	۰/۶۵	طول سنبله
-۰/۳۲	۰/۴۴	۰/۱۵	-۰/۴۰	۰/۷۲	تعداد سنبله‌چه در سنبله
۰/۱۰	۰/۱۷	۰/۰۴	۰/۰۰۸	۰/۹۷	تعداد دانه در سنبله
-۰/۱۰	۰/۲۴	-۰/۴۹	۰/۳۳	-۰/۷۶	عملکرد کاه سنبله
۰/۲۶	۰/۱۰	۰/۳۷	-۰/۱۱	۰/۸۷	شاخص برداشت سنبله

جدول ۱۰. همبستگی ساختاری بین صفات فنولوژیکی و رشدی، و توابع کانونیک مربوطه تحت شرایط عدم تنفس و تنفس

V ₅	V ₄	V ₃	V ₂	V ₁	صفات
شرایط عدم تنفس					
.	۰/۱۵	-۰/۸۰	۰/۰۵	۰/۱۵	تعداد روز تا رسیدگی
.	۰/۶۸	-۰/۲۹	۰/۶۵	-۰/۱۰	تعداد روز تا ۵۰٪ گلدهی
.	-۰/۸۰	-۰/۳۳	-۰/۳۹	۰/۲۸	طول دوره پر شدن دانه
.	۰/۱۳	-۰/۱۲	-۰/۰۵	۰/۹۸	سرعت رشد رویشی
.	۰/۱۳	۰/۰۳	۰/۱۳	۰/۹۸	سرعت پر شدن دانه
شرایط تنفس					
.	۰/۸۶	-۰/۰۴	۰/۳۵	۰/۳۵	سرعت پر شدن دانه
.	-۰/۱۴	۰/۸۰	-۰/۰۵	۰/۵۷	تعداد روز تا رسیدگی
.	۰/۵۹	۰/۰۳	۰/۰۸	-۰/۱۵	تعداد روز تا ۵۰٪ گلدهی
.	-۰/۶۳	۰/۰۶	-۰/۰۶	۰/۰۲	طول دوره پر شدن دانه
.	۰/۲۶	-۰/۰۱	۰/۰۵	۰/۹۶	سرعت رشد رویشی

تجزیه همبستگی کانونیک صفات سنبله‌ای با صفات فنولوژیکی و رشدی تحت شرایط تنفس در مزرعه با توجه به جدول ۶ آماره لامبادای ویلکاکس در سطح احتمال ۵٪ برای تابع اول معنی دار شد؛ یعنی همبستگی معنی داری بین

و سرعت پر شدن دانه بود. در چنین شرایطی برای افزایش شاخص برداشت سنبله و تعداد دانه در سنبله، صفات سرعت رشد رویشی و سرعت پر شدن دانه می‌توانند به عنوان معیارهای مناسب در نظر گرفته شوند.

جدول ۱۱. همبستگی متغیرهای فنولوژیکی و رشدی با توابع کانونیک حاصل از صفات سنبله‌ای تحت شرایط عدم تنش و تنش

W ₅	W ₄	W ₃	W ₂	W ₁	صفات
شرایط عدم تنش					
+	۰/۰۲	-۰/۳۶	۰/۴۱	۰/۱۵	تعداد روز تا رسیدگی
+	۰/۰۸	-۰/۱۳	۰/۴۸	-۰/۱۰	تعداد روز تا ۵۰٪ گلدهی
+	-۰/۰۹	-۰/۱۵	-۰/۲۸	۰/۲۸	طول دوره پر شدن دانه
+	۰/۰۱	-۰/۰۵	-۰/۰۴	۰/۹۷	سرعت رشد رویشی
+	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۹	۰/۹۷	سرعت پر شدن دانه
شرایط تنش					
+	۰/۲۹	-۰/۰۲	۰/۱۸	۰/۳۱	سرعت پر شدن دانه
+	-۰/۰۵	۰/۳۴	-۰/۰۲	۰/۵۰	تعداد روز تا رسیدگی
+	۰/۲۰	۰/۲۲	۰/۳۰	-۰/۱۳	تعداد روز تا ۵۰٪ گلدهی
+	-۰/۲۱	۰/۰۲	-۰/۲۹	۰/۴۵	طول دوره پر شدن دانه
+	۰/۰۹	-۰/۰۰۷	۰/۰۲	۰/۸۴	سرعت رشد رویشی

جدول ۱۲. همبستگی صفات سنبله‌ای با تابع کانونیک حاصل از متغیرهای فنولوژیکی و رشدی تحت شرایط عدم تنش و تنش

W ₅	W ₄	W ₃	W ₂	W ₁	صفات
شرایط عدم تنش					
+	۰/۰۴	-۰/۰۴	-۰/۶۴	۰/۱۹	تعداد دانه در سنبله
+	۰/۰۲	۰/۰۰۶	۰/۰۶	-۰/۰۹	عملکرد کاه سنبله
+	-۰/۰۰۳	-۰/۰۳	۰/۲۰	۰/۹۹	شاخص برداشت سنبله
+	۰/۰۹	-۰/۲۲	-۰/۲۹	۰/۰۴	تعداد سنبله‌چه در سنبله
+	۰/۰۴	-۰/۳۲	-۰/۳۵	۰/۰۶	طول سنبله
شرایط تنش					
+	۰/۰۸	-۰/۲۲	-۰/۲۲	۰/۵۷	طول سنبله
+	۰/۱۵	۰/۰۶	-۰/۲۱	۰/۶۳	تعداد سنبله‌چه در سنبله
+	۰/۰۶	۰/۰۲	۰/۰۰۴	۰/۸۵	تعداد دانه در سنبله
+	۰/۰۸	-۰/۲۱	۰/۱۷	-۰/۶۶	عملکرد کاه سنبله
+	۰/۰۳	۰/۱۶	-۰/۰۶	۰/۷۷	شاخص برداشت سنبله

$$W_1 = -0.045X_1 - 0.102X_2 + 1.533X_3 - 0.509X_4 - 0.893X_5 \\ V_1 = -0.621Y_1 - 0.169Y_2 + 0.242Y_3 + 1.405Y_5$$

همبستگی ساختاری بین متغیرهای اندازه‌گیری شده یک گروه با تابع کانونیک مربوط به همان گروه در جداول ۹ و ۱۰ درج شده است. در بین متغیرهای فنولوژیکی و رشدی، سرعت رشد رویشی (۰/۹۶)، تعداد روز تا رسیدگی (۰/۵۸) و طول

متغیرهای فنولوژیکی و رشدی از یک طرف و صفات سنبله‌ای از سوی دیگر در تابع اول وجود دارد. ترکیب خطی برای تابع اول از متغیرهای فنولوژیکی و رشدی (V_i) و صفات سنبله‌ای (W_i) مورد مطالعه همراه با ضرایب مربوطه (b_{ik}, a_{ij}) به صورت زیر به دست آمد (جداول ۷ و ۸):

همچنین بین شاخص برداشت سنبله با تابع کانونیک مربوطه (W_1) همبستگی مثبت و بالایی با تابع کانونیک مربوطه (V_1) نشان داد ولی سرعت پر شدن دانه در چنین شرایطی برای افزایش شاخص برداشت سنبله، صفات سرعت رشد رویشی و سرعت پر شدن دانه می‌توانند به عنوان معیار گزینشی مناسب در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج بدست آمده تحت شرایط تنفس در مزرعه، بین سرعت رشد رویشی، تعداد روز تا رسیدگی و طول دوره پر شدن دانه و متغیر کانونیکی مربوطه (V_1) و همچنین بین تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله و طول سنبله و متغیر کانونیکی مربوطه (W_1) همبستگی مثبت و نسبتاً بالایی مشاهده شد. چنین به نظر می‌رسد تحت شرایط تنفس خشکی در مزرعه برای افزایش تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله و طول سنبله، صفات سرعت رشد رویشی، تعداد روز تا رسیدگی و طول دوره پر شدن دانه می‌توانند به عنوان معیار مناسب در نظر گرفته شود. علوی سینی و صبا (۲) با تجزیه همبستگی کانونی صفات زراعی، سه متغیر کانونی معنی دار به دست آورند که متغیرهای کانونی معنی دار ۰٪۳۰ از واریانس کل متغیرها را توجیه نمودند. همچنین آنها همبستگی اولین، دومین و سومین جفت متغیر کانونی را به ترتیب ۰/۹۱، ۰/۸۴ و ۰/۷۴ گزارش کردند که اولین متغیر کانونی با توجیه ۱۳/۲٪ از تنوع متغیرهای زراعی با صفات درصد اختصاص ماده خشک به برگ، ارتفاع بوته و شاخص برداشت رابطه منفی و با بقیه صفات زراعی رابطه مثبت داشت. صبا و همکاران (۲۱) در تجزیه همبستگی کانونیکی صفات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و فنولوژیکی با صفات اجزای عملکرد، گزارش کردند که اولین متغیر کانونیکی برای صفات مستقل (U_1) بیشتر تحت تأثیر زیست توده گیاه (۰/۶۷) قرار گرفت و صفات دمای کانونی، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد روز تا سنبله‌دهی دارای ضریب همبستگی پایین بودند. در پژوهش علوی سینی و صبا (۲) متغیر کانونی دوم با توجیه ۱۱ درصد از تنوع متغیرهای زراعی با صفات درصد ماده خشک برگ و سنبله، ارتفاع، طول ریشک، طول پدانکل، وزن مخصوص پدانکل و زیست توده همبستگی مثبت و متغیر

دوره پر شدن دانه (۰/۵۲) همبستگی مثبت و بالایی با تابع کانونیک مربوطه (V_1) نشان داد ولی سرعت پر شدن دانه (۰/۳۵) دارای همبستگی پایین بود.

در بین متغیرهای صفات سنبله‌ای همبستگی مثبت و بالایی بین تعداد دانه در سنبله (۰/۹۷)، شاخص برداشت سنبله (۰/۸۷)، تعداد سنبلچه در سنبله (۰/۷۲) و طول سنبله (۰/۶۵) با تابع کانونیک مربوطه (W_1) مشاهده شد. اما عملکرد کاه سنبله (۰/۷۶۰) دارای همبستگی بالا و منفی بود.

همبستگی بین متغیرهای اندازه‌گیری شده یک گروه با توابع کانونیک گروه دیگر در جداول ۱۱ و ۱۲ درج شده است. در بین متغیرهای فنولوژیکی و رشدی، سرعت رشد رویشی (۰/۸۴) همبستگی مثبت و بالایی با تابع کانونیک مربوط به صفات سنبله‌ای (W_i) داشت، ولی تعداد روز تا رسیدگی، طول دوره پر شدن دانه و سرعت پر شدن دانه دارای همبستگی متوسط بودند. در بین متغیرهای صفات سنبله‌ای همبستگی مثبت و بالایی بین تعداد دانه در سنبله (۰/۸۵)، شاخص برداشت سنبله (۰/۷۷)، تعداد سنبلچه در سنبله (۰/۶۳) و طول سنبله (۰/۵۷) با تابع کانونیک مربوط به صفات فنولوژیکی و رشدی (V_1) وجود داشت، اما عملکرد کاه سنبله (۰/۶۷) دارای همبستگی منفی و بالا بود.

با توجه به نتایج بدست آمده تحت شرایط تنفس خشکی در مزرعه می‌توان گفت تابع V_1 بیشتر متأثر از صفات تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت سنبله، عملکرد کاه سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله و طول سنبله است، اما تابع W_1 بیشتر تحت تأثیر سرعت رشد رویشی، طول دوره پر شدن دانه و تعداد روز تا رسیدگی بود. در چنین شرایطی برای افزایش تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله و طول سنبله و کاهش عملکرد کاه سنبله، افزایش صفات سرعت رشد رویشی، طول دوره پر شدن دانه، تعداد روز تا رسیدگی در درجه اول و صفت سرعت پر شدن دانه در درجه دوم می‌توانند به عنوان معیار گزینشی مناسب در نظر گرفته شود.

تحت شرایط آبیاری مطلوب در مزرعه، بین سرعت رشد رویشی و سرعت پر شدن دانه و متغیر کانونیکی مربوطه (V_1) و

روز تا رسیدگی و سرعت رشد رویشی بیشتر مرتبط است. همچنین عملکرد بالای ژنوتیپ‌های cd-10-c-93 و میهن تحت تنش خشکی به افزایش تعداد سنبلاچه در سنبله و تعداد روز تا رسیدگی مرتبط بود. تحت شرایط عدم تنش در مزرعه برای افزایش شاخص برداشت سنبله و تعداد دانه در سنبله، صفات سرعت رشد رویشی و سرعت پرشدن دانه می‌توانند به عنوان معیارگزینشی مناسب در نظر گرفته شود. براساس نتایج حاصل از تجزیه همبستگی کانونیک تحت شرایط تنش در مزرعه، جهت افزایش تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت سنبله، تعداد سنبلاچه در سنبله و طول سنبله و کاهش عملکرد کاه سنبله، افزایش صفات سرعت رشد رویشی، طول دوره پرشدن دانه، تعداد روز تا رسیدگی در درجه اول و افزایش صفت سرعت پرشدن دانه در درجه دوم از عامل مهم و تأثیرگذار محسوب می‌شود.

تشکر و قدردانی

از مسئولین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی که مواد آزمایشی برای انجام این پژوهش را فراهم کردند تشکر و قدردانی می‌شود.

کانونی سوم با توجیه ۵/۵ درصد از تنوع با همه صفات به جز درصد ماده خشک برگ، ارتفاع، وزن هزاردانه، زیست توده و عملکرد همبستگی منفی داشت. نتایج لورنسی و همکاران (۱۶) نیز اهمیت تجزیه همبستگی کانونی برای درک ارتباط میان اجزاء اولی و ثانویه عملکرد دانه را در یولاف جهت ارزیابی ساختارهای ژنتیکی نشان داده است. غفاری و همکاران (۱۱) با استفاده از تجزیه همبستگی کانونی ارتباط معنی‌داری بین دو دسته صفات فیزیولوژیک و زراعی به ترتیب در گیاه گندم و کلزا گزارش کردند. صبا و همکاران (۲۱) نیز از این تکنیک برای بررسی ارتباط بین صفات زراعی و فنولوژیک گیاه گندم بهره بردنده. اتیشا و همکاران (۷) با استفاده از تجزیه همبستگی کانونیک در جو اعلام کردند که صفاتی که دارای مقادیر و ارزش‌های بالاتری در مولفه اول هستند، می‌توانند به خوبی در تمایز کردن ارقام از یکدیگر ایفای نقش کنند و از این‌رو توجه به مقدار عددی صفات در مولفه‌ها را مهم دانستند.

نتیجه‌گیری کلی

به طور کلی نتایج آزمایش مزرعه‌ای نشان داد که عملکرد بالای ژنوتیپ‌های ۹۴-۳-c، حیدری، ۹۴-۹-c، میهن و اروم در شرایط عدم تنش به شاخص برداشت سنبله، طول سنبله، سرعت پرشدن دانه، تعداد سنبلاچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد

منابع

1. Ahmadi, A. and D. A. Baker. 2001. The effect of water stress on grain filling processes in wheat. *Journal of Agricultural Science* 136: 257-269.
2. Alavi-Siney, S. M. and J. Saba. 2014. Studying the association between physiological and agronomical characteristics of different wheat genotypes in dryland condition using canonical correlation analysis. *Environmental Stresses in Crop Sciences* 7: 13-23. (In Farsi).
3. Alavi-Siney, S. M. and J. Saba. 2021. Investigation of the relationship between SSR markers and agronomic traits in saffron (*Crocus sativus L.*). *Journal of Horticulture and Postharvest Research* 4: 79-88.
4. Alqudah, A. M., N. H. Samarah and R. E. Mullen. 2011. Drought stress effect on crop pollination, seed set, yield and quality. pp 193-213, In: E. Lichtfouse (ed.), Alternative Farming Systems, Biotechnology, Drought Stress and Ecological Fertilization. Springer Press, Dordrecht.
5. Bayat, M., R. Amirmia, H. Özkan, A. Gedik, D. Ate, M. Rahimi and B. Tanyulac. 2018. Identification of markers associated with traits for use in marker-assisted selection in saffron. *Genetika* 50(3): 971-982.
6. Daryanto, S., L. Wang and P. A. Jacinthe. 2016. Global synthesis of drought effects on maize and wheat production. *PLoS ONE* 11(5): 0156362.
7. Eticha, F., G. Belay and E. Bekele. 2006. Species diversity in wheat landrace populations from two regions of Ethiopia. *Genetic Resources and Crop Evolution* 53: 387-393.

8. Fahad, S., A. A. Bajwa, U. Nazir, S. A. Anjum, A. Farooq, A. Zohaib, S. Sadia, W. Nasim, S. Adkins and S. Saud. 2017. Crop production under drought and heat stress: plant responses and management options. *Frontiers in Plant Science* 8: 1-16.
9. FAO. 2020. World food situation. Available online at: <http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/>.
10. Gasemi, M. 2017. Wheat Cultivars of Tolerance to End Season Drought Stress in Ardabil Plain. Agricultural Research Center, Ardabil. (In Farsi).
11. Ghaffari, G., M. Toorchini, S. Aharizad and M. Shakiba. 2011. Evaluation of traits related to water deficit stress in winter rapeseed cultivars. *Universal Journal of Environmental Research and Technology* 1(3): 338-350.
12. Hu, T., L. J. Renzullo, A. I. van Dijk, J. He, S. Tian, Z. Xu, J. Zhou, T. Liu and Q. Liu. 2020. Monitoring agricultural drought in Australia using MTSAT-2 land surface temperature retrievals. *Remote Sensing of Environment* 236: 1-13.
13. Izanloo, A., A. G. Condon, P. Langridge, M. Tester and T. Schnurbusch. 2008. Different mechanisms of adaptation to cyclic water stress in two south Australian bread wheat cultivars. *Journal of Experimental Botany* 59: 3327-3346.
14. Kovacik, J., B. Klejdus, P. Babula and M. Jarosova. 2014. Variation of antioxidants and secondary metabolites in nitrogen-deficient barely plants. *Journal of Plant Physiology* 171: 260-268.
15. Lamaoui, M., M. Jemo, R. Datla and F. Bekkaoui. 2018. Heat and drought stresses in crops and approaches for their mitigation. *Frontiers in Chemistry* 6(26): 1-14.
16. Lorenzetti, C., F. I. F. D. carvalho, A. C. D. Oliveira, I. P. Valerio, I. Hartwig, G. Benin and D. A. M. Schmidt. 2006. Applicability of phenotypic and canonic correlations and path coefficients in the selection of oat genotypes. *scientia agricola* 63: 11-19.
17. Mohammadi-Ahmadvahabi, E., R. Deihimfard and O. Noori. 2020. Yield gap analysis simulated for sugar beet-growing areas in water-limited environments. *European Journal of Agronomy* 113: 125988.
18. Mosadeghi, M. R., M. Morshedizad, A. A. Mahboubi, A. R. Dexter and R. Schulin. 2009. Laboratory evaluation of a model for soil crumbling for prediction of the optimum soil water content for tillage. *Soil and Tillage Research* 105: 242-250.
19. Pordel-Maragheh, F. 2013. Assess the genetic diversity in some wheat genotypes through agronomic traits. *European Journal of Zoological Research* 2: 71-75.
20. Pradhan, G. P., P. V. Prasad, A. K. Fritz, M. B. Kirkham and B. S. Gill. 2012. Effects of drought and high temperature stress on synthetic hexaploid wheat. *Functional Plant Biology* 39(3): 190-198.
21. Saba, J., S. Tavana, Z. Qorbanian, E. Shadan, F. Shekari and F. Jabbari. 2018. Canonical correlation analysis to determine the best traits for indirect improvement of wheat grain yield under terminal drought stress. *Journal of Agricultural Science and Technology* 20(5): 1037-1048.
22. Sharma, S. 1996. Applied Multivariate Techniques. John Wiley and Sons, Inc., New York.
23. Shearman, V. J., R. Sylvester-Bradley, R. K. Scott and M. J. Foulkes. 2005. Physiological processes associated with wheat yield progress in the UK. *Crop Science* 45: 175-185.
24. SPII (Anonymous). 2015. Report of wheat breeding program result during 2014-2015. Cereal Research Division, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran. (In Farsi).
25. SPII (Anonymous). 2016. Report of wheat breeding program result during 2015-2016. Cereal Research Division, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran. (In Farsi).

Relationships Between Spike Traits and Phenological and Growth Traits of Various Bread Wheat Genotypes under Moisture Stress Conditions During the Flowering Stage in Field Evaluation

B. TahmasebPour¹, S. Jahanbakhsh^{2*}, A. Tarinejad³, H. Moahammadi⁴ and A. Ebadi²

1 and 2. Ph.D Student of Plant Breeding and Professor, Respectively, Department of Plant Genetics and Production Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

3. Associate Professor, Department of Agricultural Biotechnology, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

4. Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

*Corresponding author's e-mail address: jahanbakhsh@uma.ac.ir

(Received: December 11-2023; Accepted: July 17-2024)

Extended Abstract

Introduction

Wheat, as one of the most important crops, occupies about 20% of the world's cultivated area. In the FAO report, more than 90% of Iran is classified as arid and semi-arid. The impact of drought stress on crops is devastating, resulting in yield losses of 17% every year. It is therefore of high importance to conduct researches to improve crop resilience to drought stress and minimize water losses in agriculture.

Materials and Methods

This study explored the relationships among different traits in bread wheat genotypes. A split-plot experiment was conducted, according to the randomized complete block design with three replications, to investigate 30 genotypes as subfactors. The experiment was carried out at the research farm of Shahid Madani University, Tabriz, northwest of Iran during the 2016-2017 growing season, under normal irrigation and drought stress conditions during the early flowering stage as a main factor (B). The relationship between yield and yield components and the relative importance of traits affecting yield were investigated using an analysis of variance, mean comparison, and canonical correlation analysis after measuring the traits of the studied genotypes.

Results and Discussion

The analysis of variance results revealed significant differences among genotypes for the examined traits. Moreover, the impact of drought stress was significant for all traits except spike straw yield. The interaction effect of stress and genotype was significant for all traits except 1000-grain weight, spike length, grain filling rate, and vegetative growth rate, indicating that the relative performance of the genotypes changed between the two environments. Canonical correlation analysis indicated a significant correlation between pairs of canonical variables resulting from phenological and growth traits with spike-related traits under normal and moisture stress levels.

Conclusions

Based on the results of canonical correlation analysis, it can be concluded that, under normal field conditions, enhancing desirable characteristics in the spike (such as spike harvest index and grains/ spike) requires

considering the traits of vegetative growth rate and grain filling rate. On the other hand, under stress conditions at the flowering stage in the field, selecting criteria should prioritize an increase in the grains/spike, spike harvest index, spikelets/spike, and spike length, as well as a decrease in spike straw yield, vegetative growth rate, length of grain filling period, days to maturity, and vegetative growth rate.

Keywords: *Canonical correlation analysis, Water deficit, Yield*